



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Ondansetrom

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

Injeção de Ondansetrom

pronunciado como (em dan' se tron)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de ondansetrona é usada para prevenir náuseas e vômitos causados pela quimioterapia e cirurgia do câncer. Ondansetron está em uma classe de medicamentos chamados serotonina 5-HT₃antagonistas do receptor. Funciona bloqueando a ação da serotonina, uma substância natural que pode causar náuseas e vômitos.

como este medicamento deve ser usado?

Ondansetron vem como uma solução (líquido) para ser injetado por via intravenosa (na veia) ou intramuscular (no músculo) por um profissional de saúde em um hospital ou clínica. Quando o ondansetrom é usado para prevenir náuseas e vômitos causados pela quimioterapia, geralmente é administrado 30 minutos antes do início da quimioterapia. Doses adicionais podem ser administradas 4 horas após a primeira dose de ondansetrom e 8 horas após a primeira dose de ondansetrom, se necessário. Quando o ondansetrom é usado para prevenir náuseas e vômitos causados por cirurgia, geralmente é administrado imediatamente antes da cirurgia. O ondansetrom também é administrado algumas vezes após a cirurgia a pacientes que apresentam náuseas e vômitos e que não receberam ondansetrom antes da cirurgia.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar ondansetrom,

- Informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a ondansetrona, alosetrona (Lotronex), dolasetrona (Anzemet), granisetrona (Kytril), palonossetrom (Aloxi) ou qualquer outro medicamento: ou qualquer um dos ingredientes da injeção de ondansetrona. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se estiver a receber apomorfina (Apokyn). O seu médico provavelmente lhe dirá para não usar ondansetrona se estiver recebendo este medicamento.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: amiodarona (Cordarone, Pacerone); azitromicina (Zithromax); certos medicamentos para convulsões, como carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) ou fenitoína (Dilantin); cloroquina (Aralen); clorpromazina; citalopram (Celexa); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); diuréticos ('pílulas de água'); eritromicina (EES, Eritrocina, outros); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); flecainida; haloperidol (Haldol); lítio (Lithobid); medicamentos para tratar enxaquecas, como almotriptano (Axert), eletriptano (Relpax), frovatriptano (Frova), naratriptano (Amerge), rizatriptano (Maxalt), sumatriptano (Imitrex) e zolmitriptano (Zomig); azul de metileno;

mirtazapina (Remeron); inibidores da monoamina oxidase (MAO) incluindo isocarboxazida (Marplan), linezolida (Zyvox), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate); moxifloxacina (Avelox); pentamidina (Nebu-Pent); pimozida (Orap); procainamida; quinidina; rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater); inibidores seletivos de recaptção de serotonina/norepinefrina (SNRIs) como desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta) e venlafaxina (Effexor XR); inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRSs) como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, em Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) e sertralina (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazina; tramadol (Conzip, Ultram, em Ultracet); e vandetanibe (Caprelsa). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo com mais cuidado quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com ondansetrona, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

- informe o seu médico se você ou alguém da sua família tem ou já teve síndrome do QT longo (condição que aumenta o risco de desenvolver batimentos cardíacos irregulares que podem causar desmaios ou morte súbita), ou outro tipo de batimento cardíaco irregular ou problema de ritmo cardíaco, ou se tem ou teve níveis baixos de magnésio ou potássio no sangue, insuficiência cardíaca (IC; condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para outras partes do corpo) ou doença hepática.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto estiver recebendo ondansetrona, ligue para o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta habitual.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Ondansetrom pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- dor de cabeça
- constipação
- sonolência
- sentindo frio ou calafrios
- dor, queimação, dormência ou formigamento na mão ou nos pés
- febre
- dor no local da injeção, vermelhidão, inchaço, calor ou queimação

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas, ligue para o seu médico imediatamente ou procure tratamento médico de emergência:

- irritação na pele
- urticária
- coceira
- inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, mãos, pés, tornozelos ou pernas
- rouquidão

- dificuldade em respirar ou engolir
- dor no peito
- falta de ar
- tonturas, tonturas ou desmaios
- batimentos cardíacos rápidos, lentos ou irregulares
- visão turva ou perda de visão
- tontura
- agitação
- alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)
- febre
- suor excessivo
- confusão
- náuseas, vômitos ou diarreia
- perda de coordenação
- músculos rígidos ou contraídos
- convulsões
- coma (perda de consciência)

Ondansetrom pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver usando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Este medicamento será armazenado no hospital ou clínica.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

- perda repentina de visão por um curto período de tempo
- tontura ou vertigem

- desmaio
- constipação
- arritmia cardíaca

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Zofran®Injeção

Última revisão - 15/01/2015

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022