

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Ondansetron injectabil

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

Ondansetron injectabil

pronunțat ca (on dan' se tron)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu Ondansetron este utilizată pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapie și intervenții chirurgicale pentru cancer. Ondansetronul face parte dintr-o clasă de medicamente numite serotonină 5-HT₃antagoniști ai receptorilor. Acționează prin blocarea acțiunii serotoninei, o substanță naturală care poate provoca greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ondansetronul vine sub formă de soluție (lichid) pentru a fi injectat intravenos (într-o venă) sau intramuscular (într-un mușchi) de către un furnizor de servicii medicale într-un spital sau clinică. Când ondansetronul este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapie, se administrează de obicei cu 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei. Doze suplimentare pot fi administrate la 4 ore după prima doză de ondansetron și la 8 ore după prima doză de ondansetron, dacă este necesar. Când ondansetronul este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de intervenții chirurgicale, de obicei este administrat chiar înainte de intervenția chirurgicală. Ondansetron este, de asemenea, uneori administrat după operație pacienților care au greață și vărsături și care nu au primit ondansetron înainte de operație.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza ondansetron,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytril), palonosetron (Aloxi) sau la orice alte medicamente: sau la oricare dintre ingredientele injectării cu ondansetron. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați apomorfina (Apokyn). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu utilizați ondansetron dacă primiți acest medicament.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: amiodarona (Cordarone, Pacerone); azitromicină (Zithromax); anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) sau fenitoina (Dilantin); clorochină (Aralen); clorpromazină; citalopram (Celexa); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); diuretice („pastile de apă”); eritromicină (EES, Erythrocin, altele); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); flecainidă; haloperidol (Haldol); litiu (Lithobid); medicamente pentru tratarea migrenelor, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) și zolmitriptan (Zomig); albastru de metil;

mirtazapină (Remeron); inhibitori de monoaminooxidază (MAO) incluzând izocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate); moxifloxacină (Avelox); pentamidină (Nebu-Pent); pimozidă (Orap); procainamidă; chinidină; rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei/norepinefrinei (SNRI) cum ar fi desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta) și venlafaxina (Effexor XR); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazină; tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet); și vandetanib (Caprelsa). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu mai multă atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu ondansetron, așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau ați avut vreodată sindrom QT lung (afecțiune care crește riscul de a dezvolta bătăi neregulate ale inimii care poate provoca leșin sau moarte subită) sau un alt tip de bătăi neregulate ale inimii sau problemă de ritm cardiac, sau dacă aveți sau ați avut vreodată un nivel scăzut de magneziu sau potasiu în sânge, insuficiență cardiacă (IC; afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge în alte părți ale corpului) sau boală hepatică.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți ondansetron, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune altfel, continuați dieta obișnuită.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ondansetronul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:

- durere de cap
- constipație
- somnolență
- senzație de frig sau frisoane
- durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare
- febră
- durere la locul injectării, roșeață, umflare, căldură sau arsură

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau solicitați tratament medical de urgență:

- eczemă
- urticarie
- mâncărime
- umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- răgușeală

- dificultăți de respirație sau de înghițire
- dureri în piept
- dificultăți de respirație
- amețeli, amețeli sau leșin
- bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii
- vedere încețoșată sau pierderea vederii
- amețeli
- agitație
- halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)
- febră
- transpirație excesivă
- confuzie
- greață, vărsături sau diaree
- pierderea coordonării
- mușchii înțepeni sau tremurători
- convulsii
- coma (pierderea cunoștinței)

Ondansetronul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Acest medicament va fi păstrat în spital sau clinică.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

- pierderea bruscă a vederii pentru o perioadă scurtă de timp
- amețeli sau amețeli

- leșin
- constipație
- bătăi neregulate ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Zofran®Injectie

Ultima revizuire - 15.01.2015

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022