



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Ондансетрон для инъекций

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

## Ондансетрон для инъекций

произносится как (на дан се трон)

### зачем назначают это лекарство?

Инъекция ондансетрона используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией рака и хирургическим вмешательством. Ондансетрон относится к классу препаратов, называемых серотонин 5-HT<sub>3</sub>антагонисты рецепторов. Он работает, блокируя действие серотонина, природного вещества, которое может вызывать тошноту и рвоту.

### Как следует использовать это лекарство?

Ондансетрон выпускается в виде раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) или внутримышечно (в мышцу) медицинским работником в больнице или клинике. Когда ондансетрон используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, его обычно дают за 30 минут до начала химиотерапии. Дополнительные дозы можно вводить через 4 часа после первой дозы ондансетрона и через 8 часов после первой дозы ондансетрона, если это необходимо. Когда ондансетрон используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных операцией, его обычно назначают непосредственно перед операцией. Ондансетрон также иногда назначают после операции пациентам, которые испытывают тошноту и рвоту и которые не получали ондансетрон до операции.

Это лекарство может быть предписано для других целей. Попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

### Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

#### Перед применением ондансетрона

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ондансетрон, алосетрон (Lotronex), доласетрон (Anzemet), гранисетрон (Kytrel), палонсетрон (Aloxi) или любые другие лекарства: или любой из ингредиентов инъекции ондансетрона. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
- Расскажите своему врачу, если вы получаете апоморфин (Апокуп). Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать ондансетрон, если вы принимаете это лекарство.
- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из следующего: амиодарон (кордарон, пацерон); азитромицин (Зитромакс); некоторые лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) или фенитоин (Dilantin); хлорохин (Арален); хлорпромазин; циталопрам (целекса); кларитромицин (биаксин, в превпаке); диуретики («мочегонные таблетки»); эритромицин (ЭЭС, Эритроцин, др.); фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); флекаинид; галоперидол (Haldol); литий (литобид); лекарства для лечения мигрени, такие как алмотриптан (аксерт), элетриптан (релпакс), фроватриптан (фрова), наратриптан (амэрдж), ризатриптан (максалт), суматриптан (Имитрекс) и золмитриптан (Зомиг); метиленовый синий;

миртазапин (Ремерон); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая изокарбоксазид (Марплан), линезолид (Зивокс), фенелзин (Нардил), селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат); моксифлоксацин (Авелокс); пентамидин (Небу-Пент); пимозид (Орап); прокаинамид; хинидин; рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/норэпинефрина (SNRIs), такие как десвенлафаксин (Khedezla, Pristiq), дулоксетин (Cymbalta) и венлафаксин (Effexor XR); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); соталол (бетапейс, сорин); тиоридазин; трамадол (Conzip, Ultram, Ultracet); и вандетаниб (Капрелса). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с ондансетроном, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

- сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть или когда-либо был синдром удлиненного интервала QT (состояние, повышающее риск развития нерегулярного сердцебиения, которое может вызвать обморок или внезапную смерть) или другой тип нерегулярного сердцебиения или проблемы с сердечным ритмом, или если у вас есть или когда-либо были низкие уровни магния или калия в крови, сердечная недостаточность (СН; состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови в другие части тела) или заболевание печени.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время приема ондансетрона, позвоните своему врачу.

### **какие специальные диетические указания я должен соблюдать?**

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свою обычную диету.

### **Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?**

**Ондансетрон может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:**

- Головная боль
- запор
- сонливость
- ощущение холода или озноба
- боль, жжение, онемение или покалывание в руке или ноге
- жар
- боль в месте инъекции, покраснение, отек, тепло или жжение

**Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:**

- сыпь
- крапивница
- зуд
- отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, ног, лодыжек или голеней
- охриплость

- затрудненное дыхание или глотание
- боль в груди
- сбивчивое дыхание
- головокружение, бред или обмороки
- быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение
- помутнение зрения или потеря зрения
- головокружение
- волнение
- галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)
- жар
- чрезмерное потоотделение
- путаница
- тошнота, рвота или диарея
- потеря координации
- жесткие или подергивания мышц
- припадки
- кома (потеря сознания)

Ондансетрон может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во время использования этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

## Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Это лекарство будет храниться в больнице или клинике.

### п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

### Симптомы передозировки могут включать:

- внезапная потеря зрения на короткое время
- головокружение или легкомысленность

- обморок
- запор
- аритмия

### какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

### ранд имена

- Зофран®Инъекция

Последняя редакция: 15 января 2015 г.

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Инс. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

---

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.