

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Ondansetron-injektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

## Ondansetron Injektion

uttalas som (på dan' se tron)

### hur är denna medicin utskriven?

Ondansetron-injektion används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av cancerkemoterapi och kirurgi. Ondansetron är i en klass av läkemedel som kallas serotonin 5-HT<sub>3</sub>receptorantagonister. Det verkar genom att blockera verkan av serotonin, ett naturligt ämne som kan orsaka illamående och kräkningar.

### hur ska detta läkemedel användas?

Ondansetron kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) eller intramuskulärt (i en muskel) av en vårdgivare på ett sjukhus eller en klinik. När ondansetron används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi, ges det vanligtvis 30 minuter innan kemoterapin påbörjas. Ytterligare doser kan ges 4 timmar efter den första dosen av ondansetron och 8 timmar efter den första dosen av ondansetron, om det behövs. När ondansetron används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av operation, ges det vanligtvis strax före operationen. Ondansetron ges också ibland efter operation till patienter som upplever illamående och kräkningar och som inte fått ondansetron före operationen.

Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

#### Innan du använder ondansetron,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytiril), palonosetron (Aloxi) eller någon annan medicin: eller något av innehållsämnen i ondansetroninjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- tala om för din läkare om du får apomorfin (Apokyn). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte använda ondansetron om du får denna medicin.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: amiodaron (Cordarone, Pacerone); azitromycin (Zithromax); vissa mediciner mot anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) eller fenytoin (Dilantin); klorokin (Aralen); klorpromazin; citalopram (Celexa); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); diuretika ('vattenpiller'); erytromycin (EES, erythrocin, andra); fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); flekainid; haloperidol (Haldol); litium (Lithobid); mediciner för att behandla migrän såsom almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) och zolmitriptan (Zomig); Metylenblå;

mirtazapin (Remeron); monoaminoxidas (MAO)-hämmare inklusive isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypropromin (Parnate); moxifloxacin (Avelox); pentamidin (Nebu-Pent); pimozid (Orap); prokainamid; kinidin; rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); selektiva serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom desvenlafaxin (Khedezla, Pristiq), duloxetin (Cymbalta) och venlafaxin (Effexor XR); selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem, i Symbyax), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) och sertralín (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazin; tramadol (Conzip, Ultram, i Ultracet); och vandetanib (Caprelsa). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig mer noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med ondansetron, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

- tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft långt QT-syndrom (tillstånd som ökar risken för att utveckla oregelbundna hjärtslag som kan orsaka svimning eller plötslig död), eller annan typ av oregelbunden hjärtrytm eller hjärtrytmproblem, eller om du har eller någonsin har haft låga nivåer av magnesium eller kalium i ditt blod, hjärtsvikt (HF; tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till andra delar av kroppen) eller leversjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du får ondansetron, kontakta din läkare.

## **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din vanliga diet.

## **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Ondansetron kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- huvudvärk
- förstoppning
- dåsighet
- kyla eller frossa
- smärta, sveda, domningar eller stickningar i handen eller fötterna
- feber
- smärta, rodnad, svullnad, värme eller sveda på injektionsstället

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart eller sök akut medicinsk behandling:**

- utslag
- nässelfeber
- klåda
- svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga, svalg, händer, fötter, vristar eller underben
- heshet

- svårigheter att andas eller svälja
- bröstsmärta
- andnöd
- yrsel, yrsel eller svimning
- snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag
- dimsyn eller synförlust
- yrsel
- agitation
- hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)
- feber
- överdriven svettning
- förvirring
- illamående, kräkningar eller diarré
- förlust av koordination
- stela eller ryckande muskler
- anfall
- koma (förlust av medvetande)

Ondansetron kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

## **hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?**

Denna medicin kommer att förvaras på sjukhuset eller kliniken.

## **n nödfall/överdos**

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

### **Symtom på överdosering kan inkludera:**

- plötslig synförlust under en kort tid
- yrsel eller yrsel

- svimning
- förstoppning
- oregelbunden hjärtrytm

## hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## rand namn

- Zofran®Injektion

Senast reviderad - 2015-01-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022