



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 昂丹司琼注射液

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

昂丹司琼注射液

发音为 (on dan' se tron)

为什么要开这种药?

昂丹司琼注射液用于预防癌症化疗和手术引起的恶心和呕吐。昂丹司琼属于一类称为血清素 5-HT 的受体拮抗剂。它通过阻断血清素的作用起作用，血清素是一种可能引起恶心和呕吐的天然物质。

这个药应该怎么用?

昂丹司琼作为溶液（液体）由医院或诊所的医疗保健提供者静脉内（进入静脉）或肌肉内（进入肌肉）注射。当昂丹司琼用于预防化疗引起的恶心和呕吐时，通常在化疗开始前 30 分钟给药。如果需要，可在首剂昂丹司琼后 4 小时和首剂昂丹司琼后 8 小时给予额外剂量。当昂丹司琼用于预防手术引起的恶心和呕吐时，通常在手术前给予。昂丹司琼有时也会在手术后给予出现恶心和呕吐且在手术前未接受昂丹司琼的患者。

这种药物可用于其他用途。请向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在使用昂丹司琼之前，

- 如果您对昂丹司琼、阿洛司琼 (Lotronex)、多拉司琼 (Anzemet)、格拉司琼 (Kytril)、帕洛诺司琼 (Aloxi) 或任何其他药物：或昂丹司琼注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您正在接受阿扑吗啡 (Apokyn)，请告诉您的医生。如果您正在接受这种药物，您的医生可能会告诉您不要使用昂丹司琼。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：胺碘酮 (Cordarone, Pacerone)；阿奇霉素 (Zithromax)；某些用于癫痫发作的药物，例如卡马西平 (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) 或苯妥英 (Dilantin)；氯喹 (阿拉伦)；氯丙嗪；西酞普兰 (Celexa)；克拉霉素 (Biaxin, 在 Prevpac)；利尿剂 (“水丸”)；红霉素 (EES、红霉素等)；芬太尼 (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys)；氟卡尼；氟哌啶醇 (Haldol)；锂 (Lithobid)；治疗偏头痛的药物，如阿莫曲坦 (Axert)、依立曲坦 (Relpax)、佛罗曲坦 (Frova)、那拉曲坦 (Amerge)、利扎曲坦 (Maxalt)、舒马曲坦 (Imitrex) 和佐米曲坦 (Zomig)；亚甲蓝；

米氮平 (雷默龙) ; 单胺氧化酶 (MAO) 抑制剂, 包括异卡波肼 (Marplan)、利奈唑胺 (Zyvox)、苯乙肼 (Nardil)、司来吉兰 (Eldepryl、Emsam、Zelapar) 和反苯环丙胺 (Parnate); 莫西沙星 (Avelox) ; 喷他脒 (Nebu-Pent) ; 匹莫齐特 (Orap) ; 普鲁卡因胺; 奎尼丁; 利福平 (Rifadin, Rimactane, 在 Rifamate, 在 Rifater) ; 选择性5-羟色胺/去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs) , 例如去甲文拉法辛 (Khedezla, Pristiq) 、度洛西汀 (Cymbalta) 和文拉法辛 (Effexor XR) ; 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs) , 例如西酞普兰 (Celexa) 、依他普仑 (Lexapro) 、氟西汀 (Prozac、Sarafem、Symbyax) 、氟伏沙明 (Luvox) 、帕罗西汀 (Brisdelle、Paxil、Pexeva) 和舍曲林 (Zoloft) ; 索他洛尔 (Betapace, Sorine) ; 硫利达嗪; 曲马多 (Conzip, Ultram, 在 Ultracet 中) ; 和凡德他尼 (Caprelsa) 。您的医生可能需要改变您的药物剂量或更仔细地监测您的副作用。许多其他药物也可能与昂丹司琼相互作用, 因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物, 即使是那些未出现在此列表中的药物。

- 告诉您的医生您或您的家人是否患有或曾经患有长 QT 综合征 (这种情况会增加发生心律不齐的风险, 可能导致昏厥或猝死) , 或其他类型的心律不齐或心律问题, 或者如果您的血液中镁或钾含量过低、心力衰竭 (HF; 心脏无法将足够的血液泵送到身体其他部位的情况) 或肝脏疾病。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳, 请告诉您的医生。如果您在接受昂丹司琼期间怀孕, 请致电您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗?

除非您的医生另有说明, 否则请继续您的日常饮食。

这种药物会引起副作用吗?

昂丹司琼可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失, 请告诉您的医生:

- 头痛
- 便秘
- 睡意
- 感到寒冷或发冷
- 手或脚疼痛、灼热、麻木或刺痛
- 发烧
- 注射部位疼痛、发红、肿胀、发热或灼热

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状, 请立即致电您的医生或寻求紧急医疗:

- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 眼睛、脸、嘴唇、舌头、喉咙、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 嘶哑

- 呼吸或吞咽困难
- 胸痛
- 气促
- 头晕，头晕目眩或昏厥
- 心跳快、慢或不规则
- 视力模糊或视力丧失
- 头晕目眩
- 搅动
- 幻觉（看到不存在的事物或听到不存在的声音）
- 发烧
- 出汗过多
- 困惑
- 恶心、呕吐或腹泻
- 失去协调
- 肌肉僵硬或抽搐
- 癫痫发作
- 昏迷（意识丧失）

昂丹司琼可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您出现严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

这种药物将储存在医院或诊所。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括：

- 短时间内突然失明
- 头晕目眩

- 昏厥
- 便秘
- 心律不齐

我应该知道其他信息吗？

与您的医生保持所有约会。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 佐弗兰®注射

最后修订 - 2015 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日