

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

אורפנדרין מבוטא בתור (או fen' a dreen)

היי האם נרשמה תרופה זו?

הוא בקבוצה של תרופות הנקראות מרפי שרירי השלד. זה עובד על ידי שינוי האופן שבו הגוף חש כאבי שרירים. Orphenadrine משמש עם מנוחה, פיזיותרפיה ואמצעים אחרים כדי להקל על כאב ואי נוחות הנגרמים על ידי מתיחה, נקעים ופציעות שרירים אחרות Orphenadrine

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא. Orphenadrine מגיע כטבליה וטבליה בשחרור מורחב (ארוכת טווח) לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל פעמיים ביום. נסו ליטול אורפנדרין בערך באותן שעות בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח Orphenadrine

יש לבלוע את הטבליה בשחרור מורחב בשלמותן. אין לפצל, ללעוס או לכתוש אותם.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים. שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת אורפנדרין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לאורפנדרין, לכל תרופה אחרת, או לכל אחד מהמרכיבים בטבליה או אופנדרין או בטבליה בשחרור מורחב.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד לציין את כל אחד מהדברים הבאים: אמנטדין (סימדין, סימטרל), פלופנזין (פרוליקסין), הלופרידול (הלדול), תרופות להצטננות או אלרגיות, תרופות לדיכאון, פרפנזין (טרילפון), פרוכלורפרזין (קומפאזין), פרומתזין (פנרגן), תרופות הרגעה, כדורי שינה וטריפלופרזין (סטלאזין). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת מגלאוקומה; מיאסטניה גרביס; כיבים; חסימת דרכי שתן או מעיים; ערמונית מוגדלת; דופק לא סדיר; או מחלת כבד, כליות או לב.

- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת אורפנדרין, התקשר לרופא שלך.
- שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים והיתרונות של נטילת אורפנדרין אם אתה בן 65 ומעלה. מבוגרים יותר לא צריכים בדרך כלל לקחת orphenadrine כי זה לא בטוח כמו תרופות אחרות שניתן להשתמש בהן לטיפול באותו מצב.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל אורפנדרין.
- אתה צריך לדעת שהתרופה הזו עלולה לגרום לך לנמנם. אל תנהג במכונית או תפעיל מכונות עד שאתה יודע כיצד אורפנדרין ישפיע עליך.
- שאל את הרופא שלך לגבי השימוש הבטוח באלכוהול בזמן שאתה נוטל תרופה זו. אלכוהול יכול להחמיר את תופעות הלוואי של orphenadrine.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Orphenadrine

- פה יבש
- נומה
- סחרחורת או סחרחורת
- קלקול קיבה
- הקאה
- עצירות
- קושי במתן שתן
- ראייה מטושטשת
- כאב ראש

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא שלך מיד:

- דופק מהיר או לא סדיר
- התעלפות
- בלבול

- הזיות

- פריחה בעור

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

Orphenadrine עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם אתה נתקל בבעיות חריגות כלשהן במהלך הטיפול עם Orphenadrine.

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. (<http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>)

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>] אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, כמו גם כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תזונתיים אחרת.

תוספי תזונה. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- דיסיפל®
- נורפלקס®

שמות רנד של מוצרים משולבים

- Invagesic® (מכיל אספירין, קפאין, אורפנדרין)
- נורגזית® (מכיל אספירין, קפאין, אורפנדרין)
- יתום® (מכיל אספירין, קפאין, אורפנדרין)

¶-מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

מתוקן לאחרונה - 15/05/2017

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022