



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → オルフェナドリン

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

オルフェナドリン

(またはフェン'ドリン) と発音されます

なぜこの薬が処方されているのですか？

オルフェナドリンは、緊張、捻挫、およびその他の筋肉の損傷によって引き起こされる痛みや不快感を和らげるために、休息、理学療法、およびその他の手段とともに使用されます。オルフェナドリンは、骨格筋弛緩薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、体が筋肉痛を感じる方法を変えることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

オルフェナドリンは、錠剤と徐放性（長時間作用型）錠剤として経口摂取できます。通常、1日2回服用します。毎日ほぼ同じ時間にオルフェナドリンを服用してみてください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにオルフェナドリンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

オルフェナドリンを服用する前に、

- オルフェナドリン、その他の薬、またはオルフェナドリン錠や徐放性錠の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：アマンタジン（シマジン、シンメトレル）、フルフェナジン（プロリキシン）、ハロペリドール（ハルドール）、風邪やアレルギーの薬、うつ病の薬、ペルフェナジン（トリラフォン）、プロクロルペラジン（コンパジン）、プロメタジン（フェネルガン）、鎮静剤、睡眠薬、およびトリフルフェナジン（ステラジン）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 緑内障を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。重症筋無力症; 潰瘍; 尿路または腸の閉塞; 肥大した前立腺; 不整脈; または肝臓、腎臓、または心臓病。

- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。オルフェナドリンを服用中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- 65歳以上の場合、オルフェナドリンを服用することのリスクと利点について医師に相談してください。同じ状態を治療するために使用できる他の薬ほど安全ではないため、高齢者は通常オルフェナドリンを服用しないでください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、オルフェナドリンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- この薬はあなたを眠気にさせるかもしれないことを覚えておくべきです。オルフェナジンがどのように影響するかわかるまで、車を運転したり機械を操作したりしないでください。
- この薬を服用している間、アルコールの安全な使用について医師に相談してください。アルコールはオルフェナドリンの副作用を悪化させる可能性があります。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

オルフェナドリンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 口渇
- 眠気
- めまいや立ちくらみ
- 胃のむかつき
- 嘔吐
- 便秘
- 排尿困難
- ぼやけた視界
- 頭痛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 速いまたは不規則な心拍
- 失神
- 錯乱

- 幻覚
- 皮膚の発疹

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

オルフェナドリンは他の副作用を引き起こす可能性があります。オルフェナドリンによる治療中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。

サプリメント。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- Disipal®[¶]
- Norflex®[¶]

組み合わせ製品のランド名

- Invagesic® (アスピリン、カフェイン、オルフェナドリンを含む)
- Norgesic® (アスピリン、カフェイン、オルフェナドリンを含む)
- Orphengesic® (アスピリン、カフェイン、オルフェナドリンを含む) [¶]

[¶]-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2017年5月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日