



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Orfenadrina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

Orfenadrina

pronunciado como (ou fen' a dreen)

por que este medicamento é prescrito?

A orfenadrina é usada com repouso, fisioterapia e outras medidas para aliviar a dor e o desconforto causados por distensões, entorses e outras lesões musculares. Orfenadrina está em uma classe de medicamentos chamados relaxantes musculares esqueléticos. Funciona alterando a forma como o corpo sente a dor muscular.

como este medicamento deve ser usado?

Orfenadrina vem como um comprimido e um comprimido de liberação prolongada (ação prolongada) para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes ao dia. Tente tomar orfenadrina mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome orfenadrina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula os comprimidos de liberação prolongada inteiros. não os parta, mastigue ou esmague.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar orfenadrina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à orfenadrina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de orfenadrina ou comprimidos de liberação prolongada.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: amantadina (Symadine, Symmetrel), flufenazina (Prolixin), haloperidol (Haldol), medicamentos para resfriados ou alergias, medicamentos para depressão, perfenazina (Trilafon), proclorperazina (Compazine), prometazina (Fenergan) , sedativos, pílulas para dormir e trifluoperazina (Stelazina). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se tem ou já teve glaucoma; miastenia grave; úlceras; um bloqueio do trato urinário ou intestinal; uma próstata aumentada; batimentos cardíacos irregulares; ou doença hepática, renal ou cardíaca.

- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar orfenadrina, contacte o seu médico.
- converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de tomar orfenadrina se você tiver 65 anos de idade ou mais. Os adultos mais velhos geralmente não devem tomar orfenadrina porque não é tão seguro quanto outros medicamentos que podem ser usados para tratar a mesma condição.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar orfenadrina.
- você deve saber que este medicamento pode deixá-lo sonolento. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como a orfenadrina irá afetá-lo.
- pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de álcool enquanto estiver tomando este medicamento. O álcool pode piorar os efeitos colaterais da orfenadrina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Orfenadrina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- boca seca
- sonolência
- tontura ou vertigem
- dor de estômago
- vômito
- constipação
- dificuldade em urinar
- visão embaçada
- dor de cabeça

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- batimentos cardíacos rápidos ou irregulares
- desmaio
- confusão

- alucinações
- erupção cutânea

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

A orfenadrina pode causar outros efeitos colaterais. Contacte o seu médico se tiver quaisquer problemas involuntários durante o tratamento com orfenadrina.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista por escrito de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros produtos dietéticos.

suplementos. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Disipal®¶
- Norflex®¶

nomes rand de produtos combinados

- Invagésico®(contendo aspirina, cafeína, orfenadrina)
- Norgésico®(contendo aspirina, cafeína, orfenadrina)
- Orfengésico®(contendo aspirina, cafeína, orfenadrina)¶

¶-Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/05/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022