



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Orfenadrin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

orfenadrin

(veya fen' a dreen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Orfenadrin, suşların, burkulmaların ve diğer kas yaralanmalarının neden olduğu ağrı ve rahatsızlığı gidermek için dinlenme, fizik tedavi ve diğer önlemlerle birlikte kullanılır. Orfenadrin, iskelet kası gevşetici adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun kas ağrısını algılama şeklini değiştirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Orfenadrin, bir tablet ve ağızdan alınacak uzun süreli (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez alınır. Her gün aynı saatlerde orfenadrin almaya çalışın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Orfenadrin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz. bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Orfenadrin almadan önce,

- orfenadrine, diğer ilaçlara veya orfenadrin tabletlerdeki veya uzun salımlı tabletlerdeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amantadin (Symadine, Symmetrel), flufenazin (Prolixin), haloperidol (Haldol), soğuk algınlığı veya alerji ilaçları, depresyon ilaçları, perfenazin (Trilafon), proklorperazin (Compazine), prometazin (Phenergan) , yatıştırıcılar, uyku hapları ve trifluoperazin (Stelazine). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- glokomunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyin; miyastenia gravis; ülserler; idrar yolu veya bağırsak tıkanıklığı; genişlemiş prostat; düzensiz kalp atışı; veya karaciğer, böbrek veya kalp hastalığı.

- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Orfenadrin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
- 65 yaşında veya daha büyükseniz, orfenadrin almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun. Daha yaşlı yetişkinler genellikle orfenadrin almamalıdır çünkü aynı durumu tedavi etmek için kullanılacak diğer ilaçlar kadar güvenli değildir.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine orfenadrin aldığınızı söyleyin.
- Bu ilacın uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Orfenadrinin sizi nasıl etkileyeceğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.
- Bu ilacı alırken alkolün güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın. Alkol, orfenadrin yan etkilerini daha da kötüleştirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Orfenadrin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- kuru ağız
- uyuşukluk
- baş dönmesi veya baş dönmesi
- mide bulantısı
- kusma
- kabızlık
- idrar yapma zorluğu
- bulanık görme
- baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

- hızlı veya düzensiz kalp atışı
- bayılma
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon

- halüsinasyonlar
- deri döküntüsü

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Orfenadrin diğer yan etkilere neden olabilir. Orfenadrin ile tedaviniz sırasında olağandışı bir sorun yaşıyorsanız doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.

takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- disipal®¶
- Norflex®¶

kombinasyon ürünlerinin rand isimleri

- invajezik®(Aspirin, Kafein, Orfenadrin içerir)
- norgesic®(Aspirin, Kafein, Orfenadrin içerir)
- orfenjezik®(Aspirin, Kafein, Orfenadrin içerir)¶

¶-Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 05/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022