



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 奥芬那君

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

奥芬那君

发音为 (或 fen' a dreen)

为什么要开这种药?

奥芬那君与休息、物理治疗和其他措施一起使用,以缓解因拉伤、扭伤和其他肌肉损伤引起的疼痛和不适。奥芬那君属于一类称为骨骼肌松弛剂的药物。它通过改变身体感知肌肉疼痛的方式起作用。

这个药应该怎么用?

奥芬那君以片剂和缓释(长效)片剂的形式口服。通常每天服用两次。尝试每天大约在同一时间服用奥芬那君。仔细遵循处方标签上的说明,并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用奥芬那君。不要多吃或少吃,也不要比医生开的更频繁。

吞下整个缓释片。不要分裂、咀嚼或压碎它们。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途。请向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用奥芬那君之前,

- 如果您对奥芬那君、任何其他药物或奥芬那君片剂或缓释片剂中的任何成分过敏,请告诉您的医生和药剂师。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项:金刚烷胺(Symadine, Symmetrel),氟奋乃静(Prolixin),氟哌啶醇(Haldol),感冒或过敏药物,抑郁症药物,奋乃静(Trilafon),丙氯拉嗪(Compazine),异丙嗪(Phenergan)、镇静剂、安眠药和三氟拉嗪(Stelazine)。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有或曾经患有青光眼,请告诉您的医生;重症肌无力;溃疡;尿路或肠道阻塞;前列腺肥大;心律不齐;或肝脏、肾脏或心脏病。

- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用奥芬那君时怀孕，请致电您的医生。
- 如果您年满 65 岁，请与您的医生讨论服用奥芬那君的风险和益处。老年人通常不应服用奥芬那君，因为它不如可用于治疗相同疾病的其他药物安全。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用奥芬那君。
- 你应该知道这种药物可能会让你昏昏欲睡。在您了解奥芬那定对您的影响之前，请勿驾驶汽车或操作机器。
- 在您服用这种药物时，向您的医生询问安全使用酒精的问题。酒精会使奥芬那君的副作用更严重。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

奥芬那君可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 口干
- 睡意
- 头晕目眩
- 胃部不适
- 呕吐
- 便秘
- 排尿困难
- 模糊的视野
- 头痛

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：

- 快速或不规则的心跳
- 昏厥
- 困惑

- 幻觉
- 皮疹

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] 或通过电话 (1-800-332-1088))。

奥芬那君可能会引起其他副作用。如果您在使用奥芬那君治疗期间遇到任何异常问题，请致电您的医生。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要

补充。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 迪帕尔®[¶]
- 诺福克斯®[¶]

组合产品的名称

- 入侵者®（含阿司匹林、咖啡因、奥芬那君）
- 北欧语®（含阿司匹林、咖啡因、奥芬那君）
- 奥芬奇®（含阿司匹林、咖啡因、奥芬那君）[¶]

[¶] - 该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2017 年 5 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日