



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Orfenadrine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

## Orphenadrine

uitgesproken als (of fen' a dreen)

### hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Orphenadrine wordt gebruikt bij rust, fysiotherapie en andere maatregelen om pijn en ongemak veroorzaakt door verrekkingen, verstuikingen en andere spierblessures te verlichten. Orphenadrine zit in een klasse van medicijnen die skeletspierslappers worden genoemd. Het werkt door de manier te veranderen waarop het lichaam spierpijn waarneemt.

### hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Orphenadrine wordt geleverd als een tablet en een tablet met verlengde afgifte (langwerkende werking) om via de mond in te nemen. Het wordt meestal twee keer per dag ingenomen. Probeer orfenadrine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem orfenadrine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten met verlengde afgifte heel door. niet splitsen, kauwen of verpletteren.

### andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

### hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

#### Voordat u orfenadrine inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor orfenadrine, andere medicijnen of een van de ingrediënten in orfenadrine-tabletten of tabletten met verlengde afgifte.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: amantadine (Symadine, Symmetrel), flufenazine (Prolixin), haloperidol (Haldol), medicijnen tegen verkoudheid of allergieën, medicijnen tegen depressie, perfenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine), promethazine (Phenergan) , kalmerende middelen, slaappillen en trifluoperazine (Stelazine). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- vertel het uw arts als u glaucoom heeft of ooit heeft gehad; myasthenia gravis; zweren; een urineweg- of darmblokkade; een vergrote prostaat; een onregelmatige hartslag; of lever-, nier- of hartziekte.

- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u orfenadrine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- praat met uw arts over de risico's en voordelen van het gebruik van orfenadrine als u 65 jaar of ouder bent. Oudere volwassenen mogen orfenadrine gewoonlijk niet gebruiken omdat het niet zo veilig is als andere medicijnen die kunnen worden gebruikt om dezelfde aandoening te behandelen.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u orfenadrine gebruikt.
- u moet weten dat dit medicijn u slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed orfenadrine op u zal hebben.
- vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcohol terwijl u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen van orfenadrine verergeren.

## hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

### wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

**Orfenadrine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:**

- droge mond
- slaperigheid
- duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
- maagklachten
- braken
- constipatie
- moeite met urineren
- wazig zien
- hoofdpijn

**Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:**

- snelle of onregelmatige hartslag
- flauwvallen
- verwardheid

- hallucinaties
- huiduitslag

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

Orfenadrine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen ervaart tijdens uw behandeling met orfenadrine.

## **wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **n noodgeval/overdosis**

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

## **wat moet ik nog meer weten?**

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.

supplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

## randnamen

- Disipal®<sub>ik</sub>
- Norflex®<sub>ik</sub>

## randnamen van combinatieproducten

- Invagesic®(bevat aspirine, cafeïne, orfenadrine)
- Noorse®(bevat aspirine, cafeïne, orfenadrine)
- orphengetisch®(bevat aspirine, cafeïne, orfenadrine)<sub>ik</sub>

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-05-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



### [American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022