



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Orphenadrine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

Orphenadrine

binibigkas bilang (o fen' a dreen)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Orphenadrine ay ginagamit kasama ng pahinga, physical therapy, at iba pang mga hakbang upang mapawi ang sakit at discomfort na dulot ng mga strain, sprains, at iba pang mga pinsala sa kalamnan. Ang Orphenadrine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na skeletal muscle relaxant. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pakiramdam ng katawan ng pananakit ng kalamnan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Orphenadrine ay nagmumula bilang isang tablet at isang extended-release (long-acting) na tablet na iinum sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito ng dalawang beses sa isang araw. Subukang uminom ng orphenadrine sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng orphenadrine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Lunukin nang buo ang mga extended-release na tablet. huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng orphenadrine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa orphenadrine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa orphenadrine tablets o extended-release tablets.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amantadine (Symadine, Symmetrel), fluphenazine (Prolixin), haloperidol (Haldol), mga gamot para sa sipon o allergy, mga gamot para sa depression, perphenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine), promethazine (Phenergan) , sedatives, sleeping pills, at trifluoperazine (Stelazine). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng glaucoma; myasthenia gravis; mga ulser; isang urinary tract o pagbara ng bituka; isang pinalaki na prosteyt; isang hindi regular na tibok ng puso; o sakit sa atay, bato, o puso.

- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng orphenadrine, tawagan ang iyong doktor.
- kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng orphenadrine kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda. Ang mga matatanda ay hindi dapat karaniwang umiinom ng orphenadrine dahil ito ay hindi kasing-ligtas ng iba pang mga gamot na maaaring gamitin upang gamutin ang parehong kondisyon.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng orphenadrine.
- dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hangga't hindi mo alam kung paano makakaapekto sa iyo ang orphenadrine.
- tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng alkohol habang iniinom mo ang gamot na ito. Ang alkohol ay maaaring magpalala sa mga side effect ng orphenadrine.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Orphenadrine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- tuyong bibig
- antok
- pagkahilo o pagkahilo
- masakit ang tiyan
- pagsusuka
- pagtitibi
- hirap umihi
- malabong paningin
- sakit ng ulo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- mabilis o hindi regular na tibok ng puso
- nanghihina
- pagkalito

- guni-guni
- pantal sa balat

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ang Orphenadrine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang hindi pangkaraniwang mga problema sa panahon ng iyong paggamot sa orphenadrine.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong pamilya o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong pamilya o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandiyeta.

pandagdag. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Disipal®¶
- Norflex®¶

mga pangalan ng rand ng mga kumbinasyong produkto

- Invagesic®(naglalaman ng Aspirin, Caffeine, Orphenadrine)
- Norgesic®(naglalaman ng Aspirin, Caffeine, Orphenadrine)
- Orphengesic®(naglalaman ng Aspirin, Caffeine, Orphenadrine)¶

¶-Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 05/15/2017

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022