



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Orphénadrine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

Orphénadrine

prononcé comme (ou fen' a dreen)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'orphénadrine est utilisée avec le repos, la physiothérapie et d'autres mesures pour soulager la douleur et l'inconfort causés par les foulures, les entorses et autres blessures musculaires. L'orphénadrine appartient à une classe de médicaments appelés relaxants des muscles squelettiques. Il agit en modifiant la façon dont le corps ressent la douleur musculaire.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'orphénadrine se présente sous la forme d'un comprimé et d'un comprimé à libération prolongée (à action prolongée) à prendre par voie orale. Il est généralement pris deux fois par jour. Essayez de prendre de l'orphénadrine à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'orphénadrine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les comprimés à libération prolongée entiers. ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages. Demandez à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de l'orphénadrine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'orphénadrine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés d'orphénadrine ou les comprimés à libération prolongée.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : amantadine (Symadine, Symmetrel), fluphénazine (Prolixin), halopéridol (Haldol), médicaments contre le rhume ou les allergies, médicaments contre la dépression, perphénazine (Trilafon), prochlorpérazine (Compazine), prométhazine (Phenergan), sédatifs, somnifères et trifluopérazine (Stelazine). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un glaucome; myasthénie grave; ulcères; une obstruction des voies urinaires ou intestinales ; une hypertrophie de la prostate; un rythme cardiaque irrégulier; ou une maladie du foie, des reins ou du cœur.

- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de l'orphénadrine, appelez votre médecin.
- parlez à votre médecin des risques et des avantages de la prise d'orphénadrine si vous avez 65 ans ou plus. Les personnes âgées ne devraient généralement pas prendre d'orphénadrine car elle n'est pas aussi sûre que d'autres médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter la même maladie.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de l'orphénadrine.
- vous devez savoir que ce médicament peut vous rendre somnolent. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines tant que vous ne savez pas comment l'orphénadrine vous affectera.
- Demandez à votre médecin comment utiliser l'alcool en toute sécurité pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut aggraver les effets secondaires de l'orphénadrine.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'orphénadrine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- bouche sèche
- somnolence
- étourdissements ou étourdissements
- maux d'estomac
- vomissement
- constipation
- difficulté à uriner
- Vision floue
- mal de crâne

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin :

- rythme cardiaque rapide ou irrégulier
- évanouissement
- confusion

- hallucinations
- démangeaison de la peau

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

L'orphénadrine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous rencontrez des problèmes inhabituels pendant votre traitement par l'orphénadrine.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre (en vente libre) que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres produits diététiques.

suppléments. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Disipal®¶
- Norflex®¶

noms et noms de produits combinés

- Invagesique®(contenant de l'aspirine, de la caféine, de l'orphénadrine)
- norgésique®(contenant de l'aspirine, de la caféine, de l'orphénadrine)
- Orphengésique®(contenant de l'aspirine, de la caféine, de l'orphénadrine)¶

¶-Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 15/05/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022