



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Nhà](#) → [Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung](#) → Pegaspargase Tiêm

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html>

## Pegaspargase tiêm

phát âm là (chốt là 'par jase)

### hy có thuốc này được kê đơn không?

Pegaspargase được sử dụng cùng với các loại thuốc hóa trị khác để điều trị một loại bệnh bạch cầu cấp tính dòng lympho (ALL; một loại ung thư tế bào bạch cầu). Pegaspargase cũng được sử dụng với các loại thuốc hóa trị khác để điều trị một loại ALL nhất định ở những người đã có một số loại phản ứng dị ứng với các loại thuốc tương tự như pegaspargase như asparaginase (Elspar). Pegaspargase là một loại enzyme can thiệp vào các chất tự nhiên cần thiết cho sự phát triển của tế bào ung thư. Nó hoạt động bằng cách tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

### có nên sử dụng thuốc này không?

Pegaspargase có dạng chất lỏng để được bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện tiêm vào cơ hoặc truyền vào tĩnh mạch (vào tĩnh mạch) trong vòng 1 đến 2 giờ. Nó thường được tiêm không thường xuyên hơn 2 tuần một lần. Bác sĩ sẽ chọn lịch trình phù hợp nhất với bạn dựa trên phản ứng của bạn với thuốc.

Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

### nhịet sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

### tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

#### Trước khi nhận pegaspargase,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với pegaspargase, asparaginase (Elspar), bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm pegaspargase. Hỏi dược sĩ của bạn hoặc danh sách các thành phần.
- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng bị viêm tụy (sưng tụy), cục máu đông hoặc chảy máu nghiêm trọng, đặc biệt nếu những điều này xảy ra trong quá trình điều trị trước đó với asparaginase (Elspar). Bác sĩ của bạn có thể sẽ không muốn bạn nhận pegaspargase.

- cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Nếu bạn có thai khi đang dùng pegaspargase, hãy gọi cho bác sĩ.
- cho bác sĩ biết nếu bạn đang cho con bú. Bạn không nên cho con bú trong thời gian điều trị bằng pegaspargase.

## **hạt hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?**

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

## **hạt tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?**

**Pegaspargase có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:**

- buồn nôn
- nôn mửa
- bệnh tiêu chảy
- sốt
- mệt mỏi
- chóng mặt

**Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:**

- tổ ong
- phát ban da
- ngứa
- khàn tiếng
- khó thở hoặc nuốt
- đau đầu
- sưng mặt, cánh tay hoặc chân
- ngứa xủ
- đau ngực
- cơn đau liên tục bắt đầu ở vùng dạ dày, nhưng có thể lan ra sau lưng
- đi tiểu thường xuyên
- cơn khát tăng dần

Pegaspargase có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

## n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tại <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

### Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm:

- phát ban

## hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với pegaspargase.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

## tên rand

- Oncaspar®

## tên nhiệt

- PEG-L-asparaginase

Sửa đổi lần cuối - 15/12/2012

[Tìm hiểu cách trích dẫn trang này](#)



[Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm](#)

AHFS® Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022