



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 普鲁卡必利

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619011.html>

普卡必利

发音为 (proo kal' oh 骄傲)

为什么要开这种药?

普卢卡必利用于治疗慢性特发性便秘 (CIC; 持续 3 个月或更长时间且非由疾病或药物引起的大便困难或不经常排便)。普卢卡必利属于一类称为血清素受体激动剂的药物。它的作用是增加废物通过肠道的运动。

这个药应该怎么用?

普卢卡必利是一种口服片剂。它通常每天服用或不服用食物一次。每天大约在同一时间服用普卢卡必利。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用普卢卡必利。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途; 向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用普卡必利之前,

- 如果您对普卡必利、任何其他药物或普卡必利片剂中的任何成分过敏, 请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 告诉您的医生您的胃或肠道是否有洞或阻塞, 或肠道发炎, 例如克罗恩病 (身体攻击消化道内壁, 导致疼痛、腹泻、体重减轻、和发烧)、溃疡性结肠炎 (导致大肠内壁肿胀和溃疡的疾病) 或中毒性巨结肠或巨直肠 (危及生命的肠道或直肠扩张)。您的医生可能会告诉您不要服用普卢卡必利。

- 如果您患有或曾经患有抑郁症、自杀念头或行为（考虑伤害或自杀或计划或试图这样做），或其他情绪问题或肾脏疾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用普卢卡必利时怀孕，请致电您的医生。
- 您应该知道，在使用普卢卡必利治疗期间，您的心理健康可能会以意想不到的方式发生变化。如果您出现以下任何新症状或这些症状恶化，您、您的家人或您的护理人员应立即致电您的医生：抑郁症；考虑伤害或自杀，或计划或试图这样做；或情绪或行为的变化。确保您的家人或护理人员知道这些症状可能很严重，这样如果您无法自行寻求治疗，他们可以打电话给医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

普卡必利可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头痛
- 肚子痛
- 恶心
- 腹泻
- 头晕

一些副作用可能很严重。如果您出现任何这些症状或“特殊注意事项”部分中列出的症状，请停止服用普卢卡必利并立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 呼吸困难或呼吸急促
- 皮疹
- 瘙痒
- 麻疹
- 面部、嘴唇、舌头或喉咙肿胀

普卡必利可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您出现严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 头痛
- 恶心
- 腹泻

我应该知道其他信息吗？

与您的医生保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 湿度®

最后修订 - 2019 年 2 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022 年 3 月 25 日