Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611037.html

利匹韦林

发音为 (ril'' pi vir' een)

为什么要开这种药?

利匹韦林与其他药物一起用于治疗某些成年人和 12 岁及以上体重至少 77 磅（35 公斤）且过去未接受过抗逆转录病毒治疗的儿童的 1 型人类免疫缺陷病毒（HIV-1）。它还与 cabotegravir (Vocabria) 一起用作某些成年人 HIV-1 感染的短期治疗。利匹韦林属于一类称为非核苷类逆转录酶抑制剂 (NNRTIs) 的药物。它的作用是减少血液中的艾滋病毒含量。尽管利匹韦林不能治愈 HIV，但它可能会降低您患上获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 和 HIV 相关疾病（如严重感染或癌症）的机会。

这个药应该怎么用?

利匹韦林以片剂形式口服。它通常每天一次与一餐（不仅仅是蛋白质饮料）一起服用。当 rilpivirine 与 cabotegravir 一起服用时，通常每天随餐服用一次。每天大约在同一时间单独服用利匹韦林或与卡博特拉韦一起服用。Rilpivirine 与 cabotegravir 一起服用约 1 个月（至少 28 天），然后开始用这些药物的长效注射剂形式进行治疗，如果错过注射治疗计划超过 7 天，则服用长达 2 个月。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用利匹韦林。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

利匹韦林控制 HIV，但不能治愈它。即使您感觉良好，也要继续服用利匹韦林。不要在未咨询医生的情况下停止服用利匹韦林。当您的 rilpivirine 供应量开始减少时，请从您的医生或药剂师那里获得更多。如果您错过剂量或停止服用利匹韦林，您的病情可能会变得更难治疗。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用利匹韦林之前，

- 如果您对利匹韦林、任何其他药物或利匹韦林片剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您正在服用地塞米松（Decadron），请告诉您的医生；用于癫痫发作的药物，包括卡马西平（Carbatrol、Epitol、Euetro、Tegretol、Teril）、奥卡西平（Trileptal）、苯巴比妥（Luminal）或苯妥英（Dilantin、Phenytek）；质子泵抑制剂，包括右兰索拉唑（Dexilant）、埃索美拉唑（Nexium、Vimovo）、兰索拉唑（Prevacid）、奥美拉唑（Prilosec）、泮托拉唑（Protonix）或雷贝拉唑（Aciphex）；利福平（Rifater、Rifamate、Rimactane、Rifadin）；利福喷丁（Priftin）；和圣约翰草。如果您正在服用一种或多种这些药物，您的医生可能会告诉您不要服用利匹韦林。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：抗真菌药物，包括氟康唑 (Diflucan)、伊曲康唑 (Sporanox)、酮康唑 (Nizoral)、泊沙康唑 (Noxafil) 和伏立康唑 (Vfend)；胺碘酮（Nexterone、Pacerone）；阿那格雷（Agrylin）；氯喹；氯丙嗪；西洛他唑；环丙沙星（Cipro）；西酞普兰（Celexa）；克拉霉素（Biaxin）；丙吡胺（Norpace）；多非利特（Tikosyn）；多奈哌齐（Aricept）；红霉素（E-Mycin、Eryc、Ery-Tab、PCE、Pediazole）；氟卡尼（Tambocor）；氟哌啶醇（Haldol）；伊布利特（Corvert）；左氧氟沙星；美沙酮（多洛芬）；莫西沙星（Velox）；奈非那韦（Viracept）；昂丹司琼（Zuplenz，Zofran）；其他用于治疗 HIV/AIDS 的 NNRTIs 药物；喷他脒（NebuPent，Pentam）；匹莫齐特（Orap）；普鲁卡因胺；奎尼丁（Nuedexta）；利福布汀（Mycobutin）；索他洛尔（Betapace、Sorine、Sotylize）；泰利霉素（Ketek）；和硫利达嗪。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与利匹韦林相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是那些未出现在此列表中的药物。
- 如果您正在服用含有钙、镁或铝的抗酸剂（Maalox、Mylanta、Tums 等），请在利匹韦林之前至少 2 小时或之后 4 小时服用。
- 如果您正在服用治疗消化不良、胃灼热或溃疡的药物，例如西咪替丁 (Tagamet)、法莫替丁 (Pepcid)、尼扎替丁 (Axid) 或雷尼替丁 (Zantac)，请在利匹韦林之前至少 12 小时或之后至少 4 小时服用.
- 如果您正在服用去羟肌苷 (Videx)，请在利匹韦林之前至少 2 小时或之后至少 4 小时服用。
- 如果您患有或曾经患有抑郁症或其他精神疾病、肝脏疾病（包括乙型或丙型肝炎）或肾脏疾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕或计划怀孕，请告诉您的医生。如果您在服用利匹韦林时怀孕，请致电您的医生。如果您正在母乳喂养，请告诉您的医生。如果您感染 HIV 或正在服用利匹韦林，则不应进行母乳喂养。
- 您应该知道，您的身体脂肪可能会增加或移动到身体的不同部位，例如乳房、上背部和颈部，或身体中部。腿部、手臂和面部的脂肪也会减少。
- 您应该知道利匹韦林可能会导致您的思想、行为或心理健康发生变化。如果您在服用利匹韦林期间出现以下任何症状，请立即致电您的医生： 新的或恶化的抑郁症；感到悲伤、绝望、焦虑或不安；或考虑自杀或计划或尝试这样做。确保您的家人知道哪些症状可能很严重，这样如果您无法自行寻求治疗，他们可以打电话给您的医生。

- 您应该知道，当您服用治疗 HIV 感染的药物时，您的免疫系统可能会变得更强，并开始对抗已经存在于您体内的其他感染或导致其他情况发生。这可能会导致您出现这些感染或病症的症状。如果您在开始使用利匹韦林治疗后出现新的或恶化的症状，请务必告诉您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记得一餐就服用错过的剂量。但是，如果自上次服药后已超过 12 小时，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

利匹韦林可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 难以入睡或保持睡眠
- 头痛
- 恶心
- 呕吐
- 头晕
- 腹痛
- 睡意

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或“特殊注意事项”部分中列出的症状，请立即致电您的医生：

- 皮疹
- 皮肤或眼睛发黄、胃右侧疼痛、恶心、呕吐、浅色大便、深色尿液

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请停止服用利匹韦林并立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 皮疹**随着**发烧，面部，嘴唇，嘴巴，舌头或喉咙肿胀，水泡，呼吸或吞咽困难，口疮，眼睛发红或肿胀（结膜炎），胃（腹部）右侧疼痛，或深色尿液

利匹韦林可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离光线、过热和潮湿（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对利匹韦林的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保持手头的利匹韦林供应。不要等到药物用完后再补充处方。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 杜兰特®
- 胡鲁卡®（作为含有多替拉韦、利匹韦林的组合产品）

最后修订 - 2021 年 3 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制
用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部
美国国立卫生研究院
最后更新页面：2022 年 3 月 25 日