



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[집](#) → [약물, 허브 및 보조제](#) → 티아가빈

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

티아가빈

(ty ag' be)로 발음

이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

티아가빈은 부분 발작(간질의 일종)을 치료하기 위해 다른 약물과 함께 사용됩니다. 티아가빈은 항경련제라고 불리는 약물 종류에 속합니다. 티아가빈이 어떻게 작용하는지 정확히 알려져 있지 않지만 뇌에서 발작 활동을 예방하는 천연 화학 물질의 양을 증가시킵니다.

오 이 약을 사용해야합니까?

티아가빈은 경구 복용하는 정제로 제공됩니다. 보통 하루에 2-4번 음식과 함께 복용합니다. 그러나 치료 첫 주에는 티아가빈을 하루에 한 번만 복용합니다. 귀하가 정기적으로 복용해야 하는 티아가빈의 복용량에 도달할 때까지 의사는 천천히 복용량을 늘릴 것입니다(매주 1회 이하). 티아가빈 복용을 기억하는 데 도움이 되도록 매일 같은 시간에 복용하십시오. 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오. 지시대로 정확하게 티아가빈을 복용하십시오. 의사가 처방한 것보다 많거나 적게 복용하거나 더 자주 복용하지 마십시오.

기분이 좋아도 티아가빈을 계속 복용하십시오. 행동이나 기분의 비정상적인 변화와 같은 부작용이 발생하더라도 의사와 상의하지 않고 티아가빈 복용을 중단하지 마십시오. 이 약을 갑자기 중단하면 발작을 일으킬 수 있습니다. 의사는 아마도 복용량을 점차적으로 줄일 것입니다.

의사나 약사는 티아가빈 치료를 시작할 때와 처방을 다시 조제할 때마다 제조업체의 환자 정보 시트(약물 가이드)를 제공합니다. 정보를 주의 깊게 읽고 질문이 있는 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오. 미국 식품의약국(FDA) 웹사이트(<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) 또는 제조업체의 웹사이트에서 Medication Guide를 얻을 수 있습니다.

이 약의 용도

티아가빈은 다른 용도로 처방되어서는 안됩니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

모자 특별 예방 조치를 따라야 합니까?

티아가빈을 복용하기 전,

- 티아가빈이나 다른 약물에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려주세요.

항경련제 복용의 위험이 약을 복용하지 않는 위험보다 더 큰지 여부를 결정합니다. 귀하, 귀하의 가족 또는 간병인은 다음 증상 중 하나가 발생하면 즉시 의사에게 연락해야 합니다. 공황 발작; 동요 또는 안절부절; 새롭거나 악화되는 과민성, 불안 또는 우울증; 위험한 충동에 대한 행동; 잠들기 어렵거나 잠들기 어려움; 공격적이거나 화를 내거나 폭력적인 행동; 조증(광란, 비정상적으로 흥분된 기분); 자신을 다치게 하거나 삶을 끝내고 싶은 것에 대해 이야기하거나 생각합니다. 친구와 가족으로부터 철수; 죽음과 죽음에 대한 집착; 소중한 재산을 나눠주는 것; 또는 행동이나 기분의 기타 비정상적인 변화.

모자 특별 식단 지침을 따라야 합니까?

이 약을 복용하는 동안 자몽 주스를 마시는 것에 대해 의사와 상담하십시오.

복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

놓친 복용량을 기억하는 즉시 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 정기적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오. 두 번 이상 복용을 놓친 경우 의사에게 연락하여 약을 다시 시작하는 방법에 대한 지침을 받으십시오.

모자 부작용이 약물이 일으킬 수 있습니까?

티아가빈은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려십시오.

- 현기증 또는 현기증
- 졸음
- 에너지 부족 또는 약점
- 불안정함, 불안정함 또는 보행 장애를 유발하는 부조화
- 우울증
- 적대감 또는 분노
- 짜증
- 착란
- 집중하거나 주의를 기울이는 데 어려움
- 비정상적인 생각
- 말하기 또는 언어 문제
- 식욕 증가
- 메스꺼움
- 복통
- 신경질
- 잠들기 어렵거나 잠들지 못함

- 가려움
- 멍
- 고통스럽거나 잦은 배뇨

일부 부작용은 심각할 수 있습니다. 다음과 같은 증상은 드물지만 이러한 증상이 나타나면 즉시 의사에게 연락하십시오.

- 발진
- 입, 코, 눈 또는 목구멍 내부의 염증
- 독감과 유사한 증상
- 시력의 변화
- 심각한 약점
- 통제할 수 없는 악수
- 손이나 발의 마비, 통증, 작열감 또는 따끔거림
- 간질 상태를 포함한 발작

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 합니까?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 과도한 열과 습기가 없는 곳(화장실이 아님)에 보관하십시오.

많은 용기(주간 알약 관리, 점안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약은 어린이의 눈과 손이 닿지 않는 곳에 보관하는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하려면 항상 안전 캡을 잠그고 즉시 약을 안전한 장소에 두십시오.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

불필요한 약은 애완동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 번기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의 의약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

n 응급/과다복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다.<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

과다 복용의 증상은 다음과 같습니다.

- 피로
- 약점
- 불안정함, 불안정함 또는 보행 장애를 유발하는 부조화
- 통제할 수 없는 악수
- 착란
- 말하기 또는 언어 문제
- 동요
- 분노 또는 적대감
- 우울증
- 구토
- 의식 소실
- 비정상적이고 통제할 수 없는 근육 수축
- 일시적으로 움직일 수 없음(마비)
- 간질 상태를 포함한 발작

모자 다른 정보를 알아야합니까?

의사 및 검사실과의 모든 약속을 지키십시오.

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

랜드 이름

- 가비트릴®

최종 수정 - 2018년 1월 15일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일