



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Tiagabina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

Tiagabina

pronunciado como (ty ag' a been)

por que este medicamento é prescrito?

Tiagabina é usado em combinação com outros medicamentos para tratar convulsões parciais (um tipo de epilepsia). Tiagabina está em uma classe de medicamentos chamados anticonvulsivantes. Não se sabe exatamente como a tiagabina funciona, mas aumenta a quantidade de substâncias químicas naturais no cérebro que previnem a atividade convulsiva.

como este medicamento deve ser usado?

Tiagabina vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com alimentos duas a quatro vezes ao dia. No entanto, durante a primeira semana de tratamento só irá tomar tiagabina uma vez por dia. O seu médico irá aumentar lentamente a sua dose (não mais do que uma vez por semana) até atingir a dose de tiagabina que deve tomar regularmente. Para ajudá-lo a se lembrar de tomar tiagabina, tome-o na(s) mesma(s) hora(s) todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome tiagabina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Continue a tomar tiagabina mesmo que se sintam bem. Não pare de tomar tiagabina sem falar com o seu médico, mesmo se sentir efeitos secundários como alterações involuntárias no comportamento ou humor. A interrupção abrupta deste medicamento pode causar convulsões. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com tiagabina e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

outros usos para este medicamento

A tiagabina não deve ser prescrita para outros usos. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar tiagabina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à tiagabina ou a qualquer outro medicamento.

decidir se os riscos de tomar um medicamento anticonvulsivante são maiores do que os riscos de não tomar o medicamento. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: ataques de pânico; agitação ou inquietação; irritabilidade, ansiedade ou depressão nova ou agravada; agindo em impulsos perigosos; dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo; comportamento agressivo, raivoso ou violento; mania (humor frenético e anormalmente excitado); falar ou pensar em querer se machucar ou acabar com sua vida; afastamento de amigos e familiares; preocupação com a morte e o morrer; dando bens valiosos; ou quaisquer outras mudanças incomuns de comportamento ou humor.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda. Se você perdeu mais de uma dose, ligue para seu médico para obter instruções sobre como reiniciar sua medicação.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A tiagabina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- tontura ou vertigem
- sonolência
- falta de energia ou fraqueza
- oscilação, instabilidade ou incoordenação causando dificuldade para andar
- depressão
- hostilidade ou raiva
- irritabilidade
- confusão
- dificuldade de concentração ou atenção
- pensamento anormal
- problemas de fala ou linguagem
- aumento do apetite
- náusea
- dor de estômago
- nervosismo
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

- coceira
- contusão
- micção dolorosa ou frequente

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Os seguintes sintomas são incomuns, mas se você tiver algum deles, ligue para o seu médico imediatamente:

- irritação na pele
- feridas no interior da boca, nariz, olhos ou garganta
- sintomas como os da gripe
- mudanças na visão
- fraqueza severa
- apertando as mãos que você não pode controlar
- dormência, dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés
- convulsões, incluindo estado de mal epilético

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

- cansaço
- fraqueza
- oscilação, instabilidade ou incoordenação causando dificuldade para andar
- apertando as mãos que você não pode controlar
- confusão
- problemas de fala ou linguagem
- agitação
- raiva ou hostilidade
- depressão
- vômito
- perda de consciência
- contrações musculares anormais e incontroláveis
- incapacidade temporária de se mover (paralisia)
- convulsões, incluindo estado de mal epilético

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Gabitril®

Última revisão - 15/01/2018

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022