



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Тиагабин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

## Тиагабин

произносится как (ty ag' a ben)

### зачем назначают это лекарство?

Тиагабин используется в сочетании с другими лекарствами для лечения парциальных припадков (разновидность эпилепсии). Тиагабин относится к классу противосудорожных препаратов. Точно неизвестно, как работает тиагабин, но он увеличивает количество естественных химических веществ в мозгу, которые предотвращают судорожную активность.

### Как следует использовать это лекарство?

Тиагабин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают во время еды от двух до четырех раз в день. Однако в течение первой недели лечения вы будете принимать тиагабин только один раз в день. Ваш врач будет постепенно увеличивать вашу дозу (не чаще одного раза в неделю), пока вы не достигнете дозы тиагабина, которую вы должны принимать регулярно. Чтобы помочь вам не забыть принять тиагабин, принимайте его примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте тиагабин точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Продолжайте принимать тиагабин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием тиагабина, не посоветовавшись с врачом, даже если у вас возникнут такие побочные эффекты, как необычные изменения в поведении или настроении. Внезапное прекращение приема этого лекарства может вызвать судороги. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациентов (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение тиагабином и каждый раз, когда вы будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

### использование этого лекарства

Тиагабин не следует назначать для других целей. Попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

### Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать тиагабин,

- Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на тиагабин или какие-либо другие лекарства.

- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из следующих препаратов: амиодарон (кордарон, пацерон); противосудорожные препараты, такие как карбамазепин (тегретол), этосуксимид (заронтин), габапентин (нейронтин), ламотриджин (ламиктал), фенобарбитал (люминал, сольфотон), фенитоин (дилантин, фенитек), примидон (мизолин) и вальпроевая кислота (депакин, депакот); антихолинэстеразные средства, такие как неостигмин (простигмин), физостигмин (антилириум) и пиридостигмин (местинон, регонол); антидепрессанты; противогрибковые препараты, такие как флуконазол (Дифлюкан), итраконазол (Споранокс) и кетоконазол (Низорал); хлорохина сульфат (арален); кларитромицин (биаксин, в превпаке); контрастные красители, используемые во время радиологических процедур (компьютерная томография, рентген); циклоспорин (Неорал, Сандиммун); дексаметазон (декадрон, декспа); диазепам (валиум); диклоксациллин; дилтиазем (Кардизем, Дилакор, Тиазак, др.); эритромицин (ЕЭС, Е-мицин, эритроцин); фуросемид (лазикс); гризеофульвин (Фульвицин-У/Ф, Грифульвин В, Грис-ПЭГ); изониазид (INH, Ланиазид, Нидразид); имипенемциллатин (примаксин); ловастатин (Альтокор, Мевакор, Адавикор); лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, включая делавирдин (Rescriptor), эфавиренц (Sustiva), невирапин (Viramune) и ритонавир (Norvir, в Kaletra); лекарства, которые могут вызвать сонливость, такие как средства от кашля, простуды и аллергии, лекарства от беспокойства, миорелаксанты, обезболивающие, седативные средства, снотворные или транквилизаторы; лекарства от психических заболеваний; метокاربамол (робаксин); микофенолата мезифил (CellCept); пенициллины; фенилбутазон (больше не доступен в США); пропранолол (Индерал, индерид); хинидин (хинидекс); хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат). Индерид); хинидин (хинидекс); хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат). Индерид); хинидин (хинидекс); хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат). Индерид); хинидин (хинидекс); хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат). хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат). хинолоны, такие как хиноксацин (Cinobac) (больше не доступен в США), цiproфлоксацин (Cipro), эноксацин (Penetrex) (больше не доступен в США), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), налидикс кислота (NegGram) (больше не доступна в США), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (больше не доступна в США); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.); стимуляторы, такие как продукты, содержащие кофеин, и противозастойные средства; такролимус (Програф); триазолам (Гальцион); тролеандомицин (ТАО); верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан); варфарин (кумадин); или зафирлукаст (аколат).
- Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.
- сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была сильная сыпь, вызванная приемом лекарств; эпилептический статус (приступы следуют один за другим без перерыва); или болезни глаз или печени.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при приеме тиагабина, немедленно обратитесь к врачу.
- Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете тиагабин.
- Вы должны знать, что тиагабин может вызвать сонливость и может повлиять на вашу способность ясно мыслить. Не водите автомобиль и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как этот препарат повлияет на вас.
- помните, что алкоголь может усилить сонливость, вызванную этим лекарством. Спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете тиагабин.
- Вы должны знать, что судороги, включая эпилептический статус, произошли у людей без эпилепсии, которые принимают тиагабин. Эти припадки обычно возникали вскоре после начала лечения тиагабином или во время повышения дозы, но также возникали и в другое время во время лечения.
- вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, и вы можете стать суицидальным (думая о причинении вреда или самоубийстве или планировании или попытке сделать это), пока вы принимаете тиагабин для лечения эпилепсии, психических заболеваний или других состояний. Небольшое количество взрослых и детей в возрасте 5 лет и старше (около 1 из 500 человек), которые принимали противосудорожные препараты, такие как тиагабин, для лечения различных состояний во время клинических исследований, стали склонны к суициду во время лечения. У некоторых из этих людей появились суицидальные мысли и поведение уже через неделю после начала приема лекарства. Существует риск того, что ваше психическое здоровье может измениться, если вы принимаете противосудорожные препараты, такие как тиагабин, но также может существовать риск того, что ваше психическое здоровье изменится, если ваше состояние не будет лечиться. Вы и ваш врач будете

решить, превышает ли риск приема противосудорожного препарата риск отказа от приема препарата. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: приступы паники; возбуждение или беспокойство; новые или ухудшение раздражительности, тревоги или депрессии; воздействуя на опасные импульсы; трудности с засыпанием или сном; агрессивное, злое или насильственное поведение; мания (бешеное, ненормально возбужденное настроение); говорить или думать о желании причинить себе вред или покончить с собой; уход от друзей и семьи; озабоченность смертью и умиранием; раздача ценных вещей; или любые другие необычные изменения в поведении или настроении.

### **какие специальные диетические указания я должен соблюдать?**

Поговорите со своим врачом о употреблении грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

### **Что мне делать, если я забыл принять дозу?**

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если вы пропустили более одной дозы, позвоните своему врачу для получения инструкций о возобновлении приема лекарств.

### **Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?**

**Тиагабин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:**

- головокружение или легкомысленность
- сонливость
- недостаток энергии или слабость
- шаткость, неустойчивость или нарушение координации, вызывающие трудности при ходьбе
- депрессия
- враждебность или гнев
- раздражительность
- путаница
- трудности с концентрацией или вниманием
- ненормальное мышление
- проблемы с речью или языком
- повышенный аппетит
- тошнота
- боль в животе
- нервозность
- трудности с засыпанием или сном

- зуд
- кровоподтеки
- болезненное или частое мочеиспускание

**Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если вы испытываете любой из них, немедленно обратитесь к врачу:**

- сыпь
- язвы внутри рта, носа, глаз или горла
- гриппоподобные симптомы
- изменения в зрении
- сильная слабость
- рукопожатие, которое вы не можете контролировать
- онемение, боль, жжение или покалывание в руках или ногах
- судороги, в том числе эпилептический статус

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

## Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подале, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

### В экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

**Симптомы передозировки могут включать:**

- усталость
- слабость
- шаткость, неустойчивость или нарушение координации, вызывающие трудности при ходьбе
- рукопожатие, которое вы не можете контролировать
- путаница
- проблемы с речью или языком
- волнение
- гнев или враждебность
- депрессия
- рвота
- потеря сознания
- ненормальные, неконтролируемые мышечные сокращения
- временная неспособность двигаться (паралич)
- судороги, в том числе эпилептический статус

**какую другую информацию я должен знать?**

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

**ранд имена**

- Габитрил®

Последняя редакция — 15.01.2018

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

АНФС®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

---

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.