

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Tiagabine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

Tiagabine

uttalas som (ty ag' a been)

hur är denna medicin utskriven?

Tiagabine används i kombination med andra mediciner för att behandla partiella anfall (en typ av epilepsi). Tiagabin är i en klass av mediciner som kallas antikonvulsiva medel. Det är inte känt exakt hur tiagabin fungerar, men det ökar mängden naturliga kemikalier i hjärnan som förhindrar anfallsaktivitet.

hur ska detta läkemedel användas?

Tiagabine kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med mat två till fyra gånger om dagen. Under den första behandlingens vecka kommer du dock bara att ta tiagabin en gång om dagen. Din läkare kommer långsamt att öka din dos (inte oftare än en gång i veckan) tills du når den dos av tiagabin du ska ta regelbundet. För att hjälpa dig komma ihåg att ta tiagabin, ta det ungefär vid samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta tiagabin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Fortsätt att ta tiagabin även om du mår bra. Sluta inte ta tiagabin utan att prata med din läkare, även om du upplever biverkningar som ovanliga förändringar i beteende eller humör. Att plötsligt stoppa denna medicin kan orsaka anfall. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du börjar behandlingen med tiagabin och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administrations (FDA) webbplats (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

användningsområdena för detta läkemedel

Tiagabine ska inte förskrivas för annan användning. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar tiagabin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot tiagabin eller andra läkemedel.

avgöra om riskerna med att ta ett antikonvulsivt läkemedel är större än riskerna med att inte ta medicinen. Du, din familj eller din vårdgivare bör ringa din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom: panikattacker; agitation eller rastlöshet; ny eller förvärrad irritabilitet, ångest eller depression; agerar på farliga impulser; svårigheter att falla eller att sova; aggressivt, argt eller våldsamt beteende; mani (frenziert, onormalt upphetsat humör); pratar eller funderar på att vilja skada dig själv eller avsluta ditt liv; dra sig undan från vänner och familj; upptagen av döden och att dö; ge bort värdefulla ägodelar; eller andra ovanliga förändringar i beteende eller humör.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Om du har missat mer än en dos, ring din läkare för instruktioner om hur du återupptar din medicin.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Tiagabin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- yrsel eller yrsel
- dåsighet
- brist på energi eller svaghet
- vinglighet, ostadighet eller inkoordination som orsakar svårigheter att gå
- depression
- fientlighet eller ilska
- irritabilitet
- förvirring
- svårigheter att koncentrera sig eller uppmärksamma
- onormalt tänkande
- tal- eller språkproblem
- ökad aptit
- illamående
- magont
- nervositet
- svårt att somna eller att sova

- klåda
- blåmärken
- smärtsam eller frekvent urinering

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Följande symtom är ovanliga, men om du upplever något av dem, kontakta din läkare omedelbart:

- utslag
- sår på insidan av munnen, näsan, ögonen eller halsen
- influensaliknande symtom
- förändringar i synen
- allvarlig svaghet
- skakar hand du inte kan kontrollera
- domningar, smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter
- anfall, inklusive status epilepticus

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

- trötthet
- svaghet
- vinglighet, ostadighet eller inkoordination som orsakar svårigheter att gå
- skakar hand du inte kan kontrollera
- förvirring
- tal- eller språkproblem
- agitation
- ilska eller fientlighet
- depression
- kräkningar
- förlust av medvetande
- onormala, okontrollerbara muskelsammandragningar
- tillfällig oförmåga att röra sig (förlamning)
- anfall, inklusive status epilepticus

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Gabitril®

Senast reviderad - 2018-01-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering
för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022