



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [ไทกาไบน์](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

Tiagabine

ออกเสียงว่า (ty ag 'เบิน)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Tiagabine ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักบางส่วน (โรคลมชักชนิดหนึ่ง) Tiagabine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากันชัก ไม่ทราบแน่ชัดว่า tiagabine ทำงานอย่างไร แต่จะเพิ่มปริมาณสารเคมีธรรมชาติในสมองที่ป้องกันอาการชักได้

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Tiagabine มาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก มีรับประทานพร้อมอาหารวันละสองถึงสี่ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์แรกของการรักษา คุณจะทานไทกาไบน์เพียงวันละครั้งเท่านั้น แพทย์ของคุณจะค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ (ไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง) จนกว่าคุณจะได้รับขนาดยาไทกาไบน์ที่คุณต้องกินเป็นประจำ เพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องทานไทกาไบน์ ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ไทกาไบน์ ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

ทานไทกาไบน์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไทกาไบน์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่า คุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติ การหยุดยานี้กะทันหันอาจทำให้เกิดอาการชักได้ แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไทกาไบน์ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (<http://www.fda.gov/Drugs>) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สำหรับยานี้

ไม่ควรกำหนด Tiagabine สำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวด ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไทกาไบน์

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ไทกาไบน์หรือยาอื่นๆ

ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใช้ยากันชักมากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใช้ยาหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; กระทำต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธหรือรุนแรง ความบ้ำาค้าง (อารมณ์แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); พูดหรือคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตายและการตาย แจกสมบัติล้ำค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มน้ำเครพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทำอะไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด หากคุณพลาดยามากกว่า 1 ครั้ง ให้โทรหาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มใช้ยาใหม่

ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Tiagabine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- อาการวิงเวียนศีรษะหรือมีนหัว
- อาการง่วงนอน
- ขาดพลังงานหรือความอ่อนแอ
- ความโกลาหล ความไม่มั่นคง หรือการไม่ประสานกันทำให้เดินลำบาก
- ภาวะซึมเศร้า
- ความเกลียดชังหรือความโกรธ
- ความหงุดหงิด
- ความสับสน
- มีปัญหาในการจดจ่อหรือให้ความสนใจ
- ความคิดที่ผิดปกติ
- ปัญหาการพูดหรือภาษา
- เพิ่มความอยากอาหาร
- คลื่นไส้
- อาการปวดท้อง
- ความกังวลใจ
- นอนหลับยากหรือหลับยาก

- อาการคัน
- ช้ำ
- ปัสสาวะเจ็บปวดหรือบ่อย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- ผื่น
- แผลในปาก จมูก ตา หรือคอ
- อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- การมองเห็นเปลี่ยนไป
- ความอ่อนแออย่างรุนแรง
- จับมือกันควบคุมไม่ได้
- ชา ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า
- อาการชักรวมทั้งสถานะโรคลมชัก

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉนวนควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ลือคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- ความอ่อนแอ
- ความโกลาหล ความไม่มั่นคง หรือการไม่ประสานกันทำให้เดินลำบาก
- จับมือกันควบคุมไม่ได้
- ความสับสน
- ปัญหาการพูดหรือภาษา
- ความปั่นป่วน
- ความโกรธหรือความเกลียดชัง
- ภาวะซีมเศร้า
- อาเจียน
- หมดสติ
- การหดตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชั่วคราว (อัมพาต)
- อาการชักรวมทั้งสถานะโรคลมชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ทามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Gabitril®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022