

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Тиагабин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

## Тиагабин

произнася се като (ty ag' a been)

### защо е предписано това лекарство?

Тиагабин се използва в комбинация с други лекарства за лечение на парциални гърчове (вид епилепсия). Тиагабин е в клас лекарства, наречени антиконвулсанти. Не е известно точно как действа тиагабин, но увеличава количеството на естествените химикали в мозъка, които предотвратяват припадъците.

### как трябва да се използва това лекарство?

Tiagabine се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема с храна два до четири пъти на ден. Въпреки това, през първата седмица от лечението ще приемате тиагабин само веднъж дневно. Вашият лекар бавно ще увеличава дозата Ви (не по-често от веднъж седмично), докато достигнете дозата тиагабин, която трябва да приемате редовно. За да не забравяте да приемате тиагабин, приемайте го приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете тиагабин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Продължете да приемате тиагабин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на тиагабин, без да говорите с Вашия лекар, дори ако получите нежелани реакции като необичайни промени в поведението или настроението. Внезапното спиране на това лекарство може да причини гърчове. Вашият лекар вероятно ще намали дозата Ви постепенно.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), когато започнете лечение с тиагабин и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

### други употреби на това лекарство

Тиагабин не трябва да се предписва за други цели. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

### какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете тиагабин,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към тиагабин или други лекарства.

- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някои от следните: амиодарон (Cordarone, Pacerone); антиконвулсанти като карбамазепин (Tegretol), етосуцимид (Zarontin), габапентин (Neurontin), ламотрижин (Lamictal), фенобарбитал (Luminal, Solfoton), фенитоин (Dilantin, Phenytoin Phenytek), примидон (Mysoline) и валпроева киселина (Depakene, Depakote); антихолинестерази като неостигмин (Prostigmin), физостигмин (Antilirium) и пиридоистигмин (Mestinon, Regonol); антидепресанти; противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Sporanox) и кетоконазол (Nizoral); хлорохин сулфат (Aralen); кларитромицин (Biaxin, в Prevac); контрастни багрила, използвани по време на радиологични процедури (CAT сканиране, рентгенови лъчи); циклоспорин (Neoral, Sandimmune); дексаметазон (Decadron, Dexpak); диазепам (валиум); диклосацилин; дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac, други); еритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin); фуросемид (Lasix); гризеофулвин (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); изониазид (INH, Laniazid, Nydrizid); имипенемциластин (Primaxin); ловастатин (Altocor, Mevacor, в Advicor); лекарства за лечение на HIV инфекция, включително делавирдин (Rescriptor), ефавиренц (Sustiva), неврапин (Viramune) и ритонавир (Norvir, в Kaletra); лекарства, които могат да ви направят сънливи, като кашлица, настинка и алергични продукти, лекарства за тревожност, мускулни релаксанти, болкоуспокояващи, успокоителни, сънотворни или транквилизанти; лекарства за психични заболявания; метокарбамол (Робаксин); микрофенолат мофетил (CellCept); пеницилини; фенилбутазон (вече не се предлага в САЩ); пропранолол (Inderal, Inderide); хиинидин (Quinidex); хинолон като цинокаксин (Cinobac) (вече не се предлага в САЩ), цiproфлоксацин (Cipro), еноксацин (Penetrex) (вече не се предлага в САЩ), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), nalidix киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate), индерид; хиинидин (Quinidex); хинолон като цинокаксин (Cinobac) (вече не се предлага в САЩ), цiproфлоксацин (Cipro), еноксацин (Penetrex) (вече не се предлага в САЩ), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), nalidix киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate), индерид; хиинидин (Quinidex); хинолон като цинокаксин (Cinobac) (вече не се предлага в САЩ), цiproфлоксацин (Cipro), еноксацин (Penetrex) (вече не се предлага в САЩ), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), nalidix киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate), индерид; хиинидин (Quinidex); хинолон като цинокаксин (Cinobac) (вече не се предлага в САЩ), цiproфлоксацин (Cipro), еноксацин (Penetrex) (вече не се предлага в САЩ), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), nalidix киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate), индерид; хиинидин (Quinidex); хинолон като цинокаксин (Cinobac) (вече не се предлага в САЩ), цiproфлоксацин (Cipro), еноксацин (Penetrex) (вече не се предлага в САЩ), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), ломефлоксацин (Maxequin), nalidix киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate), ломефлоксацин (Maxequin), налидиксинова киселина (NegGram) (вече не се предлага в САЩ), норфлоксацин (Nogoxin), офлоксацин (Floxin), спарфлоксацин (Zagam) и комбинация тровафлоксацин/алатрофлоксацин (Trovan) (вече не се предлага в САЩ); рифабутин (Микобутин); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); стимуланти като съдържащи кофеин продукти и деконгестанти; такролимус (Prograf); триазолам (Halcion); тролеандомицин (TAO); верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); варфарин (Coumadin); или зафирлукаст (Accolate).
- кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.
- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали тежък обрив, причинен от прием на лекарство; епилептичен статус (гърчове, следващи един след друг без прекъсване); или заболяване на очите или черния дроб.
- уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате тиагабин, незабавно се обадете на Вашия лекар.
- ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате тиагабин.
- трябва да знаете, че тиагабин може да ви направи сънливи и може да повлияе на способността ви да мислите ясно. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ще ви повлияе това лекарство.
- не забравяйте, че алкохолът може да увеличи сънливостта, причинена от това лекарство. Попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате тиагабин.
- трябва да знаете, че при хора без епилепсия, които приемат тиагабин, са се появили припадъци, включително епилептичен статус. Тези гърчове обикновено се появяват скоро след началото на лечението с тиагабин или близо до момента на повишаване на дозата, но също така са се появявали и в други моменти по време на лечението.
- трябва да знаете, че психичното Ви здраве може да се промени по неочаквани начини и може да станете склонни към самоубийство (да мислите за самонараняване или самоубийство или да планирате или се опитвате да го направите), докато приемате тиагабин за лечение на епилепсия, психично заболяване или други състояния. Малък брой възрастни и деца на възраст 5 и повече години (около 1 на 500 души), които са приемали антиконвулсанти като тиагабин за лечение на различни състояния по време на клинични проучвания, стават суицидни по време на лечението си. Някои от тези хора развиха суицидни мисли и поведение още една седмица след като започнаха да приемат лекарството. Съществува риск да изпитате промени в психичното си здраве, ако приемате антиконвулсивно лекарство като тиагабин, но също така може да има риск да изпитате промени в психичното си здраве, ако състоянието ви не се лекува. Вие и Вашият лекар ще го направите

да реши дали рисковете от приема на антиконвулсанти са по-големи от рисковете от не приемане на лекарството. Вие, вашето семейство или вашият болногледач трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако изпитате някой от следните симптоми: пристъпи на паника; възбуда или безпокойство; нова или влошаваща се раздразнителност, тревожност или депресия; действия на опасни импулси; затруднено заспиване или заспиване; агресивно, гневно или насилствено поведение; мания (безумно, необичайно възбудено настроение); говорене или мислене за желанието да се нараните или да сложите край на живота си; оттегляне от приятели и семейство; загриженост за смъртта и умирането; раздаване на ценни вещи; или всякакви други необичайни промени в поведението или настроението.

### **какви специални диетични инструкции трябва да следвам?**

Говорете с Вашия лекар относно пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

### **какво да правя, ако пропусна доза?**

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако сте пропуснали повече от една доза, обадете се на Вашия лекар за инструкции относно повторното започване на лечението.

### **какви странични ефекти може да причини това лекарство?**

**Тиагабин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:**

- световъртеж или замаяност
- сънливост
- липса на енергия или слабост
- клатене, нестабилност или некоординация, причиняващи затруднения при ходене
- депресия
- враждебност или гняв
- раздразнителност
- объркване
- затруднено концентриране или обръщане на внимание
- ненормално мислене
- говорни или езикови проблеми
- повишен апетит
- гадене
- стомашни болки
- нервност
- затруднено заспиване или оставане на заспиване

- сърбеж
- натъртване
- болезнено или често уриниране

**Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните симптоми са необичайни, но ако получите някой от тях, незабавно се обадете на Вашия лекар:**

- обрив
- рани от вътрешната страна на устата, носа, очите или гърлото
- грипозодобни симптоми
- промени в зрението
- силна слабост
- рѝкостискане, което не можете да контролирате
- изтрѝпване, болка, парене или изтрѝпване в рѝцете или краката
- гърчове, включително епилептичен статус

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

## **какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?**

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътнo затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и обсега.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

## **п случай на спешен случай/предозирание**

В случай на предозирание се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

**Симптомите на предозиране могат да включват:**

- умора
- слабост
- клатене, нестабилност или некоординация, причиняващи затруднения при ходене
- ръкостискане, което не можете да контролирате
- объркване
- говорни или езикови проблеми
- възбуда
- гняв или враждебност
- депресия
- повръщане
- загуба на съзнание
- необичайни, неконтролируеми мускулни контракции
- временна невъзможност за движение (парализа)
- гърчове, включително епилептичен статус

**каква друга информация трябва да знам?**

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

**рандови имена**

- Габитрил®

Последна редакция - 15.01.2018 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

---

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г