



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 噻加宾

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

## 噻加宾

发音为 (ty ag' a be)

### 为什么要开这种药?

Tiagabine 与其他药物联合使用以治疗部分性癫痫发作（一种癫痫）。Tiagabine 属于一类称为抗惊厥药的  
药物。目前尚不清楚 tiagabine 的确切工作原理，但会增加大脑中防止癫痫发作的天然化学物质的数量。

### 这个药应该怎么用?

Tiagabine 是一种口服片剂。它通常与食物一起服用，每天 2 到 4 次。但是，在治疗的第一周，您每天只能服用  
一次 tiagabine。您的医生会慢慢增加您的剂量（每周不超过一次），直到您达到定期服用的 tiagabine 剂量。为  
了帮助您记住服用 tiagabine，请每天大约在同一时间服用。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂  
师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用 tiagabine。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

即使您感觉良好，也要继续服用 tiagabine。请勿在未咨询医生的情况下停止服用 tiagabine，即使您出现行  
为或情绪异常变化等副作用。突然停止这种药物会导致癫痫发作。您的医生可能会逐渐减少您的剂量。

当您开始使用 tiagabine 治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指  
南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品药品监督管理局 (FDA)  
网站 (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) 或制造商的网站获取用药指南。

### 该药的其他用途

不应将 Tiagabine 用于其他用途。请向您的医生或药剂师咨询更多信息。

### 我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用噻加宾之前，

- 如果您对 tiagabine 或任何其他药物过敏，请告诉您的医生和药剂师。

- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素和营养补充剂。一定要提及以下任何一种：胺碘酮 (Cordarone, Pacerone)；抗惊厥药，例如卡马西平 (Tegretol)，乙琥胺 (Zarontin)，加巴喷丁 (Neurontin)，拉莫三嗪 (Lamictal)，苯巴比妥 (Luminal, Solfoton)，苯妥英 (Dilantin, Phenytek)、扑米酮 (Mysoline) 和丙戊酸 (Depakene, Depakote)；抗胆碱酯酶，例如新斯的明 (Prostigmin)、毒扁豆碱 (Antilirium) 和吡啶斯的明 (Mestinon, Regonol)；抗抑郁药；抗真菌药，如氟康唑 (Diflucan)、伊曲康唑 (Sporanox) 和酮康唑 (Nizoral)；硫酸氯喹 (Aralen)；克拉霉素 (Biaxin, 在 Prevpac)；放射学过程中使用的对比染料 (CAT 扫描、X 射线)；环孢素 (Neoral, Sandimmune)；地塞米松 (Decadron, Dexpak)；地西洋 (安定)；双氯西林；地尔硫卓 (Cardizem, Dilacor, Tiazac 等)；红霉素 (EES, E-Mycin, Erythrocin)；速尿 (Lasix)；灰黄霉素 (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG)；异烟肼 (INH, Laniazid, Nydravid)；亚胺培南司他丁 (Primaxin)；洛伐他汀 (Altacor, Mevacor, 在 Advicor)；治疗 HIV 感染的药物，包括地拉韦定 (Rescriptor)、依非韦伦 (Sustiva)、奈韦拉平 (Viramune) 和利托那韦 (Norvir, in Kaletra)；可能使您昏昏欲睡的药物，例如咳嗽、感冒和过敏产品、焦虑药物、肌肉松弛剂、止痛药、镇静剂、安眠药或镇静剂；精神疾病药物；美索巴莫 (Robaxin)；萘酚胺 (CellCept)；青霉素；保泰松 (美国不再提供)；普萘洛尔 (Inderal, Inderide)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。内嵌)；奎尼丁 (Quinidex)；唑诺酮类药物，如西诺沙星 (Cinobac) (美国不再提供)、环丙沙星 (Cipro)、依诺沙星 (Penetrex) (美国不再提供)、加替沙星 (Tequin)、左氧氟沙星 (Levaquin)、洛美沙星 (Maxequin)、萘啶酸 (NegGram) (美国不再提供)、诺氟沙星 (Noroxin)、氧氟沙星 (Floxin)、司帕沙星 (Zagam) 和曲伐沙星/阿拉曲沙星组合 (Trovan) (美国不再提供)；利福布汀 (Mycobutin)；利福平 (Rifadin, Rifamate, Rimactane 等)；兴奋剂，例如含咖啡因的产品和减充血剂；他克莫司 (Prograf)；三唑仑 (Halcion)；木霉毒素 (TAO)；维拉帕米 (Calan, Covera, Isoptin, Verelan)；华法林 (香豆素)；或扎鲁司特 (Accolate)。

- 告诉您的医生您正在服用什么草药产品，尤其是圣约翰草。
- 告诉您的医生您是否曾经或曾经因服药引起严重皮疹；癫痫持续状态（连续不断的癫痫发作）；或眼睛或肝脏疾病。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用 tiagabine 时怀孕，请立即致电您的医生。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用 tiagabine。
- 您应该知道，tiagabine 可能会使您昏昏欲睡，并可能影响您清晰思考的能力。在您知道这种药物将如何影响您之前，请勿驾驶汽车或操作机器。
- 请记住，酒精可能会增加这种药物引起的嗜睡。在您服用 tiagabine 时，请向您的医生询问安全使用酒精饮料的问题。
- 您应该知道，服用 tiagabine 的非癫痫患者会出现癫痫发作，包括癫痫持续状态。这些癫痫发作通常在开始使用噻加宾治疗后不久或接近剂量增加时发生，但也发生在治疗期间的其他时间。
- 您应该知道，当您服用 tiagabine 治疗癫痫、精神疾病或其他疾病时，您的心理健康可能会以意想不到的方式发生变化，并且您可能会自杀（考虑伤害或自杀或计划或试图这样做）。在临床研究期间服用噻加宾等抗惊厥药治疗各种疾病的少数成人和 5 岁及以上儿童（约 500 人中有 1 人）在治疗期间自杀。其中一些人在开始服药一周后就出现了自杀念头和行为。如果您服用 tiagabine 等抗惊厥药物，您的心理健康可能会发生变化，但是，如果您的病情没有得到治疗，您的心理健康也可能发生变化。您和您的医生将

决定服用抗惊厥药物的风险是否大于不服用药物的风险。如果您出现以下任何症状，您、您的家人或您的护理人员应立即致电您的医生：惊恐发作；激动或不安；新的或恶化的易怒、焦虑或抑郁；根据危险的冲动行事；难以入睡或保持睡眠；攻击性、愤怒或暴力行为；躁狂症（疯狂、异常兴奋的情绪）；谈论或考虑想要伤害自己或结束自己的生命；远离朋友和家人；专注于死亡和死亡；赠送珍贵的财产；或任何其他不寻常的行为或情绪变化。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗？

与您的医生讨论服用这种药物时喝葡萄柚汁的问题。

## 如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。如果您错过了不止一剂，请致电您的医生以获取有关重新开始服药的说明。

## 这种药物会引起副作用吗？

**噻加宾可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 头晕目眩
- 睡意
- 缺乏活力或虚弱
- 摇晃、不稳或不协调导致行走困难
- 沮丧
- 敌意或愤怒
- 易怒
- 困惑
- 难以集中注意力或注意力
- 异常思维
- 言语或语言问题
- 食欲增加
- 恶心
- 肚子痛
- 紧张
- 难以入睡或保持睡眠

- 瘙痒
- 瘀血
- 排尿疼痛或尿频

**一些副作用可能很严重。以下症状并不常见，但如果您遇到任何症状，请立即致电您的医生：**

- 皮疹
- 口腔、鼻子、眼睛或喉咙内侧的疮
- 流感样症状
- 视力变化
- 严重虚弱
- 握手你无法控制
- 手脚麻木、疼痛、灼热或刺痛
- 癫痫发作，包括癫痫持续状态

如果您出现严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

## n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

## 过量服用的症状可能包括：

- 疲倦
- 弱点
- 摇晃、不稳或不协调导致行走困难
- 握手你无法控制
- 困惑
- 言语或语言问题
- 搅动
- 愤怒或敌意
- 沮丧
- 呕吐
- 意识丧失
- 异常的、无法控制的肌肉收缩
- 暂时无法移动（瘫痪）
- 癫痫发作，包括癫痫持续状态

## 我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 加必利®

最后修订 - 2018 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

---

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日