

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Tiagabine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

## Tiagabine

uitgesproken als (ty ag' a been)

### hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Tiagabine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen om partiële aanvallen (een vorm van epilepsie) te behandelen.

Tiagabine zit in een klasse van medicijnen die anticonvulsiva worden genoemd. Het is niet precies bekend hoe tiagabine werkt, maar het verhoogt de hoeveelheid natuurlijke chemicaliën in de hersenen die epileptische activiteit voorkomen.

### hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Tiagabine wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk twee tot vier keer per dag met voedsel ingenomen. Tijdens de eerste week van de behandeling zult u tiagabine echter slechts eenmaal per dag innemen. Uw arts zal uw dosis langzaam verhogen (niet vaker dan eenmaal per week) totdat u de dosis tiagabine bereikt die u regelmatig moet innemen. Om u te helpen herinneren dat u tiagabine moet innemen, moet u het elke dag rond dezelfde tijd(en) innemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem tiagabine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Blijf tiagabine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van tiagabine zonder met uw arts te overleggen, ook niet als u bijwerkingen ervaart zoals ongewone gedrags- of stemmingsveranderingen. Abrupt stoppen met dit medicijn kan epileptische aanvallen veroorzaken. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk verlagen.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met tiagabine en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

### andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Tiagabine mag niet worden voorgeschreven voor ander gebruik. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

### hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

#### Voordat u tiagabine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor tiagabine of voor andere medicijnen.

- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: amiodaron (Cordarone, Pacerone); anticonvulsiva zoals carbamazepine (Tegretol), ethosuximide (Zarontin), gabapentine (Neurontin), lamotrigine (Lamictal), fenobarbital (Luminal, Solfoton), fenytoïne (Dilantin, Phenytek), primidon (Mysoline) en valproïnezuur (Depakene, Depakote); anticholinesterasen zoals neostigmine (Prostigmin), physostigmine (Antilirium) en pyridostigmine (Mestinox, Regonol); antidepressiva; antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) en ketoconazol (Nizoral); chloroquinesulfaat (Aralen); claritromycine (Biaxin, in Pevpac); contrastkleurstoffen die worden gebruikt tijdens radiologische procedures (CAT-scans, röntgenfoto's); ciclosporine (Neoral, Sandimmune); dexamethason (Decadron, Dexpak); diazepam (Valium); dicloxacilline; diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, anderen); erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin); furosemide (Lasix); griseofulvine (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); isoniazide (INH, Laniazid, Nydrzid); imipenemcilastatine (Primaxin); lovastatine (Altacor, Mevacor, in Advicor); medicijnen om HIV-infectie te behandelen, waaronder delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva), nevirapine (Viramune) en ritonavir (Norvir, in Kaletra); medicijnen die u slaperig kunnen maken, zoals hoest-, verkoudheids- en allergieproducten, medicijnen tegen angst, spierslappers, pijnstillers, kalmerende middelen, slaappillen of kalmeringsmiddelen; medicijnen voor psychische aandoeningen; methocarbamol (Robaxin); mycofenolaatmofetil (CellCept); penicillines; fenybutazon (niet meer verkrijgbaar in de VS); propranolol (Inderal, Inderide); kinidine (Quinidex); chinolonen zoals cinoxacin (Cinobac) (niet meer verkrijgbaar in de VS), ciprofloxacine (Cipro), enoxacin (Penetrex) (niet meer verkrijgbaar in de VS), gatifloxacine (Tequin), levofloxacine (Levaquin), lomefloxacine (Maxequin), nalidixinezuur (NegGram) (niet langer verkrijgbaar in de VS), norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), sparfloxacine (Zagam) en trovafloxacine/atrofloxacine combinatie (Trovan) (niet langer verkrijgbaar in de VS); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); stimulerende middelen zoals cafeïnehoudende producten en decongestiva; tacrolimus (Prograf); triazolam (Halcion); troleandomycine (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); warfarine (Coumadin); of zafirlukast (Accolate), Inderide; kinidine (Quinidex); chinolonen zoals cinoxacin (Cinobac) (niet meer verkrijgbaar in de VS), ciprofloxacine (Cipro), enoxacin (Penetrex) (niet meer verkrijgbaar in de VS), gatifloxacine (Tequin), levofloxacine (Levaquin), lomefloxacine (Maxequin), nalidixinezuur (NegGram) (niet langer verkrijgbaar in de VS), norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), sparfloxacine (Zagam) en trovafloxacine/atrofloxacine combinatie (Trovan) (niet langer verkrijgbaar in de VS); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); stimulerende middelen zoals cafeïnehoudende producten en decongestiva; tacrolimus (Prograf); triazolam (Halcion); troleandomycine (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); warfarine (Coumadin); of zafirlukast (Accolate), Inderide; kinidine (Quinidex); chinolonen zoals cinoxacin (Cinobac) (niet meer verkrijgbaar in de VS), ciprofloxacine (Cipro), enoxacin (Penetrex) (niet meer verkrijgbaar in de VS), gatifloxacine (Tequin), levofloxacine (Levaquin), lomefloxacine (Maxequin), nalidixinezuur (NegGram) (niet langer verkrijgbaar in de VS), norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), sparfloxacine (Zagam) en trovafloxacine/atrofloxacine combinatie (Trovan) (niet langer verkrijgbaar in de VS); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); stimulerende middelen zoals cafeïnehoudende producten en decongestiva; tacrolimus (Prograf); triazolam (Halcion); troleandomycine (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); warfarine (Coumadin); of zafirlukast (Accolate), chinolonen zoals cinoxacin (Cinobac) (niet meer verkrijgbaar in de VS), ciprofloxacine (Cipro), enoxacin (Penetrex) (niet meer verkrijgbaar in de VS), gatifloxacine (Tequin), levofloxacine (Levaquin), lomefloxacine (Maxequin), nalidixinezuur (NegGram) (niet langer verkrijgbaar in de VS), norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), sparfloxacine (Zagam) en trovafloxacine/atrofloxacine combinatie (Trovan) (niet langer verkrijgbaar in de VS); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); stimulerende middelen zoals cafeïnehoudende producten en decongestiva; tacrolimus (Prograf); triazolam (Halcion); troleandomycine (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); warfarine (Coumadin); of zafirlukast (Accolate), lomefloxacine (Maxequin), nalidixinezuur (NegGram) (niet langer verkrijgbaar in de VS), norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), sparfloxacine (Zagam) en trovafloxacine/atrofloxacine combinatie (Trovan) (niet meer verkrijgbaar in de VS); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); stimulerende middelen zoals cafeïnehoudende producten en decongestiva; tacrolimus (Prograf); triazolam (Halcion); troleandomycine (TAO); verapamil
- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
- vertel het uw arts als u ernstige huiduitslag heeft of ooit heeft gehad als gevolg van het gebruik van een medicijn; status epilepticus (aanvallen die elkaar zonder onderbreking opvolgen); of oog- of leverziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u tiagabine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u tiagabine gebruikt.
- u moet weten dat tiagabine u slaperig kan maken en uw vermogen om helder te denken kan beïnvloeden. Bestuur geen auto en bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft.
- onthoud dat alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid die door dit medicijn wordt veroorzaakt. Vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken terwijl u tiagabine gebruikt.
- u moet weten dat epileptische aanvallen, waaronder status epilepticus, zijn opgetreden bij mensen zonder epilepsie die tiagabine gebruiken. Deze aanvallen traden gewoonlijk kort na het begin van de behandeling met tiagabine of tegen het tijdstip van een dosisverhoging op, maar zijn ook op andere momenten tijdens de behandeling opgetreden.
- u moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen en dat u suïcidaal kunt worden (denk aan zelfmoord of zelfmoord, of plannen of proberen te doen) terwijl u tiagabine gebruikt voor de behandeling van epilepsie, geestesziekte of andere aandoeningen. Een klein aantal volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder (ongeveer 1 op de 500 mensen) die tijdens klinische onderzoeken anticonvulsiva zoals tiagabine gebruikten om verschillende aandoeningen te behandelen, werden suïcidaal tijdens hun behandeling. Sommige van deze mensen ontwikkelden al in een week nadat ze met de medicatie begonnen zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag. Het risico bestaat dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als u anticonvulsiva gebruikt zoals tiagabine, maar er kan ook een risico zijn dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als uw aandoening niet wordt behandeld. U en uw arts zullen

beslissen of de risico's van het nemen van een anti-epilepticum groter zijn dan de risico's van het niet nemen van de medicatie. U, uw familie of uw verzorger moeten onmiddellijk uw arts bellen als u een van de volgende symptomen ervaart: paniekaanvallen; agitatie of rusteloosheid; nieuwe of verergerende prikkelbaarheid, angst of depressie; handelen op gevaarlijke impulsen; moeite met inslapen of doorslapen; agressief, boos of gewelddadig gedrag; manie (uitzinnige, abnormaal opgewonden stemming); praten of denken over jezelf pijn willen doen of je leven willen beëindigen; terugtrekken van vrienden en familie; preoccupatie met dood en sterven; het weggeven van waardevolle bezittingen; of andere ongewone veranderingen in gedrag of stemming.

## hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.

### wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u meer dan één dosis heeft gemist, neem dan contact op met uw arts voor instructies over het opnieuw starten van uw medicatie.

### wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

**Tiagabine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:**

- duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
- slaperigheid
- gebrek aan energie of zwakte
- wiebeligheid, onvastheid of coördinatiestoornissen waardoor het lopen moeilijk wordt
- depressie
- vijandigheid of woede
- prikkelbaarheid
- verwardheid
- moeite met concentreren of opletten
- abnormaal denken
- spraak- of taalproblemen
- verhoogde eetlust
- misselijkheid
- buikpijn
- nervositeit
- moeite met inslapen of doorslapen

- jeuk
- blauwe plekken
- pijnlijk of frequent urineren

**Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen niet vaak voor, maar als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:**

- uitslag
- zweren aan de binnenkant van uw mond, neus, ogen of keel
- griepachtige symptomen
- veranderingen in het gezichtsvermogen
- ernstige zwakte
- handen schudden die je niet onder controle hebt
- gevoelloosheid, pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten
- toevallen, waaronder status epilepticus

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

## **wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse pilopassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

## **n noodgeval/overdosis**

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

## Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

- vermoeidheid
- zwakheid
- wiebeligheid, onvastheid of coördinatiestoornissen waardoor het lopen moeilijk wordt
- handen schudden die je niet onder controle hebt
- verwardheid
- spraak- of taalproblemen
- agitatie
- woede of vijandigheid
- depressie
- braken
- verlies van bewustzijn
- abnormale, oncontroleerbare spiersamentrekkingen
- tijdelijk onvermogen om te bewegen (verlamming)
- toevallen, waaronder status epilepticus

## wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

## randnamen

- Gabitril®

Laatst herzien - 15/01/2018

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022