



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Tiagabine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

Tiagabine

binibigkas bilang (ty ag' a been)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Tiagabine ay ginagamit kasabay ng iba pang mga gamot upang gamutin ang bahagyang mga seizure (isang uri ng epilepsy).

Ang Tiagabine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticonvulsants. Hindi alam kung paano gumagana ang tiagabine, ngunit pinapataas nito ang dami ng mga natural na kemikal sa utak na pumipigil sa aktibidad ng pag-agaw.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Tiagabine bilang isang tableta na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha kasama ng pagkain dalawa hanggang apat na beses sa isang araw. Gayunpaman, para sa unang linggo ng paggamot ay kukuha ka lamang ng tiagabine isang beses sa isang araw. Dahan-dahang tataas ng iyong doktor ang iyong dosis (hindi hihigit sa isang beses bawat linggo) hanggang sa maabot mo ang dosis ng tiagabine na dapat mong inumin nang regular. Upang matulungan kang matandaan na uminom ng tiagabine, inumin ito sa parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kumuha ng tiagabine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng tiagabine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag huminto sa pag-inom ng tiagabine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nakakaranas ka ng mga side effect tulad ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. Ang biglang paghinto sa gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga seizure. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag sinimulan mo ang paggamot na may tiagabine at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Tiagabine ay hindi dapat inireseta para sa iba pang gamit. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng tiagabine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa tiagabine o anumang iba pang mga gamot.

magpasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng isang anticonvulsant na gamot ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng hindi pag-inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang pagkamayamutin, pagkabalisa, o depresyon; kumikilos sa mga mapanganib na impulses; kahirapan sa pagkahulog o pananatiling tulog; agresibo, galit, o marahas na pag-uugali; kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay; pag-alis mula sa mga kaibigan at pamilya; abala sa kamatayan at pagkamatay; pamimigay ng mahalagang ari-arian; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas. Kung napalampas mo ang higit sa isang dosis, tawagan ang iyong doktor para sa mga tagubilin tungkol sa muling pagsisimula ng iyong gamot.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Tiagabine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagkahilo o pagkahilo
- antok
- kakulangan ng enerhiya o kahinaan
- pag-uurong-sulong, pagkabalisa, o kawalan ng koordinasyon na nagdudulot ng kahirapan sa paglalakad
- depresyon
- poot o galit
- pagkamayamutin
- pagkalito
- kahirapan sa pag-concentrate o pagbibigay pansin
- abnormal na pag-iisip
- mga problema sa pagsasalita o wika
- nadagdagan ang gana
- pagduduwal
- sakit sa tyan
- kaba
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog

- nangangati
- pasa
- masakit o madalas na pag-ihi

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi pangkaraniwan, ngunit kung makaranas ka ng alinman sa mga ito, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- pantal
- mga sugat sa loob ng iyong bibig, ilong, mata o lalamunan
- mga sintomas tulad ng trangkaso
- mga pagbabago sa paningin
- matinding kahinaan
- pakikipagkamay na hindi mo makontrol
- pamamanhid, pananakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa
- mga seizure, kabilang ang status epilepticus

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

- pagkapagod
- kahinaan
- pag-uurong-sulong, pagkabalisa, o kawalan ng koordinasyon na nagdudulot ng kahirapan sa paglalakad
- pakikipagkamay na hindi mo makontrol
- pagkalito
- mga problema sa pagsasalita o wika
- pagkabalisa
- galit o poot
- depresyon
- pagsusuka
- pagkawala ng malay
- abnormal, hindi makontrol na mga contraction ng kalamnan
- pansamantalang kawalan ng kakayahang gumalaw (paralisis)
- mga seizure, kabilang ang status epilepticus

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Gabitril®

Huling Binago - 01/15/2018

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022