



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Ticlopidine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695036.html>

## Ticlopidine

prononcé comme (tye kloee' pi deen)

### AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La ticlopidine peut entraîner une diminution du nombre de globules blancs, qui combattent les infections dans le corps. Si vous avez de la fièvre, des frissons, des maux de gorge ou d'autres signes d'infection, appelez immédiatement votre médecin.

La ticlopidine peut également provoquer une diminution potentiellement mortelle des plaquettes, qui peut survenir dans le cadre d'un syndrome qui comprend une lésion des globules rouges, provoquant une anémie, des anomalies rénales, des modifications neurologiques et de la fièvre. Cette condition est appelée purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT).

Appelez votre médecin immédiatement si vous avez un jaunissement de la peau ou des yeux, des points d'épingle (éruption cutanée) sur la peau, une couleur pâle, de la fièvre, des difficultés à parler, des convulsions, une faiblesse d'un côté du corps ou des urines foncées.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira des tests de laboratoire, en particulier pendant les 3 premiers mois de traitement, pour vérifier votre réponse à la ticlopidine.

### Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La ticlopidine est utilisée pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou qui ont présenté des signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral et qui ne peuvent pas être traitées avec de l'aspirine. La ticlopidine est également utilisée avec l'aspirine pour empêcher la formation de caillots sanguins dans les stents coronaires (tubes métalliques placés chirurgicalement dans les vaisseaux sanguins obstrués pour améliorer le flux sanguin). Il agit en empêchant les plaquettes (un type de cellule sanguine) de s'accumuler et de former des caillots.

### Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La ticlopidine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris deux fois par jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la ticlopidine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Continuez à prendre de la ticlopidine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la ticlopidine sans en parler à votre médecin.

## autres utilisations de ce médicament

La ticlopidine est également utilisée avant une chirurgie à cœur ouvert et dans le traitement de la drépanocytose, de certains types de maladies rénales (glomérulonéphrite primaire) et des artères bloquées dans les jambes. Discutez avec votre médecin des risques possibles liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

## Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

### Avant de prendre de la ticlopidine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la ticlopidine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de ticlopidine.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les antiacides, les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine (Coumadin), l'aspirine, la cimétidine (Tagamet), le clopidogrel (Plavix), la digoxine (Lanoxin) et la théophylline (Theo-Dur). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- si vous prenez également des antiacides (Maalox, Mylanta) prenez-les 1 heure avant ou 2 heures après la prise de ticlopidine.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie, des troubles hémorragiques, des ulcères hémorragiques, un faible nombre de cellules sanguines (neutropénie, thrombocytopénie, anémie, PTT), une maladie rénale, un taux de cholestérol sanguin élevé ou un taux élevé de lipides sanguins (triglycérides).
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la ticlopidine, appelez votre médecin.
- parlez à votre médecin des risques et des avantages de la prise de ticlopidine si vous avez 65 ans ou plus. Les personnes âgées ne devraient généralement pas prendre de ticlopidine car elle n'est pas aussi sûre ou efficace que d'autres médicaments pouvant être utilisés pour traiter la même maladie.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la ticlopidine. Votre médecin peut vous dire d'arrêter de prendre la ticlopidine 10 à 14 jours avant votre intervention. Suivez ces instructions.

## Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf avis contraire de votre médecin, poursuivez votre régime alimentaire habituel.

## Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

## quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La ticlopidine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- nausée

- diarrhée
- vomissement
- Douleur d'estomac
- perte d'appétit
- gaz
- mal de crâne
- démangeaison

**Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :**

- fièvre, mal de gorge ou autres signes d'infection
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- selles claires
- démangeaison de la peau

La ticlopidine peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

## Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

## n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

## Quelles autres informations dois-je connaître ?

La ticlopidine empêche le sang de coaguler, il peut donc vous falloir plus de temps que d'habitude pour arrêter le saignement si vous vous coupez ou vous blessez. Évitez les activités qui présentent un risque élevé de blessure. Appelez votre médecin si le saignement est inhabituel.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

## noms rands

- Ticlide®¶

¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 15/02/2018

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

---

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022