Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682160.html

Triexifenidil

pronunciado como (trye hex ee fen' i dil)

por que este medicamento é prescrito?

Triexifenidil é usado junto com outros medicamentos para tratar os sintomas da doença de Parkinson (DP; um distúrbio do sistema nervoso que causa dificuldades de movimento, controle muscular e equilíbrio) e para controlar sintomas extrapiramidais (tremor, fala arrastada) causados por certos medicamentos . Trihexyphenidyl está em uma classe de medicamentos chamados antimuscarínicos. Funciona relaxando os músculos e os impulsos nervosos que controlam a função dos músculos.

como este medicamento deve ser usado?

Trihexyphenidyl vem como um comprimido e elixir (líquido) para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos três ou quatro vezes ao dia. Tome triexifenidil por volta do mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome triexifenidil exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Não pare de tomar triexifenidil de repente sem falar com seu médico, especialmente se você também estiver tomando outros medicamentos. A interrupção repentina pode fazer com que os sintomas da doença de Parkinson retornem.

outros usos para este medicamento

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar triexifenidil,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao triexifenidil, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes da preparação de triexifenidil. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico ou verifique o rótulo da embalagem para obter uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: tranquilizantes.

- Informe o seu médico se você tem ou já teve glaucoma, pressão alta, problemas no sistema urinário ou na próstata, problemas estomacais ou doenças cardíacas, renais ou hepáticas.
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar triexifenidilo, contacte o seu médico.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar triexifenidilo.
- converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de tomar triexifenidil se você tiver 65 anos de idade ou mais. Os adultos mais velhos geralmente não devem tomar triexifenidil porque não é tão seguro ou eficaz quanto outros medicamentos que podem ser usados para tratar a mesma condição.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Triexifenidil pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- tontura ou visão turva
- boca seca
- dor de estômago
- vômito
- constipação
- dor de cabeça
- dificuldade em urinar

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- irritação na pele
- batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados
- febre
- confusão
- delírios ou alucinações

Trihexyphenidyl pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará alguns exames de laboratório para verificar sua resposta ao triexifenidil.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Artane®¶
- Tremin®¶

¶-Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/07/2018

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022