Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697013.html

ジロートン
（zye loo'ton）と発音します

なぜこの薬が処方されているのですか？

ジロートンは、喘息による喘鳴、息切れ、咳、胸部圧迫感を防ぐために使用されます。ジロートンは、すでに始まっている喘息発作（息切れ、喘鳴、咳の突然のエピソード）の治療には使用されません。ジロートンは、ロイコトリエン合成阻害剤と呼ばれる薬のクラスに属しています。それは、気道の腫れ、引き締め、粘液産生を引き起こす特定の天然物質の形成を止めることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

Zileutonは、錠剤と徐放性（長時間作用型）錠剤として経口摂取できます。タブレットは通常、食事の有無にかかわらず1日4回服用します。徐放性錠剤は通常、朝晩の食事後1時間以内に1日2回服用します。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示どおりにジロートンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

突然の喘息発作を治療するためにジロートンを使用しないでください。医師は、発作時に使用する短時間作用型吸入器を処方します。突然の喘息発作の症状を治療する方法について医師に相談してください。

あなたの喘息を治療するためにあなたの医者が処方した他のすべての薬を服用し続けてください。医師から指示がない限り、薬の服用を中止したり、薬の投与量を変更したりしないでください。

治療中に喘息が悪化した場合は、医師に相談してください。速効性の薬を通常より多く使用する必要がある場合、または速効性の薬の最大投与量を使用する必要がある場合は、医師に連絡してください。

ジロートンは喘息の症状をコントロールするのに役立ちますが、喘息を治すことはありません。ジロートンのメリットを十分に実感できるようになるまでには、数日以上かかる場合があります。気分が良くても、ジロートンを服用し続けてください。医師に相談せずにジロートンの服用をやめないでください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ジロートンを服用する前に、

- ジロートンや他の薬にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。ワルファリン（クマディン）などの抗凝固剤（「抗凝血剤」）。イトラコナゾール（Sporanox）やケトコナゾール（Nizoral）などの抗真菌剤。アテノロール（Tenormin）、ラベタロール（Trandate）、メトプロロール（Lopressor、Toprol XL）、ナドロール（Corgard）、プロプラノロール（Inderal）などのベータブロッカー。アムロジピン（Norvasc）、フェロジピン、イスラジピン（DynaCirc）、ニカルジピン（Cardene）、ニフェジピン（Adalat、Procardia）、ニモジピン、ニソルジピン（Sular）などのカルシウムチャネル遮断薬。シサプリド（推進力）; クラリスロマイシン（ビアキシン）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; アタザナビル（Reyataz）、インジナビル（Crixivan）、ネルフィナビル（Viracept）、リトナビル（Norvir、カレトラ）、およびサキナビル（Invirase）; ネファゾドン; テリスロマイシン（Ketek）; およびテオフィリン（Theo-24、Uniphyl）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 肝疾患がある場合は医師に相談してください。あなたの医者はおそらくジロートンを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- 錠剤を飲み込むのが困難な場合、大量のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがある場合、過去に肝疾患を患っていたが回復した場合は、医師に相談してください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ジロートンを服用中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- ジロートンを服用している間、アルコールの安全な使用について医師に相談してください。
- ジロートンを服用している間、メンタルヘルスが予期せぬ形で変化する可能性があることを知っておく必要があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡する必要があります：興奮、攻撃的な行動、不安、イライラ、異常な夢、幻覚（存在しないものを見たり、声を聞いたりする）、うつ病、眠りにつく、または眠り続けるのが難しい、落ち着きのなさ、自殺行動（自分自身を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうしようと計画したりしようとしたりすること）、または震え（体の一部の制御不能な揺れ）。あなたの医者はあなたがジロートンを服用し続けるべきかどうかを決定します。

特別な食事の指示に従うべきですか？

あなたの医者があなたに他のことを言わない限り、あなたの通常の食事療法を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ジロートンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 頭痛
- 胸焼け
- 下痢
- 筋肉痛
- 鼻と喉の炎症
- 顔の痛みや膨満感

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状または特別な注意事項のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 発疹
- じんましん
- 胃の右上部分の痛み
- 吐き気
- 嘔吐
- 過度の倦怠感
- かゆみ
- 皮膚や目の黄変
- 暗色尿
- インフルエンザのような症状

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

ジロートンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬を服用しているときに異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から守るために、常に安全キャップをロックしてください

そしてすぐに安全な場所に薬を置きます-彼らの視界と手の届かないところにあります。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、治療前および治療中に特定のラボテストを注文します。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- Zyflo®
- Zyflo®CR

最終改訂日-2017年12月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日