Source : New Zealand Medicines Authority

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

クロピクソール- （clo-PIK-sol）

クロピクソール-錠剤10mg
クロピクソール-アクアフェーズインジェクション 50mg/ mL Clopixol-デポ注射200mg/ mL

ズクロペンチキソール塩酸塩（zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride）

酢酸ズクロペンチキソール（zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate）

デカン酸ズクロペンチキソール（zoo-clo-PEN-thic-sol Deck-can-OH-ate）

消費者医療情報（CMI）

このリーフレットの内容

このリーフレットには、Clopixolに関するいくつかの一般的な質問への回答が含まれています。

Clopixolについて知られているすべての情報が含まれているわけではありません。それはあなたの医者と話す代わりにはなりません
薬剤師。

すべての薬にはリスクと利点があります。あなたの医者は、あなたがこの薬を使用するリスクと、それがあなたにもたらすと彼/彼女が期待する利益とを比較検討しました。

この薬の使用について懸念がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

このリーフレットは薬と一緒に保管してください。
もう一度読む必要があるかもしれません。

Clopixolとは

のために使用される

クロピクソール錠は、統合失調症や、思考、感情反応、行動に障害を伴うその他の精神疾患の急性および長期治療に使用されます。

また、躁うつ病の躁病期の治療にも使用されます。躁病期は

興奮、過度の活動、抑制されていない行動。

Clopixol Acuphase注射は、精神障害の急性エピソードの初期治療に使用されます。また、躁病（過活動、高揚感、過敏症のエピソードを特徴とする精神状態）の治療にも使用され、慢性的な精神状態が悪化した場合に使用されます。

Clopixol Depot注射は通常、あなたの病気のさらなるエピソードを防ぐために使用されます。

Clopixolは、チオキサンテン神経弛緩薬と呼ばれる薬のグループに属しています。精神疾患を引き起こす可能性のある脳内の化学的不均衡を修正するのに役立ちます。

ただし、医師が別の目的で処方する場合があります。

なぜ処方されたのかについて質問がある場合は、医師に相談してください。

この薬は医師の処方箋でのみ入手可能です。

Clopixolは中毒性がありません。

使用する前に

使用してはいけないとき

Clopixolにアレルギーがある場合は、Clopixolを使用しないでください。他の同様の薬（チオキサンテンやフェノチアジンなど）、または

このリーフレットの最後に記載されている成分。
アレルギー反応の症状には、息切れ、喘鳴または呼吸困難、顔、唇、舌または体の他の部分の腫れ、または皮膚の発疹、かゆみまたはじんましんが含まれる場合があります。

次の場合は、Clopixolを使用しないでください。

- 非常に低い血圧のために崩壊する
- 何らかの原因による意識の低下
- 脳損傷
- 赤血球または白血球または血小板の数が異常または減少している血液の病気
- 褐色細胞腫、腎臓の近くにある副腎のまれな腫瘍。

現在アルコール中毒を患っている人、落ち着きを与えるために使用される薬や睡眠を助けるために使用される薬、てんかんや強い痛みを治療するために使用される薬で中毒を起こしている人には、Clopixolを与えないでください。

無意識または昏睡状態にある人にClopixolを与えないでください。

パックに記載されている有効期限が切れた後は使用しないでください。
賞味期限を過ぎて使用した場合、使用できない場合があります。有効期限とは、その月の最終日を指します。

包装が破れたり、改ざんの兆候が見られる場合は使用しないでください。

使い始める前に

次の場合は医師に相談してください。

1.食品、防腐剤、染料などの他の物質にアレルギーがあります。

2.あなたは妊娠しているか、妊娠するつもりです。

Clopixolはあなたの出生力に影響を与える可能性があります。家族を始めるつもりなら、医師にアドバイスを求めてください。

この種のほとんどの薬のように、Clopixolはそうではありません明らかに必要でない限り、妊娠中の使用をお勧めします。一般的なこれを使用すると、赤ちゃんの状態が影響を受ける可能性があります薬。

以下の症状は、使用した母親の新生児に発生する可能性があります妊娠の最後の3か月のクロピクソール：震え、筋肉のこわばり、および/または脱力感、眠気、興奮、呼吸障害、給餌の難しさ。赤ちゃんがこれらの症状のいずれかを発症した場合は、医師に連絡する必要があります。

3.あなたは母乳育児をしている、または母乳育児を計画しています。

使用中に授乳することはお勧めしませんクロピクソール。その有効成分が母乳に移行するため、赤ちゃんが影響を受ける。

4.次の病状がある、またはあった。

- 動脈硬化症、動脈に影響を与える病気
- けいれん、発作または発作
- 脳への血液供給の減少
- 糖尿病、血液中の糖の量が多すぎる代謝障害
- 無気力、無関心、喪失、または遠隔感
- 緑内障、通常は眼圧が上昇する状態
- 心臓と血管の問題
- 腎臓の問題
- 肝臓の問題
- 血中のカリウムおよび/またはマグネシウムレベルが低い
- 身体性脳症候群
- パーキンソニズム、運動に影響を与える脳の病気
- 脳卒中の危険因子
- 遅発性ジスキネジア、いくつかの薬に対する反応ワームのような舌の動き、または腕や脚に進行する可能性のある口、舌、頬、または顎の他の制御されていない動き。
- がんの治療
- あなたやあなたの家族の他の誰かが血餅の病歴を持っている場合、これらのような薬は血栓の形成
- 睡眠時無呼吸（あなたの呼吸が睡眠中に中断された）。

また、暑い環境にいるのか、激しい運動をしているのかを医師に伝えてください。

クロピクソールは発汗を抑え、体を過熱させる可能性があります。

を含む農薬にさらされている場合は医師に相談してください
リン。

副作用が発生するリスクが高まる可能性があります。

乳糖不耐症の方は、クロピクソール錠を服用する前に医師にご相談ください。

クロピクソール錠には乳糖が含まれています。

子供や青年にClopixolを与えないでください。

下の子供や青年での使用経験はありません18歳。

上記のいずれについても医師に伝えていない場合は、Clopixolを使用する前に医師に伝えてください。

他の薬を服用する

薬局、スーパーマーケット、健康食品店から処方箋なしで購入したものを含め、他の薬を服用している場合は医師に相談してください。

一部の薬とクロピクソールは互いに干渉する可能性があります。これらには以下が含まれます：

- 三環系抗うつ薬とリチウム、うつ病や気分のむらを治療するために使用される薬
- 強い痛みを治療するために使用される薬
- 落ち着きを与えるため、またはあなたが眠るのを助けるために使用される薬
- グアネチジンなどの高血圧（高血圧）の治療に使用される薬
- パーキンソン病の治療に使用される薬、レボドパ
- アドレナリンなど、体を刺激して行動の準備を整える薬
- メトクロプラミド、吐き気と嘔吐を和らげるために使用される薬
- ピペラジン、ワーム感染症の治療に使用される薬
- 特定の肝酵素の活性を阻害することが知られている薬
- キニジン、アミオダロン、ソタロール、ドフェチリドなど、心拍のリズムや心拍数の変化を治療するために使用される薬
- 抗精神病薬、特定の精神的および感情的な状態を治療するために使用される薬のクラス、例えばチオリダジン
- エリスロマイシン、ガチフロキサシン、モキシフロキサシンなど、感染症の治療に使用される特定の薬
- テルフェナジンやアステミゾールなど、アレルギーの症状を和らげるために使用される薬
- 胃の問題を治療するために使用されるシサプリド
- 水または塩のバランスを乱す薬、例えばチアジド系利尿薬、液体または水錠とも呼ばれる

- クロピクソールの濃度を高めることが知られている薬
  あなたの血
- アトロピンや関連薬など、胃のけいれんやけいれんを和らげ、乗り物酔いを防ぎ、パーキンソン病を治療するために使用される薬。
- がんの治療に使用される薬

これらの薬はClopixolの影響を受けるか、Clopixolの効果に影響を与える可能性があります。あなたが使用する必要があるかもしれません

薬の量を変えたり、薬を飲んだりします。あなたの医者はあなたに助言します。

医師または薬剤師は、Clopixolの使用中に注意または避けるべき薬に関する詳細情報を持っています。

それの使い方

使用する量

クロピクソール錠

通常の投与量は1日あたり10〜50mgです。

正しい用量がわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

彼らはあなたにどれだけ取るかを正確に教えてくれます。

彼らがあなたに与える指示に従ってください。

服用を間違えると、クロピクソールが効かなくなり、症状が改善しない場合があります。

ClopixolAcuphase注射 通常の投与量は、2〜3日ごとまたは医師の指示に従って50〜150 mg（1〜3 mL）です。

治療期間は2週間を超えてはなりません。

最大投与量は400mgを超えてはならず、注射の総数は治療コースごとに4を超えてはなりません。

Clopixolデポ注射 通常の投与量は、2〜4週間ごとに200〜400 mg（1〜2 mL）です。

あなたの医者はあなたが受ける用量を決定します。これはあなたの状態とあなたの体重や薬への反応などの他の要因に依存します。一般的に、あなたの医者はあなたをより少ない用量で始めます、そしてそれはClopixolがあなたのために最もよく働く用量に達するまで徐々に増加します。

あなたの医者は別の用量を処方したかもしれません。

正しい用量がわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。彼らがあなたに与える指示に従ってください。

彼らはあなたがどれだけ与えられるかを正確に教えてくれます。

高齢患者

高齢患者では、クロピクソールの投与量を減らす必要があるかもしれません。

それの使い方

クロピクソール錠

コップ一杯の水で錠剤全体を飲み込みます。

このチャイルドレジスタンスボトルを開くには、 下の図のように、ボトルを持ってねじり、回してください。

クロピクソール注射

クロピクソールは大きな筋肉への注射として投与され、時間の経過とともにゆっくりと放出されます。注射は、医師、看護師、またはその他の訓練を受けた人のみが行う必要があります。

いつ使用するか

あなたは両方が持っているClopixol錠剤または注射を与えられるかもしれません

病気への影響は同じですが、持続時間は異なります。

クロピクソール錠

クロピクソール錠は短時間しか効かないため、毎日服用する必要があります。

Clopixol錠を1日1回ほぼ同時に服用してください。

毎日同じ時間に服用すると、いつ錠剤を服用するかを思い出すのにも役立ちます。

食事の前後にClopixol錠を服用してください。

クロピクソール注射

Clopixol Acuphase注射は2〜3日ごとに行う必要がありますが、Clopixol Depot注射は数週間続くため、2〜4週間ごとに1回行います。

あなたの医者はあなたに助言します。

使用期間

医師の指示がある限り、錠剤の服用および/または注射を続けてください。

Clopixolはあなたの状態をコントロールするのに役立ちますが、それを治すことはありません。したがって、定期的な治療が必要になります。

使い忘れたら

クロピクソール錠

次の服用時間になりそうな場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飲んでください。

飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

次の服用までにまだ長い時間がかかる場合は、覚えたらすぐに服用してから、通常どおりに服用してください。

どうしたらよいかわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

いつ薬を服用するか思い出せない場合は、薬剤師にアドバイスを求めてください。

クロピクソール注射

予約を忘れた場合は、覚えたらすぐに医師に連絡して、別の予約をしてください。

過剰摂取

すぐにあなたの医者、または毒に電話してください
インフォメーションセンター（ニュージーランドの場合はTel：0800 764 766）、または最寄りの病院の事故と緊急事態に行く場合は

- **あなたや他の誰かがClopixol錠を飲みすぎたのではないかと思います。兆候がない場合でもこれを行う**
  不快感または中毒。
- **Clopixolを与えられた後に副作用を経験します**
  注射。

緊急の治療が必要な場合があります。

クロピクソール注射はあなたの医者の監督の下であなたに与えられるので、あなたがあまり多くを受け取ることはほとんどありません。

過剰摂取の症状には、眠気、昏睡、けいれん、けいれん、低血圧、極端に高いまたは低い体などがあります
温度。制御不能な動きが発生し、非常に低い血圧のために崩壊する可能性があります。心臓に影響を与えることが知られている薬も服用している場合、Clopixolの過剰摂取で心拍のリズムや心拍数の変化が見られます。

あなたがそれを使用している間

あなたがしなければならないこと

新しい薬を使い始めようとしている場合は、Clopixolを使用していることを医師と薬剤師に思い出させてください。

あなたを治療している他の医師、歯科医、薬剤師に、あなたがこの薬を使用していることを伝えてください。

Clopixolの使用中に妊娠した場合は、すぐに医師に相談してください。

ワームのような舌の動き、または腕や脚に進行する可能性のある舌、口、頬、または顎のその他の制御されていない動きに気付いた場合は、すぐに医師に相談してください。

これらは遅発性ジスキネジアと呼ばれる症状の症状であり、クロピクソールなどの同様の薬を服用している人に発症する可能性があります。

この状態は、特に年配の女性において、クロピクソールによる長期治療中に発生する可能性が高くなります。非常にまれなケースですが、これは永続的な場合があります。ただし、早期に検出された場合、これらの症状は通常可逆的です。

また、口、歯茎、喉の痛み、またはその他のインフルエンザのような症状に気付いた場合は、医師に相談してください。

死、自殺、自傷行為、または他人への危害について考えたり話したりしている場合は、医師またはメンタルヘルスの専門家に相談してください。

これらは、精神疾患の変化または悪化の兆候である可能性があります。

手術を受ける場合は、この薬を使用していることを外科医または麻酔科医に伝えてください。 クロピクソールは、手術中に使用される他の薬に影響を与える可能性があります。

血液検査を受けようとしている場合は、この薬を使用していることを医師に伝えてください。
一部のテストの結果に干渉する可能性があります。

特に午前10時から午後3時の間は、太陽の下で肌を保護してください。

屋外にいる場合は、保護服を着用し、30以上の日焼け止めを使用してください。

皮膚が焼けているように見える場合は、医師に相談してください。
クロピクソールは、お肌が通常よりも日光に敏感になる可能性があります。これは、皮膚の発疹、かゆみ、発赤、または重度の日焼けを引き起こす可能性があります。

あなたの進歩をチェックできるようにあなたの医者の予定をすべて保管してください。
あなたの医者は時々いくつかの血液と肝臓の検査をするかもしれません、
特に治療の最初の数ヶ月間は、薬が効いていることを確認し、望ましくない副作用を防ぐために。

してはいけないこと

たとえ彼らがあなたと同じ状態であっても、あなたの薬を他の人に与えないでください。

医師の指示がない限り、Clopixolを使用して他の苦情を治療しないでください。

医師の勧めがない限り、Clopixolの使用中に眠気を引き起こす薬を服用しないでください。

医師に確認せずに、Clopixolの使用を中止したり、投与量を減らしたりしないでください。

気分が良くなったとしても、注射をお見逃しなく。
Clopixolはあなたの状態をコントロールするのに役立ちますが、それを治すことはありません。したがって、定期的な注射が必要になります。

Clopixolの使用を突然やめないでください。 Clopixolを突然停止すると、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、鼻水、発汗、筋肉痛、しびれ、不眠、落ち着きのなさ、不安、興奮などの症状が現れることがあります。

あなたの医者は完全に停止する前にあなたが使用している量を徐々に減らしたいかもしれません。

注意点

Clopixolがどのように影響するかがわかるまで、機械の運転や操作には注意してください。
一部の人では、眠気、倦怠感、眠気、またはかすみ目を引き起こす可能性があります。これらの症状がある場合は、運転したり、機械を操作したり、その他危険なことをしたりしないでください。

この薬を使用している間、アルコールを飲むときは注意してください。 アルコールを飲むと、眠気や眠気が悪化することがあります。

ベッドから出たり立ったりするときに、頭がおかしい、めまいがする、または失神していると感じた場合は、ゆっくり起きてください。 ゆっくりと立ち上がると、体の位置や血圧の変化に慣れるのに役立ちます。この問題が続くか悪化する場合は、医師に相談してください。

副作用

すべての薬には、いくつかの望ましくない副作用がある可能性があります。深刻な場合もありますが、ほとんどの場合そうではありません。あなたの医者は、この薬を使用することのリスクと、それがあなたにもたらすと期待する利益とを比較検討しました。

Clopixolの使用中に気分が悪い場合は、できるだけ早く医師または薬剤師に伝えてください。 精神疾患のあるほとんどの人に役立ちますが、一部の人には望ましくない副作用がある可能性があります。

65歳以上の場合、副作用が発生する可能性が高くなります。

次のいずれかに気づき、心配している場合は、医師に相談してください。

- 眠気、眠気
- 眠れない
- 異常な夢
- 頭痛
- 倦怠感
- 落ち込んだ気分
- 不安
- 緊張、動揺
- 頭痛
- 鼻詰まり
- 口渇
- 便秘または下痢
- 唾液分泌の増加または発汗の増加
- 吐き気、嘔吐、消化不良
- 体重と食欲の変化
- 月経の変化
- 性機能障害
- 手、足首、足の腫れ
- 皮膚の発疹、かゆみ。
- 灼熱感やチクチクするような異常な感覚
- 注意と記憶の変化
- めまいや回転感覚
- 痛みを伴うまたは弱い筋肉
- 注射部位の痛み
- 一般的に気分が悪い

次のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師に相談してください。

- 手や指の震えや震え、体のねじれの動き、または腕や脚の歩行やこわばりのシャッフルなど、異常な動きの突然の開始
- ワームのような舌の動き、またはその他の制御されていない口、舌、頬、または顎の動き。これは腕や脚に進行する可能性があります。
- じっとしていることができない
- 筋肉の動きの増加、減速、または異常
- 立ち上がるとめまいがする
- 不整脈と心拍数と血圧の変化
- 失神
- かすみ目または焦点が合わない
- 尿の通過が困難
- 排尿の増加またはその他の尿障害
- 目の高圧
- 母乳の異常な分泌
- 男性の乳房肥大
- 呼吸困難または呼吸困難
- 発熱、悪寒、喉の痛みなどの頻繁な感染症
  口内潰瘍
- 通常よりも出血やあざができやすい、鼻血
- 黄疸とも呼ばれる皮膚および/または目の黄変
- 腹部膨満、腸のけいれん、嘔吐を伴う激しい胃の痛み。
- 静脈、特に脚の血栓（症状には以下が含まれます）
  腫れ、痛み、脚の発赤）、血管を通って肺に移動し、胸の痛みや困難を引き起こす可能性があります
  呼吸。これらの症状のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 認知症の高齢者では、死亡者数のわずかな増加が報告されています
  抗精神病薬を服用していない患者と比較して抗精神病薬を服用している患者。

これらはClopixolの深刻な副作用である可能性があります。緊急の治療が必要な場合があります。

次のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師に相談するか、最寄りの病院の事故と緊急事態に行ってください。

- 重篤なアレルギー反応（アレルギー反応の症状には、顔、唇、口、喉の腫れが含まれる場合があり、嚥下や呼吸、じんましんが困難になる場合があります）
- 体温の突然の上昇、筋肉の異常なこわばり、意識の変化、特に速い心拍数と発汗に関連して。これは、と呼ばれる非常にまれな状態が原因である可能性があります

  さまざまな抗精神病薬で報告されている神経弛緩薬の悪性症候群。

これらは非常に深刻な副作用です。緊急の治療または入院が必要になる場合があります。

これらの副作用は一般的にまれです。

気分が悪くなっている他のことに気づいたら、医師に相談してください。

上記にリストされていない他の副作用は、一部の人々に発生する可能性があります。

考えられる副作用のこのリストに驚かないでください。

あなたはそれらのどれも経験しないかもしれません。

使用後

保管所

使用するときまで、Clopixolをパックに入れておきます。
パックからタブレットやアンプルを取り出すと、うまく保存できない場合があります。

Clopixolを日光から遠ざけてください。

温度が25°C以下にとどまる涼しい乾燥した場所に薬を保管してください°C。

トイレ、流し台の近く、窓枠などに保管しないでください。

車内に放置しないでください。 熱と湿気はいくつかの薬を破壊する可能性があります。

子供が届かない場所に保管してください。
地上1.5メートル以上の鍵のかかった食器棚は、薬を保管するのに適した場所です。

廃棄

医師からこの薬の使用をやめるように言われた場合、または有効期限が過ぎた場合は、

薬剤師は、残っているものをどうするか。

未使用の薬は薬剤師に返却してください。

製品説明

それはどのようなものか

Clopixolは錠剤として、2種類の注射で提供されます。

- Clopixol 10 mgフィルムコーティング錠-薄赤褐色、丸い両凸錠
- Clopixol Acuphase 50 mg/mL注射用溶液-透明で黄色がかったオイル
- Clopixol Depot 200 mg/mL注射用溶液-透明な黄色がかったオイル。

錠剤は100錠のボトルで入手可能で、注射は5アンプルの箱に入っています。

材料

有効成分：

- クロピクソール10mg錠-10mgズクロペンチキソール（塩酸塩）1錠あたり
- Clopixol Acuphase 50 mg/mL注射-1mLあたり50mgの酢酸ズクロペンチキソールまたは2mLあたり100mgの酢酸ズクロペンチキソール
- Clopixol Depot 200 mg/mL注射-200mg
  1mLあたりのデカン酸ズクロペンチキソール。

不活性成分（錠剤）：

- 硬化ヒマシ油
- 微結晶性セルロース
- グリセロール
- ヒプロメロース
- 酸化鉄赤
- 乳糖一水和物
- マクロゴール6000
- ステアリン酸マグネシウム
- コポビドン
- ジャガイモでんぷん
- 精製タルク
- 二酸化チタン。

クロピクソール錠には、グルテン、ショ糖、タートラジン、その他のアゾ染料は含まれていません。

不活性成分（注射）：

- 分別されたココナッツオイル。

メーカー/スポンサー

Clopixolは、デンマークのH. Lundbeck A/Sによって製造されています。

ニュージーランドで配布： 薬局小売業t/aヘルスケアロジスティクス
58リチャードピアスドライブマンジェレ
オークランド2022

Ph：0800 540 555

このリーフレットは2020年6月18日に作成されました。

「Clopixol」は、H。Lundbeck A/Sの登録商標です。