Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html

ラルテグラビル

（ral teg'ra veer）と発音されます

なぜこの薬が処方されているのですか？

ラルテグラビルは、体重が4.5ポンド（2 kg）以上の成人および小児のヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療するために、他の薬剤と一緒に使用されます。ラルテグラビルは、HIVインテグラーゼ阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。血中のHIVの量を減らすことによって機能します。ラルテグラビルはHIVを治療しませんが、後天性免疫不全症候群（AIDS）や、重篤な感染症や癌などのHIV関連の病気を発症する可能性を減らす可能性があります。より安全なセックスを実践し、他のライフスタイルを変えるとともにこれらの薬を服用すると、HIVウイルスが他の人に感染する（広がる）リスクを減らすことができます。

わあ、この薬を使うべきですか？

ラルテグラビルは、錠剤、チュアブル錠、および経口懸濁液用の顆粒として経口摂取できます。ラルテグラビル（Isentress®）錠剤、チュアブル錠、および経口懸濁液は、通常、1日2回、食事の有無にかかわらず服用します。ラルテグラビル（Isentress®HD）タブレットは通常、食事の有無にかかわらず1日1回服用します。毎日同じ時間にラルテグラビルを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにラルテグラビルを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。チュアブル錠を服用している場合は、丸ごと噛んだり飲み込んだりすることができます。

噛むのが難しい子供のために、チュアブル錠を粉砕し、きれいなカップで水、ジュース、母乳などの液体小さじ1（5 mL）と混ぜることができます。錠剤は液体を吸収し、2分以内にバラバラになります。スプーンを使用して、錠剤の残りの部分を粉砕します。すぐに混合物を飲みます。薬のいずれかがカップに残っている場合は、小さじ1杯（5 mL）の液体を追加し、渦を巻いてすぐに服用します。

ラルテグラビル経口懸濁液を初めて服用する前に、薬の準備方法を説明した付属の説明書を読んでください。1つの顆粒パケット の内容物をミキシングカップに空にし、小さじ2杯（10 mL）の水を加えます。ミキシングカップの内容物を45秒間静かに回転させます。振らないでください。付属の注射器を使用して、医師が処方した薬の量を測定します。調製後30分以内に混合物を使用し、残っている懸濁液を廃棄します。

気分が良くてもラルテグラビルを服用し続けてください。医師に相談せずにラルテグラビルやその他の抗HIV薬の服用をやめないでください。ラルテグラビルの服用をやめたり、服用をスキップしたりすると、症状が悪化し、ウイルスが治療に耐性を持つようになる可能性があります。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ラルテグラビルを服用する前に、

- ラルテグラビル、その他の薬、またはラルテグラビル製品の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。カルシウム、マグネシウム、またはアルミニウムを含む制酸剤（Maalox、Mylanta、Tumsなど）。カルバマゼピン（Equetro、Tegretol、Teril）; アトルバスタチン（Lipitor、Caduet）、フルバスタチン（Lescol）、ロバスタチン（Altoprev）、プラバスタチン（Pravachol）、ロスバスタチン（Crestor）、シンバスタチン（Zocor、Vytorin）などのコレステロール低下薬（スタチン）。エトラビリン（インテリジェンス）; フェノフィブラート（Antara、Lipofen、Tricor、その他）; ゲムフィブロジル（Lopid）; フェノバルビタール; フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; リファンピン（リファディン、リマクタン、リファメート、リファター）、チプラナビル（アプティバス）とリトナビル（ノルビル）; およびジドブジン（レトロビル、その他）。
- 透析（腎臓が正常に機能していないときに血液をきれいにするための医学的治療）で治療されているか、または肝炎、高血中コレステロールまたはトリグリセリド（血液中の脂肪物質）、筋肉疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてくださいまたは筋肉の腫れ、または横紋筋融解症（骨格筋の状態）。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。ラルテグラビルを服用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。母乳育児をしているのか、母乳育児を計画しているのかを医師に伝えてください。HIVに感染している場合、またはラルテグラビルを服用している場合は、授乳しないでください。
- フェニルケトン尿症（PKU、重度の知的障害を引き起こす可能性のある脳への損傷を防ぐために特別な食事療法に従う必要がある遺伝性疾患）がある場合は、チュアブル錠にフェニルアラニンを形成するアスパルテームが含まれていることを知っておく必要があります。
- HIV感染症を治療するために薬を服用している間、免疫系が強くなり、すでに体内にある他の感染症と戦い始める可能性があることを知っておく必要があります。これにより、これらの感染症の症状が現れる可能性があります。ラルテグラビルによる治療中に新たな症状または悪化する症状がある場合。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために、ラルテグラビルを2錠同時に服用しないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ラルテグラビルは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 下痢
- ガス
- 胃痛
- 胸焼け
- 不眠症
- 異常な夢
- うつ
- 頭痛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 筋肉痛または圧痛
- 筋力低下
- 濃い色またはコーラ色の尿
- 胸の痛みや圧迫
- 発疹
- 熱
- 皮膚の水ぶくれまたは剥離
- じんましん
- かゆみ
- 目、顔、唇、舌、喉、手、足、足首、または腕の腫れ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 極度の倦怠感
- 口の病変
- 赤、かゆみ、または腫れた目
- 胃の右上部分の痛み
- 皮膚や目の黄変
- 淡いスツール

- 吐き気
- 嘔吐
- 食欲減少
- 速いハートビート
- 呼吸困難
- 発熱、喉の痛み、咳、悪寒、その他の感染症の兆候
- エネルギーの欠乏
- 原因不明の体重増加
- 尿量の減少
- 足、足首、または脚の周りの腫れ
- 眠気

ラルテグラビルは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom). Do not remove the desiccant (small packet included with the tablets to absorb moisture) from your bottle.

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and reach. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

他の情報を知っておく必要がありますか？

ラルテグラビルを服用している間、医師と検査室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はラルテグラビルに対するあなたの体の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。

処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- アイセントレス®
- アイセントレス®HD

最終改訂日-2022年1月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日