

TITLE - RUPATADINE / RUPAFIN RINIALER MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Rupatadin 1mg/ml oral solüsyon rupatadin

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?

1. Rupatadin nedir ve ne için kullanılır?
2. Rupatadin'i almadan önce bilmeniz gerekenler.
3. Rupatadin nasıl alınır?
4. Olası yan etkiler.
5. Rupatadin nasıl saklanır.
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler.

1. Rupatadin nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç, bir antihistamin olan aktif madde rupatadin içerir.

Rupatadin oral solüsyon 2-11 yaş arası çocuklarda hışırtı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, göz ve burunda kaşıntı gibi alerjik rinit semptomlarını hafifletir.

Rupatadin oral solüsyonu ayrıca 2 ila 11 yaş arası çocuklarda kaşıntı ve kurdeşen (lokal cilt kızarıklığı ve şişme) gibi ürtiker (alerjik deri döküntüsü) ile ilişkili semptomları gidermek için kullanılır.

2. Rupatadin'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Rupatadin almayın

- Rupatadine veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

Uyarılar ve önlemler

Rupatadin'i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, tavsiye için doktorunuza danışın. Rupatadin kullanımı şu anda böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda önerilmemektedir.

Kan potasyum seviyeniz düşükse ve/veya kalp atışınızda belirli bir anormal düzen varsa (EKG'de QTc aralığının bilinen uzaması), bazı kalp hastalığı türlerinde ortaya çıkabiliyorsa, doktorunuza danışın.

Source : Medicines Org UK

Çocuklar

Bu ilaç 2 yaşın altındaki veya 10 kg'ın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Diğer ilaçlar ve Rupatadin

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldığınız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Rupatadin alıyorsanız, ketokonazol (mantar enfeksiyonları için ilaç) veya eritromisin (bakteriyel enfeksiyonlar için ilaç) içeren ilaçlar almayınız.

Merkezi sinir sistemi depresan ilaçları, statin ilaçları (yüksek kolesterol düzeylerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar) veya midazolam (kısa süreli sedasyon için kullanılan ilaç) alıyorsanız, Rupatadin almadan önce doktorunuza danışınız.

Rupatadin ile yiyecek, içecek ve alkol

Rupatadin yemekle birlikte veya ayrı alınabilir.

Rupatadin, vücudunuzdaki Rupatadin düzeyini artırabileceğinden, greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.

Rupatadin, 10 mg/lık bir dozda alkolün neden olduğu uyuşukluğu artırmaz.

Hamilelik ve emzirme

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma

Tavsiye edilen dozda, RUPADİDİN'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak, Rupatadin'i ilk kullanmaya başladığınızda, araç veya makine kullanmadan önce tedavinin sizi nasıl etkilediğini görmeye özen göstermelisiniz.

Rupatadin sukroz, metil parahidroksibenzoat ve propilen glikol içerir.

Bu tıbbi ürün sakaroz içerdiğinden dişler için zararlı olabilir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün, alerjik reaksiyonlara

(muhtemelen gecikmiş) neden olabilen metil parahidroksibenzoat içerir.

Bu ilaç her ml'sinde 200 mg propilen glikol içerir.

Çocuğunuz 5 yaşından küçükse, özellikle propilen glikol veya alkol içeren başka ilaçlar kullanıyorsa, bu ilacı vermeden önce doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe bu ilacı almayınız. Bu ilacı alırken doktorunuz ek kontroller yapabilir.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe bu ilacı almayınız. Bu ilacı alırken doktorunuz ek kontroller yapabilir.

Bu ilaç 1 ml'de 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

3. Rupatadin nasıl alınır

Rupatadin'i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınır. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ağızdan kullanım içindir.

25 kg ve üzeri çocuklarda dozaj:Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak günde bir kez 5 ml (5 mg rupatadin) oral solüsyon.

10 kg'a eşit veya daha ağır ila 25 kg'ın altındaki çocuklarda dozaj:Günde bir kez 2.5 ml (2.5 mg rupatadin) oral solüsyon, aç veya tok karnına.

Doktorunuz size Rupatadin ile tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

Kullanım için talimatlar:

- Şişeyi açmak için kapağa basın ve saat yönünün tersine çevirin.
- Şırıngayı alın ve delikli tapaya koyun ve şişeyi ters çevirin.
- Şırıngayı öngörülen dozla doldurun.
- Doğrudan dozlama şırıngasından uygulayın.
- Kullanımdan sonra şırıngayı yıkayın.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rupatadin kullandıysanız

İlacınızı yanlışlıkla yüksek dozda aldıysanız, derhal doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Rupatadin'i kullanmayı unutursanız

Unutulan bireysel dozları telafi etmek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülme de Rupatadin yan etkilere neden olabilir.

Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini etkileyebilir):

Baş ağrısı ve uyku hali.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1'ini etkileyebilir):

Grip, nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu, eozinofili, nöropeni, baş dönmesi, mide bulantısı, egzama, gece terlemeleri ve yorgunluk.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla da bildirebilirsiniz (web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart için arama yapın). Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Rupatadin nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

EXP'den sonra bu ilacı şişe ve kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder. İlk açılıştan sonraki raf ömrü, kutu ve şişe üzerinde yazan son kullanma tarihi ile aynıdır.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınıza eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Rupatadin ne içerir

- Aktif madde rupatadindir. Her ml'de 1 mg rupatadin (fumarat olarak) bulunur.
- Diğer maddeler şunlardır: propilen glikol (E1520), sitrik asit susuz, susuz disodyum fosfat, sakarin sodyum, sukroz, metil parahidroksibenzoat (E218), kinolin sarısı (E104), muz aroması, Aritılmış su. Bkz. bölüm 2 "Rupatadin sukroz, metil parahidroksibenzoat ve propilen glikol içerir".

Rupatadin neye benziyor ve paketin içeriği

Rupatadin berrak sarı bir oral solüsyondur.

Rupatadin, delikli tıpalı ve çocuklara dayanıklı kapaklı amber plastik bir şişede paketlenmiştir. Her şişe 120 ml Rupatadin solüsyonu içerir. Pakette 0.25ml aralıklarla derecelendirilmiş 5ml'lik bir oral şırınga bulunur.

Pazarlama yetkilendirme sahibi:

Aspire İlaç Limited Şirketi
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road,
Petersfield Hampshire, GU32 3QG,
Bireşik Krallık

Üretici firma:

İtalfarmaco SA
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, İspanya

veya

Recipharm Parets SL
Ramon y Cajal, 2
08150 Parets del Vallés, İspanya

Bu broşür en son 01/2022 tarihinde revize edilmiştir.

ASPIRE®

P H A R M A

1010443-P.4.1