



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [タペンタドール](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html>

タペンタドール

(ta pen'ta dol) と発音します

重要な警告：

タペンタドールは、特に長期間使用すると、習慣を形成する可能性があります。指示通りにタペンタドールを服用してください。それ以上服用したり、頻繁に服用したり、医師の指示とは異なる方法で服用したりしないでください。タペンタドールを服用している間、あなたの痛みの治療目標、治療の長さ、およびあなたの痛みを管理する他の方法についてあなたの医療提供者と話し合ってください。あなたまたはあなたの家族の誰かが大量のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがあるか、ストリートドラッグを使用したか使用したことがあるか、処方薬を過剰に使用したか、過剰摂取したか、またはうつ病を患ったか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください別の精神病。これらの状態のいずれかを経験した、または経験したことがある場合、タペンタドールを使いすぎるリスクが高くなります。

タペンタドールは、特に治療の最初の24~72時間の間、および用量を増やすたびに、深刻なまたは生命を脅かす呼吸の問題を引き起こす可能性があります。あなたの医者はあなたの痛みを制御し、あなたが深刻な呼吸の問題を経験するリスクを減らすためにあなたの用量を調整します。呼吸や喘息が遅くなった、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくタペンタドールを服用しないようにあなたに言うでしょう。また、慢性閉塞性肺疾患（COPD;慢性気管支炎や肺気腫を含む肺疾患のグループ）、頭部損傷、脳腫瘍、または量を増加させる状態などの肺疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてくださいあなたの脳の圧力の。あなたが年配の成人であるか、病気のために衰弱または栄養失調である場合、あなたが呼吸の問題を発症するリスクはより高くなるかもしれません。

タペンタドールによる治療中に他の特定の薬を服用すると、呼吸の問題やその他の深刻な生命を脅かす呼吸の問題、鎮静、または昏睡を経験するリスクが高まる可能性があります。次の薬のいずれかを服用している、または服用する予定があるかどうかを医師に伝えてください。他の麻薬性鎮痛薬;精神疾患または吐き気のための薬;筋弛緩薬;鎮静剤;睡眠薬;または精神安定剤。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変更する必要があるかもしれません、そして監視します

あなたは慎重に。これらの薬のいずれかと一緒にタペンタドールを服用し、次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急の医療を求めてください：異常なめまい、立ちくらみ、極度の眠気、呼吸の遅延または困難、または無反応。介護者や家族がどの症状が深刻であるかを知っていることを確認してください。そうすれば、自分で治療を求めることができない場合に医師や救急医療に連絡することができます。

アルコールを飲む、アルコールを含む処方薬または非処方薬を服用する、またはタペンタドールによる治療中にストリートドラッグを使用すると、深刻な生命を脅かす副作用が発生するリスクが高まります。タペンタドールによる治療中は、アルコールを飲んだり、アルコールを含む処方薬または非処方薬を服用したり、ストリートドラッグを使用したりしないでください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。タペンタドールは、あなたの薬を服用している他の人々、特に子供に害を及ぼしたり、死に至る可能性があります。タペンタドールは安全な場所に保管して、他の人が誤ってまたは故意に服用しないようにしてください。タペンタドールを子供の手の届かないところに置くように特に注意してください。残っている錠剤または徐放性錠剤の数を追跡して、不足している薬があるかどうかを確認します。古くなった、または不要になった錠剤や徐放性錠剤をトイレに流して、他の人が服用しないようにします。

徐放性錠剤を服用している場合は、それらを丸ごと飲み込んでください。それらを噛んだり、壊したり、分割したり、押しつぶしたり、溶かしたりしないでください。壊れた、噛んだ、砕いた、または溶解した徐放性錠剤を飲み込むと、12時間以上ゆっくりとではなく、一度に大量のタペンタドールを受け取る可能性があります。これは、過剰摂取や死亡などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。妊娠中にタペンタドールを定期的に服用すると、赤ちゃんは出生後に生命を脅かす禁断症状を経験する可能性があります。赤ちゃんが次の症状のいずれかを経験した場合は、すぐに赤ちゃんの医師に伝えてください：神経過敏、活動亢進、異常な睡眠、甲高い泣き声、体の一部の制御不能な震え、嘔吐、下痢、または体重増加の失敗。

タペンタドールを服用するリスクについて医師に相談してください。

タペンタドールによる治療を開始するとき、および処方箋を記入するたびに、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。食品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを入手してください。

なぜこの薬が処方されているのですか？

タペンタドール錠は、中等度から重度の急性の痛み（突然始まり、特定の原因があり、痛みの原因が治ると消えると予想される痛み）の治療に使用されます。タペンタドール

徐放性錠剤は、糖尿病患者の重度の神経障害性疼痛（神経損傷によって引き起こされる疼痛）の治療に使用されます。タペンタドール徐放性錠剤は、他の鎮痛剤の使用では制御できない痛みを和らげるために、24時間薬が必要であると予想される人々を治療するためにのみ使用されます。タペンタドールは、オピエート（麻薬性）鎮痛薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。脳と神経系が痛み反応する方法を変えることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

タペンタドールは、錠剤と徐放性（長時間作用型）錠剤として経口摂取できます。錠剤は通常、必要に応じて4〜6時間ごとに食事の有無にかかわらず摂取されます。タペンタドール錠を服用している場合、痛みを治療するために必要な場合は、治療初日の最初の服用から1時間後に2回目の服用を行うことができると医師から言われることがあります。治療中は他のどの時点でも追加の服用をしないでください。また、徐放性錠剤の追加の服用は絶対にしないでください。徐放錠は12時間に1回服用します。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにタペンタドールを服用してください。

徐放性錠剤を服用している場合は、大量の水で一度に1錠ずつ飲み込んでください。口に入れた直後に各錠剤を飲み込んでください。

あなたの医者はおそらくタペンタドールの低用量であなたを始め、あなたの痛みが制御されるまであなたの用量を徐々に増やします。あなたの痛みがコントロールされていない場合、あなたの医者はあなたの治療中いつでもあなたの用量を調整するかもしれません。痛みが抑えられないと感じた場合は、医師にご相談ください。医師に相談せずに薬の投与量を変更しないでください。

タペンタドールを一定期間服用すると、体が薬に慣れる可能性があります。これが起こった場合、あなたの医者はあなたの痛みをコントロールするためにあなたの薬の投与量を増やす必要があるかもしれません。タペンタドールによる治療中の気分について医師に相談してください。

医師に相談せずにタペンタドールの服用をやめないでください。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に減らします。タペンタドールの服用を突然やめると、落ち着きのなさなどの離脱症状が現れることがあります。不安; 過敏性; 涙目; あくび; 寒気; 発汗; 眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい; 震え; あなたの体の一部の制御できない揺れ; 筋肉、背中、または関節の痛み; 弱さ; 吐き気; 嘔吐; 下痢; 胃のけいれん; 食欲減少; 鼻水、くしゃみ、または咳; 端に立っているあなたの肌の髪; 速い呼吸; 速い心拍; 瞳孔の拡大（目の真ん中の黒い円）; または幻覚（存在しないものを見たり、声を聞いたりする）。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

タペンタドールを服用する前に、

- タペンタドール、その他の薬、またはタペンタドール錠や徐放性錠の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。薬剤師に相談するか、

成分のリストのための投薬ガイド。

- 次の薬を服用しているか、過去2週間以内に服用を中止したかどうかを医師に伝えてください：イソカルボキサジド (Marplan)、リネゾリド (Zyvox)、メチレンブルー、フェネルジン (Nardil)、ラサギリン (Azilect) などのモノアミンオキシダーゼ (MAO) 阻害剤、セレギリン (Emsam, Eldepryl, Zelapar)、および tranylcypromine (Parnate)。また、タペンタドールによる治療中にこれらの薬のいずれかが処方されているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこれらの薬の1つ以上を服用している場合、あなたの医者はおそらくタペンタドールを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。抗ヒスタミン薬 (咳、風邪、およびアレルギー薬)。ブプレノルフィン (Buprenex, Butrans, Suboxone, Zubsolv) ; ブトルファノール; シクロベンザプリン (Amrix) ; デキストロメトルファン (多くの咳止め薬に見られる; Nuedextaにある) ; 過敏性腸疾患、乗り物酔い、パーキンソン病、潰瘍、または泌尿器系の問題のための薬; リチウム (Lithobid) ; アルモトリアタン (Axert)、エレトリアタン (Relpax)、フロバトリアタン (Frova)、ナラトリアタン (Amerge)、リザトリアタン (Maxalt)、スマトリアタン (Imitrex、トレキシメット)、ゾルミトリアタン (Zomig) などの片頭痛薬。ミルタザピン (レメロン) ; ナルブフィン; ペンタゾシン (タルウィン) ; シタロプラム (Celexa)、エシタロプラム (Lexapro)、フルオキセチン (Prozac, Sarafem, Selfemra, Symbiyax)、フルボキサミン (Luvox)、パロキセチン (Brisdelle, Paxil, Pexeva)、sertralineなどの選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) ; 選択的
 デスベンラファキシン (Khedezla, Pristiq)、デュロキセチン (Cymbalta)、ミルナシプラン (Savella)、ベンラファキシン (Effexor) などのセロトニン/ノルエピネフリン再取り込み阻害剤 (SNRI)。トラマドール (Conzip, Ultram, Ultracet) ; トラゾドン; または、アミトリプチリン、アモキサピン、クロミプラミン (アナフラニル)、デシプラミン (ノルプラミン)、ドキシペリン (シレノール、ゾナロン)、イミプラミン (サーモンチル、トフラニル)、ノルトリプチリン (パメロール)、プロトリプチリン (ビバクチル) などの三環式抗うつ薬 (「ムードエレベータ’) トリミプラミン (Surmontil)。他の多くの薬もタペンタドールと相互作用する可能性があるため、このリストに表示されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- あなたが服用しているハーブ製品、特にセントジョーンズワートとトリプトファンを医師に伝えてください。
- 重要な警告のセクションに記載されている状態または麻痺性イレウス (消化された食物が腸を通過しない状態) のいずれかを経験したか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はタペンタドールを服用しないようにあなたに言うかもしれません。
- 胃や腸に閉塞があるか、またはこれまでに閉塞したことがあるかどうか、排尿困難を引き起こす状態があるかどうかを医師に伝えてください。または膵臓、胆嚢、腎臓、甲状腺、または肝臓の病気。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。
- この薬は男性と女性の出生力を低下させる可能性があることを知っておく必要があります。タペンタドールを服用するリスクについて医師に相談してください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、タペンタドールを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- タペンタドールは眠気を催す可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかを理解するまでは、車を運転したり、機械を操作したり、その他の危険な可能性のある活動に参加したりしないでください。
- タペンタドールは、横臥位からの立ち上がりが速すぎると、めまい、立ちくらみ、失神を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。この問題を回避するには、ゆっくりとベッドから出て、立ち上がる前に数分間床に足を置きます。
- タペンタドールは便秘を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。タペンタドールを服用している間、便秘を予防または治療するために食事療法を変更したり、他の薬を使用したりすることについて医師に相談してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

タペンタドール錠を服用している場合、医師はおそらく必要に応じて薬を服用するように指示します。医師から定期的に服用するように言われた場合は、忘れた分は覚えてきたらすぐに服用してください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

タペンタドール徐放性カプセルを服用している場合は、忘れた分は飲まないで、通常の服用スケジュールを続けてください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

タペンタドールは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 頭痛
- 胸焼け
- 胃痛
- 口渇
- 過度の倦怠感
- 不安
- 眠気
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- 異常な夢
- 過敏性
- 突然の暖かさ

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれか、または特別な注意事項または重要な警告のセクションに記載されている症状が発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 発作
- 興奮、幻覚（存在しないものを見たり、声を聞いたりする）、発熱、発汗、混乱、速い心拍、震え、激しい筋肉のこわばりやけいれん、協調性の喪失、吐き気、嘔吐、または下痢
- 吐き気、嘔吐、食欲不振、脱力感、またはめまい
- 勃起を取得または維持することができない
- 生理不順
- 性的欲求の減少

- 発疹
- かゆみ
- じんましん
- 目、顔、唇、舌、喉の腫れ
- 嘔声
- 呼吸困難または嚥下困難
- 胸痛
- 体位を変えると頭がおかしくなる
- 失神
- 意識の喪失
- 過熱感
- 激しい発汗

タペンタドールは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬を服用しているときに異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。古くなった薬や、薬の回収プログラムで不要になった薬は、すぐに処分する必要があります。近くに回収プログラムがない場合、またはすぐにアクセスできるプログラムがない場合は、古くなった、または不要になった薬をトイレに流してください。あなたの薬の適切な処分についてあなたの薬剤師に相談してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

タペンタドールを服用している間は、ナロキソンと呼ばれる救急薬をすぐに利用できるようにすることについて医師に相談する必要があります（例：自宅、オフィス）。ナロキソンは、過剰摂取による生命を脅かす影響を逆転させるために使用されます。それは血中の高レベルのオピオイドによって引き起こされる危険な症状を和らげるためにオピオイドの効果をブロックすることによって機能します。あなたが小さな子供や街頭や処方薬を乱用した人がいる家庭に住んでいる場合、あなたの医者はあなたにナロキソンを処方するかもしれません。あなたとあなたの家族、介護者、またはあなたと一緒に時間を過ごす人々が、過剰摂取を認識する方法、ナロキシンの使用方法、および緊急医療援助が到着するまで何をすべきかを知っていることを確認する必要があります。あなたの医者または薬剤師はあなたとあなたの家族に薬の使い方を教えます。手順については薬剤師に問い合わせるか、製造元のWebサイトにアクセスして手順を入手してください。過剰摂取の症状が発生した場合、友人または家族はナロキシンの初回投与を行い、すぐに911に電話し、緊急医療援助が到着するまであなたと一緒に注意深く見守る必要があります。ナロキソンを投与してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が再発した場合、その人はあなたにナロキシンの別の用量を与えるべきです。医療援助が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の用量を投与することができます。ナロキソンを投与してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が再発した場合、その人はあなたにナロキシンの別の用量を与えるべきです。医療援助が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の用量を投与することができます。ナロキソンを投与してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が再発した場合、その人はあなたにナロキシンの別の用量を与えるべきです。医療援助が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の用量を投与することができます。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 瞳孔の狭小化または拡大（目のくま）
- 眠気
- 応答またはウェイクアップできません
- 筋力低下
- 冷たく湿った肌
- 呼吸が遅い、または浅い
- 呼吸困難
- 心拍が遅くなりました

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はタペンタドールに対するあなたの体の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じるかもしれません。

臨床検査（特にメチレンブルーを含む検査）を受ける前に、タペンタドールを服用していることを医師と検査官に伝えてください。

この処方箋は補充できません。投薬を終えた後も痛みが続く場合は、医師に連絡してください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- [ヌシントラ®](#)
- [ヌシントラ®ER](#)

最終改訂日-2020年10月4日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日