



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Tapentadol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html>

Tapentadol

pronunciado como (ta pen' ta dol)

AVISO IMPORTANTE:

Tapentadol pode ser viciante, especialmente com uso prolongado. Tome tapentadol exatamente como indicado. Não tome mais, tome com mais frequência ou tome de uma maneira diferente da indicada pelo seu médico. Enquanto estiver tomando tapentadol, discuta com seu médico seus objetivos de tratamento da dor, duração do tratamento e outras maneiras de controlar sua dor. Informe o seu médico se você ou alguém da sua família bebe ou bebeu grandes quantidades de álcool, usa ou já usou drogas de rua, ou usou medicamentos prescritos em excesso, ou teve uma overdose, ou se você tem ou já teve depressão ou outra doença mental. Existe um risco maior de você abusar do tapentadol se tiver ou já teve alguma dessas condições.

Tapentadol pode causar problemas respiratórios graves ou potencialmente fatais, especialmente durante as primeiras 24 a 72 horas do seu tratamento e sempre que a sua dose for aumentada. O seu médico irá ajustar a sua dose para controlar a sua dor e diminuir o risco de ter problemas respiratórios graves. Informe o seu médico se você tem ou já teve respiração lenta ou asma. O seu médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar tapentadol. Informe também o seu médico se você tem ou já teve doença pulmonar, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC; um grupo de doenças pulmonares que inclui bronquite crônica e enfisema), traumatismo craniano, tumor cerebral ou qualquer condição que aumente a quantidade de pressão em seu cérebro. O risco de desenvolver problemas respiratórios pode ser maior se você for um adulto mais velho ou estiver enfraquecido ou desnutrido devido a uma doença.

Tomar certos outros medicamentos durante o tratamento com tapentadol pode aumentar o risco de você ter problemas respiratórios ou outros problemas respiratórios graves, com risco de vida, sedação ou coma. Informe o seu médico se estiver tomando ou planeja tomar algum dos seguintes medicamentos: benzodiazepínicos como alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan) e triazolam (Halcion); outros analgésicos narcóticos; medicamentos para doenças mentais ou náuseas; relaxantes musculares; sedativos; pílulas para dormir; ou tranquilizantes. Seu médico pode precisar alterar as dosagens de seus medicamentos e irá monitorar

você com cuidado. Se você tomar tapentadol com qualquer um desses medicamentos e desenvolver algum dos seguintes sintomas, ligue para o seu médico imediatamente ou procure atendimento médico de emergência: tontura incomum, tontura, sonolência extrema, respiração lenta ou difícil ou falta de resposta. Certifique-se de que seu cuidador ou familiares saibam quais sintomas podem ser graves para que possam ligar para o médico ou atendimento médico de emergência se você não puder procurar tratamento por conta própria.

Beber álcool, tomar medicamentos prescritos ou não que contenham álcool ou usar drogas de rua durante o tratamento com tapentadol aumenta o risco de sofrer efeitos colaterais graves e com risco de vida. Não beba álcool, tome medicamentos prescritos ou não prescritos que contenham álcool ou use drogas de rua durante o tratamento com tapentadol.

Não permita que outra pessoa tome a sua medicação. Tapentadol pode prejudicar ou causar a morte de outras pessoas que tomam sua medicação, especialmente crianças. Mantenha o tapentadol em um local seguro para que ninguém mais possa tomá-lo acidentalmente ou de propósito. Tenha especial cuidado para manter o tapentadol fora do alcance das crianças. Mantenha o controle de quantos comprimidos ou comprimidos de liberação prolongada restam para saber se algum medicamento está faltando. Jogue todos os comprimidos ou comprimidos de liberação prolongada desatualizados ou que não sejam mais necessários no vaso sanitário para que outros não os tomem.

Se estiver a tomar os comprimidos de liberação prolongada, engula-os inteiros; não os mastigue, quebre, divida, esmague ou dissolva. Se engolir comprimidos de liberação prolongada partidos, mastigados, esmagados ou dissolvidos, pode receber tapentadol demais de uma só vez em vez de lentamente ao longo de 12 horas. Isso pode causar sérios problemas, incluindo overdose e morte.

Informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se você tomar tapentadol regularmente durante a gravidez, seu bebê pode apresentar sintomas de abstinência com risco de vida após o nascimento. Informe o médico do seu bebê imediatamente se o bebê apresentar algum dos seguintes sintomas: irritabilidade, hiperatividade, sono anormal, choro agudo, tremor incontrolável de uma parte do corpo, vômitos, diarreia ou falta de ganho de peso.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar tapentadol.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com tapentadol e sempre que preencher a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

por que este medicamento é prescrito?

Os comprimidos de tapentadol são usados para tratar a dor aguda moderada a grave (dor que começa repentinamente, tem uma causa específica e espera-se que desapareça quando a causa da dor for curada). Tapentadol

Os comprimidos de liberação prolongada são usados para tratar a dor neuropática grave (dor causada por danos nos nervos) em pessoas com diabetes. Os comprimidos de liberação prolongada de tapentadol são usados apenas para tratar pessoas que precisam de medicação 24 horas por dia para aliviar a dor que não pode ser controlada pelo uso de outros analgésicos. Tapentadol está em uma classe de medicamentos chamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona alterando a forma como o cérebro e o sistema nervoso respondem à dor.

como este medicamento deve ser usado?

Tapentadol vem como um comprimido e um comprimido de liberação prolongada (ação prolongada) para tomar por via oral. Os comprimidos são geralmente tomados com ou sem alimentos a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. Se estiver a tomar tapentadol comprimidos, o seu médico pode dizer-lhe que pode tomar uma segunda dose 1 hora após a primeira dose no primeiro dia de tratamento, se necessário para tratar a sua dor. Não tome doses extras em nenhum outro momento durante o tratamento e nunca tome doses extras dos comprimidos de liberação prolongada. Os comprimidos de liberação prolongada são tomados uma vez a cada 12 horas. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome tapentadol exatamente como indicado.

Se estiver a tomar os comprimidos de liberação prolongada, engula-os um de cada vez com bastante água. Engula cada comprimido logo após colocá-lo na boca.

O seu médico provavelmente iniciará com uma dose baixa de tapentadol e aumentará gradualmente a sua dose até que sua dor seja controlada. O seu médico pode ajustar a sua dose a qualquer momento durante o seu tratamento se a sua dor não for controlada. Se sentir que a sua dor não está controlada, contacte o seu médico. Não altere a dose da sua medicação sem falar com o seu médico.

Depois de tomar tapentadol por um período de tempo, seu corpo pode se acostumar com a medicação. Se isso acontecer, seu médico pode precisar aumentar sua dose de medicação para controlar sua dor. Fale com o seu médico sobre como se sente durante o tratamento com tapentadol.

Não pare de tomar tapentadol sem falar com o seu médico. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente. Se parar subitamente de tomar tapentadol, pode sentir sintomas de abstinência, tais como inquietação; ansiedade; irritabilidade; Olhos lacrimejantes; bocejo; arrepios; sudorese; dificuldade em adormecer ou manter o sono; tremores; agitação incontrolável de uma parte do seu corpo; dores musculares, nas costas ou nas articulações; fraqueza; náusea; vômito; diarreia; dores de estômago; perda de apetite; coriza, espirros ou tosse; cabelo em sua pele em pé; respiração rápida; batimento cardíaco acelerado; alargamento das pupilas (círculos pretos no meio dos olhos); ou alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem).

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar tapentadol,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao tapentadol, ou a qualquer outro medicamento, ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de tapentadol ou comprimidos de liberação prolongada. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique o

Guia de Medicação para uma lista dos ingredientes.

- informe o seu médico se estiver tomando os seguintes medicamentos ou se parou de tomá-los nas últimas duas semanas: inibidores da monoamina oxidase (MAO), como isocarboxazida (Marplan), linezolid (Zyvox), azul de metileno, fenelzina (Nardil), rasagilina (Azilect) , selegilina (Emsam, Eldepryl, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate). Informe também o seu médico se algum destes medicamentos lhe for prescrito durante o tratamento com tapentadol. O seu médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar tapentadol se estiver a tomar um ou mais destes medicamentos.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: anti-histamínicos (em medicamentos para tosse, resfriado e alergia); buprenorfina (Buprenex, Butrans, em Suboxone, em Zubsolv); butorfanol; ciclobenzaprina (Amrix); dextrometorfano (encontrado em muitos medicamentos para tosse; no Nuedexta); medicamentos para doença do intestino irritável, enjôo, doença de Parkinson, úlceras ou problemas urinários; lítio (Lithobid); medicamentos para enxaquecas, como almotriptano (Axert), eletriptano (Relpax), frovatriptano (Frova), naratriptano (Amerge), rizatriptano (Maxalt), sumatriptano (Imitrex, em Treximet) e zolmitriptano (Zomig); mirtazapina (Remeron); nalbufina; pentazocina (Talwin); inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRSs), como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra, em Symbyx), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) e sertralina (Zoloft) ; seletivo inibidores da recaptção de serotonina/norepinefrina (SNRIs) tais como desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta), milnaciprano (Savella) e venlafaxina (Effexor); tramadol (Conzip, Ultram, em Ultracet); trazodona; ou antidepressivos tricíclicos ('elevadores do humor'), como amitriptilina, amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Silenor, Zonalon), imipramina (Surmontil, Tofranil), nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil) e trimipramina (Surmontil). Muitos outros medicamentos também podem interagir com o tapentadol, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente erva de São João e triptofano.
- informe o seu médico se você tem ou já teve alguma das condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE ou íleo paralítico (condição na qual os alimentos digeridos não se movem pelos intestinos). O seu médico pode dizer-lhe para não tomar tapentadol.
- informe o seu médico se tem ou já teve um bloqueio no estômago ou intestinos, qualquer condição que cause dificuldade em urinar; ou doença do pâncreas, vesícula biliar, rim, tireóide ou fígado.
- informe o seu médico se estiver a amamentar.
- você deve saber que este medicamento pode diminuir a fertilidade em homens e mulheres. Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar tapentadol.
- se vai ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar tapentadol.
- deve saber que o tapentadol pode deixá-lo sonolento. Não dirija um carro, opere máquinas ou participe de outras atividades possivelmente perigosas até saber como este medicamento o afeta.
- deve saber que o tapentadol pode causar tonturas, vertigens e desmaios quando se levanta muito rapidamente de uma posição deitada. Para evitar esse problema, saia da cama devagar, apoiando os pés no chão por alguns minutos antes de se levantar.
- deve saber que o tapentadol pode causar obstipação. Converse com seu médico sobre como mudar sua dieta ou usar outros medicamentos para prevenir ou tratar a constipação enquanto estiver tomando tapentadol.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se estiver a tomar comprimidos de tapentadol, o seu médico provavelmente irá dizer-lhe para tomar a medicação conforme necessário. Se o seu médico lhe disse para tomar os comprimidos regularmente, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Se estiver a tomar tapentadol cápsulas de libertação prolongada, salte a dose esquecida e continue o seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Tapentadol pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- dor de cabeça
- azia
- dor de estômago
- boca seca
- cansaço excessivo
- ansiedade
- sonolência
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- sonhos anormais
- irritabilidade
- sensação repentina de calor

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados nas secções de PRECAUÇÕES ESPECIAIS ou ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- convulsões
- agitação, alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem), febre, sudorese, confusão, batimentos cardíacos acelerados, calafrios, rigidez muscular grave ou espasmos, perda de coordenação, náuseas, vômitos ou diarreia
- náuseas, vômitos, perda de apetite, fraqueza ou tontura
- incapacidade de obter ou manter uma ereção
- menstruação irregular
- desejo sexual diminuído

- irritação na pele
- coceira
- urticária
- inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua ou garganta
- rouquidão
- dificuldade em respirar ou engolir
- dor no peito
- sentindo-se tonto quando você muda de posição
- sentindo tonto
- perda de consciência
- sentindo superaquecido
- transpiração intensa

Tapentadol pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Você deve descartar imediatamente qualquer medicamento desatualizado ou que não seja mais necessário por meio de um programa de devolução de medicamentos. Se você não tiver um programa de devolução por perto ou um que possa acessar imediatamente, jogue qualquer medicamento desatualizado ou que não seja mais necessário no vaso sanitário. Converse com seu farmacêutico sobre o descarte adequado de seu medicamento.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Enquanto estiver tomando tapentadol, você deve conversar com seu médico sobre ter um medicamento de resgate chamado naloxona prontamente disponível (por exemplo, em casa, no escritório). A naloxona é usada para reverter os efeitos potencialmente fatais de uma overdose. Funciona bloqueando os efeitos dos opiáceos para aliviar os sintomas perigosos causados por níveis elevados de opiáceos no sangue. Seu médico também pode prescrever naloxona se você mora em uma casa onde há crianças pequenas ou alguém que abusou de drogas de rua ou de prescrição. Você deve certificar-se de que você e seus familiares, cuidadores ou pessoas que convivem com você saibam como reconhecer uma overdose, como usar naloxona e o que fazer até que a ajuda médica de emergência chegue. Seu médico ou farmacêutico mostrará a você e seus familiares como usar o medicamento. Peça as instruções ao seu farmacêutico ou visite o site do fabricante para obter as instruções. Se ocorrerem sintomas de overdose, um amigo ou membro da família deve dar a primeira dose de naloxona, ligar para o 911 imediatamente e ficar com você e observá-lo de perto até que a ajuda médica de emergência chegue. Seus sintomas podem retornar dentro de alguns minutos após receber naloxona. Se os sintomas retornarem, a pessoa deve administrar outra dose de naloxona. Doses adicionais podem ser administradas a cada 2 a 3 minutos, se os sintomas retornarem antes da chegada da ajuda médica. Seus sintomas podem retornar dentro de alguns minutos após receber naloxona. Se os sintomas retornarem, a pessoa deve administrar outra dose de naloxona. Doses adicionais podem ser administradas a cada 2 a 3 minutos, se os sintomas retornarem antes da chegada da ajuda médica. Seus sintomas podem retornar dentro de alguns minutos após você receber naloxona. Se os sintomas retornarem, a pessoa deve administrar outra dose de naloxona. Doses adicionais podem ser administradas a cada 2 a 3 minutos, se os sintomas retornarem antes da chegada da ajuda médica.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- estreitamento ou alargamento das pupilas (olheiras nos olhos)
- sonolência
- incapaz de responder ou acordar
- fraqueza muscular
- pele fria e pegajosa
- respiração lenta ou superficial
- dificuldade para respirar
- batimento cardíaco lento

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com seu médico e laboratório. O seu médico pode pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo ao tapentadol.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial (especialmente aqueles que envolvem azul de metileno), informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar tapentadol.

Esta receita não é recarregável. Se continuar a sentir dor depois de terminar a medicação, ligue para o seu médico.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Nucynta®
- Nucynta®pronto-socorro

Última revisão - 10/04/2020

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022