



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Tapentadol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html>

Tapentadol

pronunciado como (ta pen' ta dol)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Tapentadol puede crear hábito, especialmente con el uso prolongado. Tome tapentadol exactamente como se indica. No tome más, no lo tome con más frecuencia ni lo tome de una manera diferente a la indicada por su médico. Mientras toma tapentadol, hable con su proveedor de atención médica sobre los objetivos del tratamiento del dolor, la duración del tratamiento y otras formas de controlar el dolor. Dígale a su médico si usted o alguien de su familia bebe o ha bebido grandes cantidades de alcohol, usa o ha usado drogas ilegales, o ha usado en exceso medicamentos recetados, o ha tenido una sobredosis, o si tiene o alguna vez ha tenido depresión o otra enfermedad mental. Existe un mayor riesgo de que use tapentadol en exceso si tiene o alguna vez ha tenido alguna de estas afecciones.

Tapentadol puede causar problemas respiratorios graves o potencialmente mortales, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas de su tratamiento y cada vez que se aumenta su dosis. Su médico ajustará su dosis para controlar su dolor y disminuir el riesgo de que experimente problemas respiratorios graves. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido respiración lenta o asma. Su médico probablemente le dirá que no tome tapentadol. También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad pulmonar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC; un grupo de enfermedades pulmonares que incluye bronquitis crónica y enfisema), una lesión en la cabeza, un tumor cerebral o cualquier condición que aumente la cantidad de presión en su cerebro. El riesgo de que desarrolle problemas respiratorios puede ser mayor si es un adulto mayor o si está debilitado o desnutrido debido a una enfermedad.

Tomar ciertos otros medicamentos durante su tratamiento con tapentadol puede aumentar el riesgo de que experimente problemas respiratorios u otros problemas respiratorios graves que pongan en riesgo su vida, sedación o coma. Informe a su médico si está tomando o planea tomar alguno de los siguientes medicamentos: benzodiazepinas como alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan) y triazolam (Halcion); otros analgésicos narcóticos; medicamentos para enfermedades mentales o náuseas; relajantes musculares; sedantes; pastillas para dormir; o tranquilizantes. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos y controlará

usted con cuidado. Si toma tapentadol con cualquiera de estos medicamentos y desarrolla alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato o busque atención médica de emergencia: mareos inusuales, aturdimiento, somnolencia extrema, respiración lenta o difícil, o falta de respuesta. Asegúrese de que su cuidador o los miembros de su familia sepan qué síntomas pueden ser graves para que puedan llamar al médico o a la atención médica de emergencia si no puede buscar tratamiento por su cuenta.

Beber alcohol, tomar medicamentos recetados o de venta libre que contengan alcohol o usar drogas ilícitas durante su tratamiento con tapentadol aumenta el riesgo de que experimente efectos secundarios graves y potencialmente mortales. No beba alcohol, no tome medicamentos recetados o de venta libre que contengan alcohol ni use drogas ilícitas durante su tratamiento con tapentadol.

No permita que nadie más tome su medicamento. Tapentadol puede dañar o causar la muerte a otras personas que toman su medicamento, especialmente a los niños. Guarde el tapentadol en un lugar seguro para que nadie más pueda tomarlo accidentalmente o a propósito. Tenga especial cuidado de mantener el tapentadol fuera del alcance de los niños. Lleve un registro de cuántas tabletas o tabletas de liberación prolongada quedan para saber si falta algún medicamento. Deseche todas las tabletas o tabletas de liberación prolongada que estén vencidas o que ya no necesite en el inodoro para que otros no las tomen.

Si está tomando las tabletas de liberación prolongada, tráguelas enteras; no las mastique, rompa, divida, aplaste ni disuelva. Si traga tabletas de liberación prolongada partidas, masticadas, trituradas o disueltas, es posible que reciba demasiado tapentadol de una vez en lugar de lentamente durante 12 horas. Esto puede causar serios problemas, incluyendo sobredosis y muerte.

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si toma tapentadol regularmente durante su embarazo, su bebé puede experimentar síntomas de abstinencia potencialmente mortales después del nacimiento. Informe al médico de su bebé de inmediato si su bebé experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: irritabilidad, hiperactividad, sueño anormal, llanto agudo, temblor incontrolable de una parte del cuerpo, vómitos, diarrea o falta de aumento de peso.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar tapentadol.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience su tratamiento con tapentadol y cada vez que surta su receta. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Las tabletas de tapentadol se usan para tratar el dolor agudo de moderado a severo (dolor que comienza repentinamente, tiene una causa específica y se espera que desaparezca cuando la causa del dolor se cure). Tapentadol

Las tabletas de liberación prolongada se usan para tratar el dolor neuropático intenso (dolor causado por daño a los nervios) en personas que tienen diabetes. Las tabletas de liberación prolongada de tapentadol solo se usan para tratar a las personas que se espera que necesiten medicamentos las 24 horas del día para aliviar el dolor que no se puede controlar con el uso de otros analgésicos. El tapentadol pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Tapentadol viene en tabletas y tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por vía oral. Las tabletas generalmente se toman con o sin alimentos cada 4 a 6 horas según sea necesario. Si está tomando tabletas de tapentadol, su médico puede decirle que puede tomar una segunda dosis tan pronto como 1 hora después de la primera dosis en su primer día de tratamiento si es necesario para tratar su dolor. No tome dosis adicionales en ningún otro momento durante su tratamiento y nunca tome dosis adicionales de las tabletas de liberación prolongada. Las tabletas de liberación prolongada se toman una vez cada 12 horas. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome tapentadol exactamente como se indica.

Si está tomando las tabletas de liberación prolongada, tráguelas una a la vez con abundante agua. Trague cada tableta inmediatamente después de ponerla en su boca.

Es probable que su médico le recete una dosis baja de tapentadol y la aumente gradualmente hasta que se controle el dolor. Su médico puede ajustar su dosis en cualquier momento durante su tratamiento si su dolor no está controlado. Si siente que su dolor no está controlado, llame a su médico. No cambie la dosis de su medicamento sin hablar con su médico.

Después de tomar tapentadol por un período de tiempo, es posible que su cuerpo se acostumbre al medicamento. Si esto sucede, es posible que su médico necesite aumentar su dosis de medicamento para controlar su dolor. Hable con su médico acerca de cómo se siente durante su tratamiento con tapentadol.

No deje de tomar tapentadol sin hablar con su médico. Tu doctor probablemente reducirá tu dosis de forma gradual. Si deja de tomar tapentadol repentinamente, puede experimentar síntomas de abstinencia como inquietud; ansiedad; irritabilidad; ojos llorosos; bostezando; escalofríos; transpiración; dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido; temblando; temblor incontrolable de una parte de su cuerpo; dolor muscular, de espalda o articular; debilidad; náuseas; vómitos; Diarrea; calambres en el estómago; pérdida de apetito; secreción nasal, estornudos o tos; vello en la piel de punta; respiración rápida; latidos cardíacos acelerados; dilatación de las pupilas (círculos negros en el medio de los ojos); o alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen).

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar tapentadol,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al tapentadol, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de tapentadol o de liberación prolongada. Pregunte a su farmacéutico o consulte el

Guía del medicamento para obtener una lista de los ingredientes.

- informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos o si dejó de tomarlos en las últimas dos semanas: inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) como isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), azul de metileno, fenelzina (Nardil), rasagilina (Azilect), selegilina (Emsam, Eldepryl, Zelapar) y tranilcipromina (Parnate). Informe también a su médico si le recetan alguno de estos medicamentos durante su tratamiento con tapentadol. Su médico probablemente le indicará que no tome tapentadol si está tomando uno o más de estos medicamentos.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antihistamínicos (en medicamentos para la tos, el resfriado y las alergias); buprenorfina (Buprenex, Butrans, en Suboxone, en Zubsolv); butorfanol; ciclobenzaprina (Amrix); dextrometorfano (que se encuentra en muchos medicamentos para la tos; en Nuedexta); medicamentos para la enfermedad del intestino irritable, el mareo por movimiento, la enfermedad de Parkinson, las úlceras o los problemas urinarios; litio (Lithobid); medicamentos para las migrañas como almotriptán (Axert), eletriptán (Relpax), frovatriptán (Frova), naratriptán (Amerge), rizatriptán (Maxalt), sumatriptán (Imitrex, en Treximet) y zolmitriptán (Zomig); mirtazapina (Remeron); nalbufina; pentazocina (Talwin); inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra, en Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) y sertralina (Zoloft); selectivo inhibidores de la recaptación de serotonina/norepinefrina (IRSN) como desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta), milnacipran (Savella) y venlafaxina (Effexor); tramadol (Conzip, Ultram, en Ultracet); trazodona; o antidepresivos tricíclicos ("elevadores del estado de ánimo") como amitriptilina, amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Silenor, Zonalon), imipramina (Surmontil, Tofranil), nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil) y trimipramina (Surmontil). Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con tapentadol, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente la hierba de San Juan y el triptófano.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido alguna de las condiciones mencionadas en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE o íleo paralítico (condición en la que los alimentos digeridos no se mueven a través de los intestinos). Es posible que su médico le indique que no tome tapentadol.
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una obstrucción en el estómago o los intestinos, cualquier afección que provoque dificultad para orinar; o enfermedad del páncreas, la vesícula biliar, los riñones, la tiroides o el hígado.
- Informe a su médico si está amamantando.
- Debe saber que este medicamento puede disminuir la fertilidad en hombres y mujeres. Hable con su médico sobre los riesgos de tomar tapentadol.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando tapentadol.
- Debe saber que tapentadol puede provocarle somnolencia. No conduzca un automóvil, opere maquinaria ni participe en ninguna otra actividad posiblemente peligrosa hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.
- Debe saber que el tapentadol puede causar mareos, aturdimiento y desmayos cuando se levanta demasiado rápido después de estar acostado. Para evitar este problema, levántese de la cama lentamente, apoyando los pies en el suelo durante unos minutos antes de ponerse de pie.
- Debe saber que tapentadol puede causar estreñimiento. Hable con su médico acerca de cambiar su dieta o usar otros medicamentos para prevenir o tratar el estreñimiento mientras toma tapentadol.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si está tomando tabletas de tapentadol, su médico probablemente le indicará que tome el medicamento según sea necesario. Si su médico le ha dicho que tome los comprimidos regularmente, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si está tomando cápsulas de liberación prolongada de tapentadol, omita la dosis que olvidó y continúe con su horario regular de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El tapentadol puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de cabeza
- acidez
- dolor de estómago
- boca seca
- cansancio excesivo
- ansiedad
- somnolencia
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- sueños anormales
- irritabilidad
- repentina sensación de calor

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los enumerados en las secciones PRECAUCIONES ESPECIALES o ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- convulsiones
- agitación, alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen), fiebre, sudoración, confusión, latidos cardíacos rápidos, escalofríos, rigidez o espasmos musculares severos, pérdida de coordinación, náuseas, vómitos o diarrea
- náuseas, vómitos, pérdida de apetito, debilidad o mareos
- incapacidad para conseguir o mantener una erección
- menstruación irregular
- disminución del deseo sexual

- erupción
- Comezón
- urticaria
- hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua o la garganta
- ronquera
- dificultad para respirar o tragar
- Dolor de pecho
- sentirse mareado cuando cambia de posición
- sensación de desmayo
- pérdida de consciencia
- sentirse sobrecalentado
- sudoración intensa

El tapentadol puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). Debe desechar inmediatamente cualquier medicamento que esté vencido o que ya no necesite a través de un programa de devolución de medicamentos. Si no tiene un programa de devolución cerca o uno al que pueda acceder de inmediato, deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no necesite en el inodoro. Hable con su farmacéutico sobre la eliminación adecuada de su medicamento.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Mientras toma tapentadol, debe hablar con su médico acerca de tener un medicamento de rescate llamado naloxona fácilmente disponible (p. ej., en casa, en la oficina). La naloxona se usa para revertir los efectos potencialmente mortales de una sobredosis. Actúa bloqueando los efectos de los opiáceos para aliviar los síntomas peligrosos causados por los altos niveles de opiáceos en la sangre. Su médico también puede recetarle naloxona si vive en un hogar donde hay niños pequeños o alguien que ha abusado de drogas callejeras o recetadas. Debe asegurarse de que usted y los miembros de su familia, los cuidadores o las personas que pasan tiempo con usted sepan cómo reconocer una sobredosis, cómo usar naloxona y qué hacer hasta que llegue la ayuda médica de emergencia. Su médico o farmacéutico le mostrará a usted y a los miembros de su familia cómo usar el medicamento. Pídale a su farmacéutico las instrucciones o visite el sitio web del fabricante para obtener las instrucciones. Si se presentan síntomas de sobredosis, un amigo o familiar debe administrar la primera dosis de naloxona, llamar al 911 de inmediato y quedarse con usted y vigilarlo de cerca hasta que llegue la ayuda médica de emergencia. Sus síntomas pueden regresar dentro de unos minutos después de recibir naloxona. Si sus síntomas regresan, la persona debe darle otra dosis de naloxona. Se pueden administrar dosis adicionales cada 2 a 3 minutos, si los síntomas regresan antes de que llegue la ayuda médica. Sus síntomas pueden regresar dentro de unos minutos después de recibir naloxona. Si sus síntomas regresan, la persona debe darle otra dosis de naloxona. Se pueden administrar dosis adicionales cada 2 a 3 minutos, si los síntomas regresan antes de que llegue la ayuda médica. Sus síntomas pueden regresar dentro de unos minutos después de recibir naloxona. Si sus síntomas regresan, la persona debe darle otra dosis de naloxona. Se pueden administrar dosis adicionales cada 2 a 3 minutos, si los síntomas regresan antes de que llegue la ayuda médica.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- estrechamiento o ensanchamiento de las pupilas (círculos oscuros en los ojos)
- somnolencia
- incapaz de responder o despertar
- debilidad muscular
- piel fría y húmeda
- respiración lenta o superficial
- respiración dificultosa
- latido del corazón lento

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo al tapentadol.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio (especialmente las que involucren azul de metileno), informe a su médico y al personal del laboratorio que está tomando tapentadol.

Esta receta no es recargable. Si continúa teniendo dolor después de terminar el medicamento, llame a su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Nucynta®
- Nucynta®Urgencias

Última revisión - 10/04/2020

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022