

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html>

تابنتادول تنطق (ta pen 'ta dol)

تحذيرهام:

قد يتشكل تابنتادول عادة ، خاصة مع الاستخدام المطول. خذ تابنتادول بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ المزيد منه ، أو تناوله في كثير من الأحيان ، أو تناوله بطريقة مختلفة عن التي يوجهها طبيبك. أثناء تناول تابنتادول ، ناقش مع مقدم الرعاية الصحية أهداف علاج الألم ومدة العلاج وطرق أخرى لإدارة الألم. أخبر طبيبك إذا كنت أنت أو أي شخص في عائلتك يشرب أو سبق لك أن شربت كميات كبيرة من الكحول ، أو تعاطيت أو سبق لك تعاطي المخدرات في الشوارع ، أو تناولت الأدوية الموصوفة بشكل مفرط ، أو تناولت جرعة زائدة ، أو إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو عانيت من قبل. مرض عقلي آخر. هناك خطر أكبر من أنك سوف تفرط في استخدام تابنتادول إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من أي من هذه الشروط.

قد يسبب Tapentadol مشاكل خطيرة في التنفس أو تهدد الحياة ، خاصة خلال أول 24 إلى 72 ساعة من العلاج وفي أي وقت يتم فيه زيادة جرعتك. سيقوم طبيبك بتعديل جرعتك للسيطرة على ألمك وتقليل خطر تعرضك لمشاكل خطيرة في التنفس. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من تباطؤ في التنفس أو الربو. من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول تابنتادول. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت مصاباً أو سبق أن عانيت من مرض رئوي مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ؛ مجموعة من أمراض الرئة تشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة) ، أو إصابة في الرأس ، أو ورم في المخ ، أو أي حالة تزيد من الكمية من الضغط في عقلك. قد يكون خطر إصابتك بمشاكل في التنفس أعلى إذا كنت من كبار السن أو كنت ضعيفاً أو تعاني من سوء التغذية بسبب المرض.

قد يؤدي تناول بعض الأدوية الأخرى أثناء علاجك باستخدام تابنتادول إلى زيادة خطر تعرضك لمشاكل في التنفس أو غيرها من مشاكل التنفس الخطيرة أو المهددة للحياة أو التخدير أو الغيبوبة. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أو تخطط لتناول أي من الأدوية التالية: البنزوديازيبينات مثل ألبرازولام (زاناكس) ، ديازيبام (دياستات ، فاليوم) ، إستازولام ، فلورازيبام ، لورازيبام (أتيفان) ، وتريازولام (هالسيون) ؛ أدوية الألم المخدرة الأخرى ؛ أدوية للأمراض العقلية أو الغثيان. مرخيات العضلات المهدئات. حبوب منومة؛ أو المهدئات. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك وسيراقبها

انت بعناية. إذا كنت تتناول تابنتادول مع أي من هذه الأدوية وظهرت لديك أي من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور أو اطلب رعاية طبية طارئة: دوخة غير عادية ، أو دوام ، أو نعاس شديد ، أو تنفس بطيء أو صعوبة ، أو عدم استجابة. تأكد من أن مقدم الرعاية أو أفراد أسرتك يعرفون الأعراض التي قد تكون خطيرة حتى يتمكنوا من الاتصال بالطبيب أو الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت غير قادر على طلب العلاج بمفردك.

يزيد شرب الكحول ، أو تناول الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي تحتوي على الكحول ، أو استخدام عقاقير الشوارع أثناء علاجك بتابنتادول من خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة تهدد حياتك. لا تشرب الكحول ، أو تتناول الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي تحتوي على الكحول ، أو تستخدم عقاقير الشوارع أثناء علاجك باستخدام تابنتادول.

لا تسمح لأي شخص آخر بتناول دوائك. قد يؤدي تابنتادول أو يتسبب في الوفاة للأشخاص الآخرين الذين يتناولون دوائك ، وخاصة الأطفال. احتفظ بـ tapentadol في مكان آمن حتى لا يتمكن أي شخص آخر من تناوله عن طريق الخطأ أو عن قصد. كن حذراً بشكل خاص لإبقاء تابنتادول بعيداً عن متناول الأطفال. تتبع عدد الأجهزة اللوحية أو الأقراص الممتدة المفعول المتبقية حتى تعرف ما إذا كان هناك أي دواء مفقود. اغسل أي أقراص أو أقراص ممتدة المفعول عفا عليها الزمن أو لم تعد بحاجة إليها في المرحاض حتى لا يأخذها الآخرون.

إذا كنت تتناول أقراص ممتدة المفعول ، ابتلعها كاملة ؛ لا تمضغها أو تكسرها أو تقسمها أو تسحقها أو تذوبها. إذا ابتلعت أقراصاً مكسورة أو ممضوغة أو سحقاً أو مذابة ممتدة المفعول ، فقد تتلقى الكثير من التابنتادول دفعة واحدة بدلاً من ببطء أكثر من 12 ساعة. قد يتسبب هذا في مشاكل خطيرة ، بما في ذلك الجرعة الزائدة والموت.

أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. إذا كنت تتناول تابنتادول بانتظام أثناء الحمل ، فقد يعاني طفلك من أعراض انسحاب مهددة للحياة بعد الولادة. أخبر طبيب طفلك على الفور إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية: التهيج ، وفرط النشاط ، والنوم غير الطبيعي ، والبكاء الشديد ، والهز الذي لا يمكن السيطرة عليه لجزء من الجسم ، والقيء ، والإسهال ، أو عدم زيادة الوزن.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول تابنتادول.

سيعطيك طبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ علاجك باستخدام تابنتادول وفي كل مرة تقوم فيها بتعبئة الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA)

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm] <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

لماذا وصف هذا الدواء؟

تستخدم أقراص Tapentadol لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة الحادة (الألم الذي يبدأ فجأة ، وله سبب محدد ، ومن المتوقع أن يختفي عند شفاء سبب الألم). تابنتادول.

تستخدم الأقراص الممتدة المفعول لعلاج آلام الأعصاب الشديدة (الألم الناجم عن تلف الأعصاب) لدى مرضى السكري. تستخدم أقراص Tapentadol ممتدة المفعول فقط لعلاج الأشخاص الذين يُتوقع أن يحتاجوا إلى دواء على مدار الساعة لتخفيف الألم الذي لا يمكن السيطرة عليه عن طريق استخدام مسكنات الألم الأخرى. ينتمي Tapentadol إلى فئة من الأدوية تسمى المسكنات الأفيونية (المخدرة). إنه يعمل عن طريق تغيير طريقة استجابة الدماغ والجهاز العصبي للألم.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Tapentadol كجهاز لوجي وجهاز لوجي ممتد المفعول (طويل المفعول) ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناول الأقراص مع الطعام أو بدونه كل 4 إلى 6 ساعات حسب الحاجة. إذا كنت تتناول أقراص تابنتادول ، فقد يخبرك طبيبك أنه يمكنك تناول جرعة ثانية بمجرد ساعة واحدة بعد الجرعة الأولى في اليوم الأول من العلاج إذا لزم الأمر لعلاج ألمك. لا تأخذ جرعات إضافية في أي وقت آخر أثناء العلاج ولا تتناول جرعات إضافية من الأقراص الممتدة المفعول. تؤخذ أقراص الإصدار الممتد كل 12 ساعة. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ تابنتادول بالضبط حسب التوجيهات.

إذا كنت تتناول أقراص ممتدة المفعول ، ابتلعها واحدة تلو الأخرى مع الكثير من الماء. ابتلع كل قرص مباشرة بعد وضعه في فمك.

من المحتمل أن يبدأ طبيبك بجرعة منخفضة من تابنتادول ويزيد جرعتك تدريجياً حتى يتم السيطرة على الألم. قد يقوم طبيبك بتعديل جرعتك في أي وقت أثناء العلاج إذا لم يتم السيطرة على ألمك. إذا شعرت أن ألمك لا يمكن السيطرة عليه ، فاتصل بطبيبك. لا تغير جرعة الدواء دون التحدث مع طبيبك.

بعد تناول تابنتادول لفترة من الوقت ، قد يعتاد جسمك على الدواء. إذا حدث هذا ، فقد يحتاج طبيبك إلى زيادة جرعتك من الدواء للسيطرة على ألمك. تحدث إلى طبيبك حول ما تشعر به أثناء علاجك باستخدام تابنتادول.

لا تتوقف عن تناول تابنتادول دون التحدث مع طبيبك. من المحتمل أن طبيبك تقلل الجرعة تدريجياً. إذا توقفت فجأة عن تناول تابنتادول ، فقد تواجه أعراض انسحاب مثل الأرق. القلق؛ التهيج؛ عيون دامعة؛ تئؤب. قشعريرة. التعرق. صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ؛ يرتجف؛ اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه لجزء من جسمك ؛ آلام العضلات أو الظهر أو المفاصل. ضعف؛ غثيان؛ القيء. إسهال؛ تقلصات المعدة؛ فقدان الشهية؛ سيلان الأنف أو العطس أو السعال. الشعور على بشرتك يقف في النهاية؛ تنفس سريع ضربات قلب سريعة اتساع حدقة العين (دوائر سوداء في منتصف العين) ؛ أو هلوسات (رؤية أشياء أو سماع أصوات غير موجودة).

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول تابنتادول ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه تابنتادول ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من المكونات الموجودة في أقراص تابنتادول أو أقراص ممتدة المفعول. اسأل الصيدلي الخاص بك أو تحقق من

دليل الدواء لقائمة المكونات.

- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول الأدوية التالية أو توقفت عن تناولها خلال الأسبوعين الماضيين: مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAO) مثل إيزوكاربوكسازيد (ماربلان) ، لينزوليد (زيفوكس) ، الميثيلين الأزرق ، فينيلزين (نارديل) ، راساجيلين (أزيلكت) ، سيليجيلين (Emsam ، Eldepryl ، Zelapar) ، و (Parnate) tranylcypromine. أخبر طبيبك أيضاً إذا تم وصف أي من هذه الأدوية لك أثناء علاجك باستخدام تابنتادول. من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول تابنتادول إذا كنت تتناول واحداً أو أكثر من هذه الأدوية.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات الهيستامين (في أدوية السعال والبرد والحساسية). البوبرينورفين (بوبرينكس ، بوترانس ، في سوبوكسون ، في زوبسولف) ؛ بوتورفانول. سيكلوبنزابرين (أمريكس) ؛ ديكستروميثورفان (يوجد في العديد من أدوية السعال ؛ في Nuedexta) ؛ أدوية لمرض القولون العصبي أو دوارة الحركة أو مرض باركنسون أو القرحة أو مشاكل المسالك البولية ؛ الليثيوم (ليثويد) ؛ أدوية الصداع النصفي مثل (Zomig) (and zolmitriptan) ، (Imitrex ، sumatriptan) ، (Maxalt) rizatriptan ، (Amerge) (naratriptan) ، (Frova) (frovatriptan) ، (Relpax) (eletriptan) ، (Axert) (almotriptan) ؛ ميرتازابين (ريميرون) ؛ نابوفين. بنتازوسين (تالوين) ؛ مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل سيتالوبرام (سيليكسا) ، إسيتالوبرام (ليكسابرو) ، فلوكستين (بروزاك) ، سارافيم ، سيلفيما ، في سيمبيكس) ، فلو فوكسامين (لوفوكس) ، باروكستين (بريسديل ، باكسيل ، بيكسوفت) ، وسيرترالين ؛ انتقائي
- مثبطات امتصاص السيروتونين / النورينفرين (SNRIs) مثل ديسفينلافكسين (خديزلا ، بريستيك) ، دولوكستين (سيمبالتا) ، ميلناسيبيران (سافيل) ، وفينلافكسين (إيفكسور) ؛ ترامادول (Ultracet ، في Ultracet) ؛ ترازودون. أمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مساعد الحالة المزاجية) مثل أميتريبتيلين ، أموكسابين ، كلوميبرامين (أنافرانيل) ، ديسيبيرامين (نوربرامين) ، دوكسيبين (سيلينور ، زونالون) ، إيمبيرامين (سورمونتييل ، توفرانيل) ، نورترينيتيلين (باميلور) ، بروترينيتيلين (بروترينيتيلين) تريميميرامين (سورمونتييل). قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع تابنتادول ، لذا تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها ، حتى تلك التي لا تظهر في هذه القائمة. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك عن المنتجات العشبية التي تتناولها ، وخاصة نبتة سانت جون والتريبتوفان.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من أي من الحالات المذكورة في قسم تحذير هام أو العلوص الشللي (حالة لا يتحرك فيها الطعام المهضوم عبر الأمعاء). قد يخبرك طبيبك بعدم تناول تابنتادول.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من انسداد في معدتك أو أمعائك ، أي حالة تسبب صعوبة في التبول ؛ أو البنكرياس أو المرارة أو الكلى أو الغدة الدرقية أو أمراض الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة.
- يجب أن تعلم أن هذا الدواء قد يقلل من الخصوبة عند الرجال والنساء. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول تابنتادول.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول تابنتادول.
- يجب أن تعلم أن تابنتادول قد يجعلك نعسان. لا تقود السيارة أو تشغل الآلات أو تشارك في أي أنشطة أخرى قد تكون خطيرة حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.
- يجب أن تعلم أن تابنتادول قد يسبب الدوخة والدوار والإغماء عندما تستيقظ بسرعة كبيرة من وضعية الكذب. لتجنب هذه المشكلة ، انهض من السرير ببطء مع إراحة قدميك على الأرض لبضع دقائق قبل الوقوف.
- يجب أن تعلم أن تابنتادول قد يسبب الإمساك. تحدث إلى طبيبك حول تغيير نظامك الغذائي أو استخدام أدوية أخرى لمنع أو علاج الإمساك أثناء تناول تابنتادول.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

إذا كنت تتناول أقراص تابنتادول ، فمن المحتمل أن يخبرك طبيبك بتناول الدواء حسب الحاجة. إذا أخبرك طبيبك بتناول الأقراص بانتظام ، فتناول الجرعة الفائتة حالما تتذكرها. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا كنت تتناول كبسولات تابنتادول ممتدة المفعول ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Tapentadol آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- صداع الراس
- حرقة من المعدة
- آلام في المعدة
- فم جاف
- التعب المفرط
- القلق
- النعاس
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً
- أحلام غير طبيعية
- التهيج
- شعور مفاجئ بالدفع

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسم الاحتياطات الخاصة أو التحذيرات المهمة ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- النوبات
- هياج ، هلوسة (رؤية أشياء أو سماع أصوات غير موجودة) ، حمى ، تعرق ، ارتباك ، ضربات قلب سريعة ، ارتعاش ، تصلب عضلي شديد أو ارتعاش ، فقدان التنسيق ، غثيان ، قيء ، أو إسهال
- الغثيان والقيء وفقدان الشهية والضعف أو الدوخة
- عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه
- الحيض غير المنتظم
- انخفاض الرغبة الجنسية

- متسرع
- متلهف، متشوق
- قشعريرة
- تورم في العينين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق
- بحّة في الصوت
- صعوبة في التنفس أو البلع
- ألم صدر
- الشعور بالدوار عند تغيير المواقف
- شعور بالاعياء
- فقدان الوعي
- الشعور بالحرارة الزائدة
- التعرق الشديد

قد يسبب Tapentadol آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). يجب عليك التخلص فوراً من أي دواء قديم أو لم تعد هناك حاجة إليه من خلال برنامج استرجاع الدواء. إذا لم يكن لديك برنامج استرجاع قريب أو برنامج يمكنك الوصول إليه على الفور ، فقم بتنظيف أي دواء قديم أو لم تعد هناك حاجة إليه في المرحاض. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك حول التخلص المناسب من أدويةك.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

أثناء تناول تابنتادول ، يجب أن تتحدث مع طبيبك حول الحصول على دواء إنقاذ يسمى نالوكسون (على سبيل المثال ، المنزل ، المكتب). يستخدم النالوكسون لعكس الآثار المهددة للحياة لجرعة زائدة. وهو يعمل عن طريق منع آثار المواد الأفيونية لتخفيف الأعراض الخطيرة الناجمة عن ارتفاع مستويات المواد الأفيونية في الدم. قد يصف لك طبيبك أيضاً نالوكسون إذا كنت تعيش في منزل يوجد به أطفال صغار أو شخص أساء استخدام أدوية الشوارع أو الأدوية الموصوفة. يجب أن تتأكد من أنك وأفراد عائلتك أو مقدمي الرعاية أو الأشخاص الذين يقضون وقتاً معك يعرفون كيفية التعرف على الجرعة الزائدة ، وكيفية استخدام النالوكسون ، وماذا تفعل حتى وصول المساعدة الطبية الطارئة. سيوضح لك طبيبك أو الصيدلي ولأفراد أسرتك كيفية استخدام الدواء. اسأل الصيدلي عن التعليمات أو قم بزيارة موقع الشركة المصنعة للحصول على التعليمات. في حالة ظهور أعراض جرعة زائدة ، يجب على صديق أو أحد أفراد الأسرة إعطاء الجرعة الأولى من النالوكسون ، والاتصال برقم 911 على الفور ، والبقاء معك ومراقبتك عن كثب حتى وصول المساعدة الطبية الطارئة. قد تعود الأعراض الخاصة بك في غضون بضع دقائق بعد تلقيك النالوكسون. إذا عادت الأعراض ، يجب أن يعطيك الشخص جرعة أخرى من النالوكسون. يمكن إعطاء جرعات إضافية كل 2 إلى 3 دقائق ، إذا عادت الأعراض قبل وصول المساعدة الطبية. قد تعود الأعراض الخاصة بك في غضون بضع دقائق بعد تلقيك النالوكسون. إذا عادت الأعراض ، يجب أن يعطيك الشخص جرعة أخرى من النالوكسون. يمكن إعطاء جرعات إضافية كل 2 إلى 3 دقائق ، إذا عادت الأعراض قبل وصول المساعدة الطبية. قد تعود الأعراض الخاصة بك في غضون بضع دقائق بعد تلقيك النالوكسون. إذا عادت الأعراض ، يجب أن يعطيك الشخص جرعة أخرى من النالوكسون. يمكن إعطاء جرعات إضافية كل 2 إلى 3 دقائق ، إذا عادت الأعراض قبل وصول المساعدة الطبية.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- تضيق أو اتساع حدقة العين (الهالات السوداء في العين)
- النعاس
- غير قادر على الاستجابة أو الاستيقاظ
- ضعف العضلات
- جلد بارد ورطب
- التنفس البطيء أو الضحل
- صعوبة في التنفس
- تباطؤ ضربات القلب

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك لتابنتادول.

قبل إجراء أي اختبار معمل (خاصة تلك التي تحتوي على الميثيلين الأزرق) ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تتناول تابنتادول.

هذه الوصفة غير قابلة لإعادة التعبئة. إذا استمر الألم بعد الانتهاء من الدواء ، فاتصل بطبيبك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

• نوسينتأ®

• نوسينتأ®ER

آخرمراجعة - 10/04/2020

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022