



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613040.html>

טרמטיניב

מבוטא כ- (tra me' ti nib)

היי האם נרשמה תרופה זו?

שהתפשט לרקמות סמוכות או לחלקים אחרים בגוף. הוא משמש בשילוב עם דבראפניב לטיפול בסוג מסוים של סרטן בלוטת התריס שהתפשט לרקמות סמוכות או לחלקים אחרים בגוף, אשר לא ניתן לטפל בהם באמצעות טיפולים אחרים. טרמטיניב הוא בקבוצת תרופות הנקראות מעכבי קינאז. זה פועל על ידי חסימת פעולתו של חלבון לא תקין שמאותת לתאים סרטניים להתרבות. זה עוזר לעצור את התפשטות התאים הסרטניים (NSCLC) לטיפול בסוג מסוים של סרטן ריאות לא קטן תאים Dabrafenib משמש גם בשילוב עם Trametinib. לטיפול בסוגים מסוימים של מלנומה (סוג של סרטן עור) שלא ניתן לטפל בניתוח או שהתפשט לחלקים אחרים בגוף. הוא משמש בשילוב עם דבראפניב לטיפול ולמניעת החזרה של סוג מסוים של מלנומה לאחר ניתוח להסרתה וכל בלוטות לימפה שנפגעו (Tafinlar) Dabrafenib משמש לבד או בשילוב עם Trametinib

=

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

טרמטיניב מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל פעם ביום על בטן ריקה, לפחות שעה אחת לפני או שעתיים אחרי הארוחה. קח טרמטיניב בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח טרמטיניב בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך. אל תפסיק ליטול טרמטיניב מבלי לדבר עם הרופא שלך.

הרופא שלך עשוי להתאים את המינון של טרמטיניב בהתאם לתגובתך לטיפול ולתופעות הלוואי שאתה חווה. שוחח עם הרופא שלך על איך אתה מרגיש במהלך הטיפול.

בקש מהרוקח או מהרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת טרמטיניב,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לטרמטיניב, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בטבליות טרמטיניב. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת ריאות או בעיות נשימה; סוכרת; בעיות דימום או קרישי דם; קוליטיס (דלקת של המעי הגס); בעיות קיבה; לחץ דם גבוה; מחלת לב, עיניים, כבד או כליות; או כל מצב רפואי אחר.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון. אסור להיכנס להריון בזמן שאת נוטלת טרמטיניב. עליך להשתמש באמצעי מניעה כדי למנוע הריון במהלך הטיפול בטרמטיניב ובמשך 4 חודשים לאחר המנה הסופית. שוחח עם הרופא שלך על שיטות למניעת הריון שיעבדו עבורך. אם נכנסת להריון בזמן נטילת טרמטיניב, התקשר לרופא שלך. טרמטיניב עלול להזיק לעובר.
- ספר לרופא שלך אם את מניקה או מתכננת להניק. אסור להניק בזמן נטילת טרמטיניב ובמשך 4 חודשים לאחר המנה הסופית.
- אתה צריך לדעת שתרופה זו עלולה להפחית את הפוריות אצל נשים. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים של נטילת טרמטיניב.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם חלפו פחות מ-12 שעות עד המנה המתוכננת הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

טרמטיניב עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- עור יבש
- פצעים בפה ובלשון
- פה יבש
- הקאה
- אובדן תיאבון
- שינוי ביכולת לטעום מזון
- עייפות

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, הפסק ליטול טרמטיניב והתקשר מיד לרופא שלך:

- דימום או חבורות חריגות
- צואה מדממת או שחורה וזפתית

- להשתעל או להקיא דם או חומר שנראה כמו שאריות קפה
 - דימום מהאף
 - שלשול חמור
 - כאב בטן
 - בחילה
 - חום
 - צמרמורת
 - דופק מהיר, לא סדיר או דופק
 - קשיי נשימה
 - כאב בחזה
 - נפיחות של הפנים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים
 - סחרחורת, סחרחורת או חולשה
 - קוצר נשימה
 - כאבי רגליים, נפיחות, רגישות, אדמומיות או חום
 - כאב ראש חזק
 - להשתעל
 - ראייה מטושטשת
 - שינוי בראייה, כולל ראיית הילות (קו מתאר מטושטש סביב חפצים) או נקודות צבעוניות
 - אובדן ראייה
 - כאב עין
 - עיניים יבשות, אדומות או נפוחות
 - פריחה, עור אדום או פצעונים
 - יבלת
 - בליטה אדמדמה שמדממת או לא מתרפאת
 - שינוי בגודל או צבע של שומה
 - עקצוץ
 - שלפוחיות, כיבים או פצעים על העור או הציפורניים
 - עקצוץ, צריבה, אדמומיות, נפיחות, קילוף או התקלפות, שלפוחיות או פצעים בכפות הידיים או בכפות הרגליים
 - הטלת שתן תכופה
 - צמא מוגבר
- טרמטיניב עשוי להגביר את הסיכון שתפתח סרטן עור חדש או סרטן אחר. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים של נטילת תרופה זו.

טרמטיניב עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון 1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מלחות ואור, והרחק מהישג ידם של ילדים. אין להניח את הטבליות במיכלים אחרים, כגון קופסאות גולולות יומיות או שבועיות. אחסן אותו במקרר, אך לא להקפיא אותו. אל תסיר את חומר המייבש (חבילה קטנה המצורפת לתרופה לספיגת לחות) מהבקבוק שלך.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גולולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- בעיות ראייה

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות לפני ובמהלך הטיפול שלך כדי לראות אם זה בטוח עבורך לקבל טרמטיניב ולבדוק את תגובת הגוף שלך לטרמטיניב. הרופא שלך גם יבדוק את העור שלך עבור שינויים כלשהם לפני שתתחיל בטיפול, כל חודשיים במהלך הטיפול, ועד 6 חודשים לאחר הטיפול. הרופא שלך גם יבדוק את לחץ הדם שלך מעת לעת לפי הצורך.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

• מקיניסט®

מתוקן לאחרונה - 15/06/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022