



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medsafe

消費者医療情報

YERVOY®

(ユレボイ)

イピリムマブ (*ipi-lim-u-mab*)これには何がありますか
リーフレット

このリーフレットは、YERVOYに関するいくつかの一般的な質問に答えます。利用可能なすべての情報が含まれているわけではありません。それはあなたの医者や薬剤師と話す代わりにはなりません。

すべての薬にはリスクと利点があります。あなたの医師は、あなたがYERVOYを受け取るリスクと、それがあなたにもたらすと期待する利益とを比較検討しました。

この薬の服用について懸念がある場合は、医師に相談してください。

このリーフレットを注意深く読み、後で参照できるように安全な場所に保管してください。

YERVOYとは

のために使用される

YERVOYには、免疫系が癌細胞を攻撃して破壊するのを助けるタンパク質である有効成分イピリムマブが含まれています。

YERVOYによる治療

YERVOYは、成人の皮膚がん（切除不能または進行性黒色腫）の治療に単一の治療法として使用されます。

ニボルマブと組み合わせた
YERVOYによる治療

YERVOYとニボルマブの併用療法は、進行性皮膚がん（切除不能または切除不能）の治療に使用されます（転移性黒色腫）、一種の

進行性腎がん（腎細胞がん）および悪性胸膜中皮腫（肺の内層に影響を与えるがんの一種）。

ニボルマブと化学療法を併用したYERVOYによる治療

YERVOYとニボルマブおよび化学療法の併用は、成人の進行性肺がんの治療に使用されます。

この薬は医師の処方箋がなければ入手できません。

YERVOYは、経験豊富な医師の監督の下、病院であなたに与えられます。

YERVOYが処方された理由について質問がある場合は、医師に相談してください。

あなたがいる前に
与えられたヤーボイ

YERVOYを与えられるべきではありません

- イピリムマブまたはYERVOYの他の成分のいずれかにアレルギー（過敏）がある場合。よくわからない場合は、医師に相談してください。

YERVOYを投与する前に、医師または看護師に確認してください

- コルチコステロイドまたは免疫抑制療法を受けている場合。これらはあなたの機能を低下させる薬です

免疫系、そしてあなたが感染症やいくつかの癌を発症する可能性が高くなる可能性があります

- 自己免疫疾患（体が自身の細胞を攻撃する状態）がある場合。
- B型肝炎（HBV）またはC型肝炎（HCV）を含む、肝臓の慢性ウイルス感染症を患っている、または患ったことがある場合
- ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症または後天性免疫不全症候群（AIDS）を患っている場合
- 抗凝固療法を受けている場合。これらは薬です胃や腸の出血のリスクを高める
- 以前に癌治療で重度の皮膚反応を経験したことがある場合
- 肺の炎症の病歴がある場合。

YERVOYは以下を引き起こす可能性があります：

- 心拍数や心拍数の変化、不整脈などの心臓の問題。
- 出血や腸の穿孔に悪化する可能性のある腸、腸、胃の炎症。兆候と症状には、下痢（水様性、緩い、または柔らかい便）、排便回数の増加（1日あたり2回以上の増加）、便秘、便の血、または濃い色の便、胃の部分の痛みや圧痛。
- 呼吸困難や咳などの肺の問題。

これらは、肺の炎症（肺炎または間質性肺疾患）の兆候である可能性があります。

- 肝障害または肝炎。兆候と症状には以下が含まれる場合があります
皮膚や白目（黄疸）の黄変、腹部の痛み、過度の眠気

- 皮膚の発疹またはかゆみ。重度の皮膚反応の兆候と症状には、かゆみを伴うまたは伴わない皮膚の発疹、皮膚の剥離、乾燥肌、発熱、疲労、顔やリンパ腺の腫れ、好酸球（白血球の種類）の増加、肝臓、腎臓、肺への影響。重度の皮膚反応には、中毒性表皮壊死症（TEN）、スティーブンス・ジョンソン症候群（SJS）、および薬物反応が含まれます。

好酸球増加症および全身症状（DRESS）。

- 神経の炎症。症状には、筋力低下または筋力低下、手や足のしびれやうずき、喪失などがあります。

意識または目覚めの難しさ。

- 炎症や腎臓の問題。兆候と症状には、異常な腎機能検査、または低下が含まれる場合があります

尿量

- ホルモン産生腺の損傷または炎症。症状には次のものが含まれます
頭痛、ぼやけたまたは複視、倦怠感、性欲の低下、行動の変化
- 糖尿病。症状には、過度の喉の渇き、大幅に増加した尿量の通過、体重減少による食欲増進、疲労感、眠気、衰弱、落ち込み、イライラ、一般的に体調不良などがあります）または糖尿病性ケトアシドーシス（糖尿病から生じる血液中の酸）。

- 筋肉の炎症。兆候や症状には、筋肉痛、こわばり、脱力感、胸痛、重度の倦怠感などがあります。これには心筋炎が含まれる場合があります
(心臓の筋肉の炎症)、筋炎(筋肉の炎症) および

横紋筋融解症（筋肉と関節のこわばり、筋肉のけいれん）。

- 目の炎症。症状には、目の赤み、目の痛み、視力の変化、視力のぼやけなどがあります。

• 固形臓器移植

ドナー細胞（同種異系）を使用する幹細胞移植の合併症が発生する可能性があります。これらの合併症は重篤であり、死に至る可能性があります。あなたが同種異系の幹細胞を持っている場合、あなたの医療提供者は合併症の兆候についてあなたを監視します
移植。

他の薬を使う

処方箋なしで入手した薬を含め、他の薬を服用している、または最近服用したことがあるかどうかを医師に伝えてください。治療中に薬を服用する前に、医師にアドバイスを求めてください。

子供

詳細情報が利用可能になるまで、子供または青年（18歳未満）でこの薬を使用することはお勧めしません。

YERVOYには特に注意してください

YERVOYは免疫系に影響を及ぼし、体の一部に炎症を引き起こす可能性のある薬です。炎症はあなたの体に深刻な損傷を引き起こす可能性があり、いくつかの炎症状態は不可逆的または生命を脅かす可能性があります。一部の炎症状態では、ヤーボイの治療または中止が必要になる場合があります。あなたの医者に言いなさい

炎症の症状がある場合はすぐに。このリーフレットの「起こりうる副作用」に記載されています。

妊娠と乳房- 給餌

妊娠しているのか、妊娠を計画しているのか、授乳中のかを医師に伝えてください。

妊娠中の方は、医師の勧めがない限り、YERVOYを使用しないでください。

妊娠中の女性におけるYERVOYの効果は不明ですが、有効成分であるイピリムマブが胎児に害を及ぼす可能性があります。

- 妊娠する可能性のある女性の場合は、YERVOYの治療中に効果的な避妊を行う必要があります。

- YERVOYの使用中に妊娠した場合は、医師に相談してください。

治療を受けている場合は、授乳をやめる必要があります

YERVOY。

イピリムマブが母乳に含まれるかどうかは不明です。授乳中の乳児へのリスクを排除することはできません。

機械の運転と使用

影響を受けていないことが確実でない限り、ヤーボイを投与された後は、機械を運転したり使用したりしないでください。

疲労感や衰弱は、ヤーボイの非常に一般的な副作用です。これは、機械を運転または操作する能力に影響を与える可能性があります。したがって、患者はヤーボイを投与された後は注意が必要です。

YERVOYの成分のいくつかに関する重要な情報

YERVOYを投与する前に、減塩（減塩）食を摂っている場合は医師に相談してください。この薬には、濃縮物1mLあたり2.3mgのナトリウムが含まれています。

YERVOYはどのように 与えられた

YERVOYは、病院またはクリニックで
経験豊富な医師の監督。

それは静脈への注入（点滴）としてあなたに与えられます（静脈内）。

あなたの医者はあなたが必要とする治療の数を決定します。

投与量と投与頻度

YERVOYの推奨用量と頻度は、治療に使用されているがんの種類によって異なります。

一部の種類のがんは、ヤーボイとの併用で治療されます
ニボルマブまたはニボルマブと化学療法。

あなたの医者はあなたがどの治療を受けるかをあなたにアドバイスし、これらの治療の用量と頻度についてあなたに話します。

この薬の使用法を理解するために、ニボルマブの消費者向け医薬品情報リーフレットを参照してください。この薬について質問がある場合は、医師に相談してください。

YERVOYの服用を逃した 場合

あなたが受け取るためにすべての予定を保持することは非常に重要です
YERVOY。約束を逃した場合は、次の服用をいつスケジュールするか医師に相談してください。

YERVOYの使用をやめた場合

治療を中止すると、薬の効果が止まる場合があります。医師と話し合っていない限り、ヤーボイによる治療を中止しないでください。

この薬の治療や使用についてさらに質問がある場合は、医師に相談してください。

あなたがいる間 治療されています YERVOYで

あなたがしなければならないこと

の兆候や症状がある場合は、すぐに医師に相談してください。起こりうる副作用または悪化した場合。

自分で他の薬で症状を治療しようとしないでください。

あなたの医者はかみしません

- 合併症を防ぐために他の薬を与えて
症状を軽減する
- YERVOYの次の投与を差し控える
- または、ヤーボイによる治療を完全に中止してください。

これらの兆候や症状は時々遅れ、最後の服用から数週間または数ヶ月後に発症する可能性があることに注意してください。前治療、あなたの医者はあなたの一般的な健康状態をチェックします。また、治療中に血液検査が行われます。

あなたを治療している他の医師、歯科医、薬剤師に、あなたがヤーボイを与えられていることを伝えてください。

新しい薬を使い始めようとしている場合は、医師、歯科医、または薬剤師にYERVOYが投与されていることを伝えてください。

アレルギー反応の症状が出た場合は、すぐに医師に相談してください。

これらの症状は次のとおりです。

- 息切れ、喘鳴または呼吸困難
- 顔、唇、舌、または体の他の部分の腫れ
- 皮膚の発疹、かゆみ、じんましん

可能性のある側面 効果

すべての薬と同様に、YERVOYは副作用を引き起こす可能性があります。そうではありません

誰もがそれらを取得します。あなたの医者はあなたとこれらについて話し合い、あなたの治療のリスクと利点を説明します。

YERVOYを単独で使用した場合の臨床試験では、以下の副作用が報告されています。

非常に一般的な副作用（10人に1人以上のユーザーに影響します）

- 食欲減少
- 下痢
- 気分が悪い（吐き気）または気分が悪い（嘔吐）
- 胃痛
- かゆみ、皮膚の発疹
- 疲れや衰弱を感じる
- 咳
- 頭痛
- 熱
- 不眠症

これらの副作用のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に相談してください。他の薬で症状を治療しようとしないでください。

一般的な副作用（100人中1～10人のユーザーに影響します）

- 血液の深刻な細菌感染（敗血症）
- 腫瘍の痛み
- 下垂体の機能低下（下垂体機能低下症）、副腎、または甲状腺機能低下症（甲状腺機能低下症）で、倦怠感や体重増加を引き起こす可能性があります
- 急速な心拍数を引き起こす可能性のある甲状腺の過活動機能（甲状腺機能亢進症）、発汗と体重減少
- 脱水
- 痛みや赤み、かすみ目を引き起こす目の炎症
- 低血圧、顔と首の一時的な赤み
- 息切れ、胃や腸の出血（腸）、結腸の炎症（大腸）、便秘

- 減量
 - 肝臓の異常な機能
 - 皮膚の炎症と発赤、皮膚の色の変化
パッチ（白斑）、脱毛または薄毛、
 - 寝汗
 - 筋肉や関節の痛み
 - 腎機能障害
 - 発熱、震え、エネルギー不足、
 - 腫れ、痛み、注射部位の反応、
 - 錯乱
 - アルカリホスファターゼ（肝臓から放出される酵素）の増加
 - インフルエンザ様疾患
- まれな副作用（1,000人中1～10人のユーザーに影響）**
- 血液の深刻な細菌感染（敗血症、敗血症性ショック）
 - 尿路感染症、腎臓病、腎臓機能障害
 - 胃や腸の炎症
 - うつ病、性欲の低下、
 - 皮膚の血管の炎症、じんましん（かゆみ、でこぼこした発疹）、腕、脚、顔の痛みを伴う皮膚病変
 - 筋肉のけいれん、痛みを伴う関節、筋肉の炎症
 - 月経の変化または欠如
 - 目の痛み、視力低下、目の出血、目の異物感、
目の筋肉の炎症、目の腫れ
 - 不整脈または異常な心拍
 - 呼吸困難、肺の炎症、肺の水分、花粉症
 - 血管の病気、低血圧、発汗と急速な心拍を伴う激しい熱感、心筋の衰弱、心臓の周りの体液
- 神経の損傷（痛み、脱力感、けいれんを引き起こす）、めまい、短時間の不随意筋収縮、震え、脳内の水分の過剰な蓄積、頭の神経の病気、話すことの困難、調整の困難
 - 動き（運動失調）
 - 腸穿孔、胃壁膜の炎症、
十二指腸、腸または膵臓の炎症、胸焼け
 - がん治療後に発生する代謝性合併症のグループ
 - 肝不全、肝臓の肥大、肝臓の炎症、甲状腺、腎臓、膵臓または中枢神経系、
体のさまざまな臓器の炎症細胞、特定の臓器の内面の内層の免疫関連効果、皮膚や目の黄変（黄疸）
 - 注入に関連する反応、多臓器不全
 - 赤血球の減少
 - 多臓器炎症
 - 難聴
 - 髪の色の変化
 - 粘膜の炎症
 - 注入関連の反応
- まれな副作用（10,000人中1～10人のユーザーに影響します）**
- 気道または上気道の感染症
 - 脳や脊髄の周りの感染症
 - アレルギー反応（ショック）
 - 視床下部の活動低下（脳の一部）によって引き起こされる副腎の機能低下
または過剰な下垂体（脳の基部にある小さな腺）、性ホルモンを産生する腺の欠陥
- 甲状腺に損傷を与えるあなた自身の体細胞のいくつかに対する抗体または腎臓または脳の炎症
 - メンタルヘルスの変化
 - 神経の炎症（四肢の痛み、脱力感、麻痺を引き起こす）、眠気またはエネルギー不足
 - 症状のトライアド（髄膜刺激症状）：項部硬直、明るい光の不耐性、頭痛
 - 目の炎症、目の腫れ、目の色の部分の炎症、目の腫れ
 - 心筋の炎症、心筋の病気、
不整脈
 - 四肢の血液供給の制限、炎症性
血管の破壊、血管（最も一般的には頭の動脈）の炎症性疾患、つま先や指のしびれや青白い血液循環の低下
 - 肺の水分によって引き起こされる呼吸障害
 - 腸の炎症性疾患（腹痛、吐血、嘔吐、体重減少などの下痢を引き起こす）
 - 皮膚の剥離
 - 筋肉の炎症、股関節の痛みやこわばりを引き起こし、
ショルダー
 - 聴覚障害
 - 過剰な免疫細胞によって引き起こされる血液障害。
- テスト結果の変化**
- YERVOYは、医師が実施した検査の結果に変化をもたらす可能性があります。これらには以下が含まれます：
- 赤血球（酸素を運ぶ）、白血球（感染と戦うのに重要）の数の変化または

- 血小板（血液の凝固を助ける細胞）
- 血中のホルモンと肝酵素レベルの異常な変化
- ナトリウム、リン酸塩またはカリウムの血中濃度が低い
- 尿中の血液またはタンパク質
- リウマチ因子のレベルの上昇
- 腎臓は血液から酸を正常に取り除くことができません
- 血液や他の体組織の異常に高いアルカリ性
- あなた自身の細胞のいくつかに対する血液中の抗体の存在

YERVOYとニボルマブの併用療法では、以下の副作用が報告されています。

非常に一般的（10人に1人以上に影響を与える可能性があります）

- 急速な心拍数を引き起こす可能性のある甲状腺機能亢進症、発汗と体重減少
- 倦怠感や体重増加を引き起こす可能性のある甲状腺機能低下症
- 食欲不振
- 頭痛
- 息切れ（呼吸困難）
- 腸の炎症（大腸炎）、下痢（水様性、緩い、または柔らかい便）、嘔吐、吐き気、腹痛
- 水ぶくれ、かゆみを伴う皮膚の発疹
- 関節、筋肉、骨の痛み
- 疲れや衰弱を感じる
- 熱

一般的（10人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 重篤な肺感染症（肺炎）、上気道の感染症
- 一部の白血球の増加
- 副腎によって生成されるホルモンの分泌の減少

（腎臓の上にある腺）；機能低下（甲状腺機能低下症）または脳の基部にある下垂体の炎症（下垂体炎）；甲状腺機能亢進症。心拍数の上昇、発汗、体重減少を引き起こす可能性があります。甲状腺の炎症（甲状腺機能亢進症）；甲状腺の腫れ

- 脱水
- 腕や脚のしびれ、脱力感、うずき、灼熱痛を引き起こす神経の炎症；めまい
- 痛みや赤み、かすみ目を引き起こす目の炎症。
- 速い心拍数
- 高血圧（高血圧）
- 咳と呼吸困難を特徴とする肺の炎症（肺炎）、血餅、咳
- 口内炎および口唇ヘルペス（口内炎）、脾臓の炎症（脾炎）、便秘、口渇。
- 肝臓の炎症
- パッチ（白斑）の皮膚の色の変化、乾燥肌、皮膚の赤み、異常な脱毛または蕁麻疹、かゆみを伴う発疹）
- 筋肉や骨の痛み
- 腎不全（腎機能の突然の喪失を含む）
- 浮腫（腫れ）、痛み
- アレルギー反応、薬の注入に関連する反応

珍しい（100人に1人まで影響する可能性があります）

- 脳の炎症
- 気管支炎
- さまざまな臓器や組織、最も一般的には肺での炎症細胞の蓄積に関連する慢性疾患

（サルコイドーシス）

- 糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシス）、糖尿病から生成される血中の酸
- 四肢の痛み、脱力感、麻痺を引き起こす神経の一時的な炎症（ギランバレー症候群）；
- しびれや脱力感を引き起こす神経の損傷（多発性神経障害）；神経の炎症；下垂足（腓骨神経麻痺）；体によって引き起こされる神経の炎症
- 自分自身を攻撃し、しびれ、脱力感、うずき、または灼熱痛を引き起こす（自己免疫性ニューロパシー）
- 心拍のリズムや心拍数の変化、不整脈

- 肺の周りの水分
- 腸穿孔、胃の炎症（胃炎）、十二指腸の炎症（十二指腸炎）
- 多くの場合銀色の鱗屑を伴う、赤い皮膚の肥厚したパッチを伴う皮膚疾患（乾癬）
- 関節の慢性疾患（脊椎関節症）
- 涙や唾液など、体に水分を与える腺を免疫系が攻撃する病気（シェーグレン症候群）
- 関節の炎症（関節炎）
- 痛みやこわばりを引き起こす筋肉の炎症（筋炎）
- 腎臓の炎症（腎炎）
- 胸痛
- 息切れ、倦怠感、動悸、胸痛を特徴とする心臓の炎症（心筋炎）。
- 筋肉痛、倦怠感、吐き気または嘔吐を特徴とする筋肉の破壊/損傷（横紋筋融解症）。

まれ（1000人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 皮膚の重度で致命的な剥離（中毒性表皮壊死症）
壊死症、スティーブンス・ジョンソン症候群）

テスト結果の変化

- ニボルマブとヤーボイの併用は、医師が実施した検査結果に変化をもたらす可能性があります。これらには以下が含まれます：
- 異常な肝機能検査
- 異常な腎臓機能検査
- 赤血球（酸素を運ぶ）、白血球（感染と戦うのに重要）、または血小板（血液の凝固を助ける細胞）の数の減少
- 脂肪を分解する酵素とでんぷんを分解する酵素のレベルの上昇。
- 血液中のカルシウム、カリウム、マグネシウム、またはナトリウムの異常なレベル
- ビリルビンの血中濃度が高い
- 体重の減少
- 血中の糖度が高い（高血糖）または低い（低血糖）

YERVOYをニボルマブと化学療法と組み合わせて投与した場合の臨床試験では、以下の副作用が報告されています。

非常に一般的（10人に1人以上に影響を与える可能性があります）

- 倦怠感や体重増加を引き起こす可能性のある甲状腺機能低下症
- 食欲不振
- 下痢（水様性、緩いまたは柔らかい便）、嘔吐、吐き気
- 水ぶくれ、かゆみを伴う皮膚の発疹
- 疲れや衰弱を感じる

一般的（10人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 結膜炎

- 重篤な肺感染症（肺炎）、上気道の感染症

- 一部の白血球の増加

- アレルギー反応、薬の注入に関連する反応

- 副腎によって生成されるホルモンの分泌の減少（腎臓の上にある腺）、

- 炎症（下垂体炎）脳の基部に位置する下垂体、甲状腺の過活動、これは急速な心拍数、発汗、体重減少を引き起こす可能性があります、甲状腺の腫れ

- 腕や脚のしびれ、脱力感、うずき、灼熱痛を引き起こす神経の炎症; めまい

- ドライアイ

- 頭痛

- 息切れ（呼吸困難）

- 咳と呼吸困難を特徴とする肺の炎症（肺炎）、血餅、咳

- 腸の炎症（大腸炎）

- 口内炎および口唇ヘルペス（口内炎）、膵臓の炎症（膵炎）、便秘、口渇。

- 肝臓の炎症

- 乾燥肌、肌の赤み、異常な脱毛または薄毛

- 関節、筋肉、骨の痛み、関節の炎症

- 腎不全（腎機能の突然の喪失を含む）

- 熱

- 浮腫（腫れ）

珍しい（100人に1人まで影響する可能性があります）

- 活動低下機能（下垂体機能低下症）下垂体の基部に位置する

脳、副甲状腺ホルモンの減少

- しびれや脱力感を引き起こす神経の損傷（多発性神経障害）；体が自分自身を攻撃することによって引き起こされる神経の炎症、しびれ、脱力感、うずきまたは灼熱痛（自己免疫性ニューロパチー）、脳の炎症

- ぼやけた視界

- 心拍のリズムや心拍数の変化、不整脈

- 高血圧（高血圧）、低血圧（低血圧）

- 肺の周りの水分、気管支炎

- 多くの場合銀色の鱗屑を伴う、赤い皮膚の肥厚したパッチを伴う皮膚疾患（乾癬）

- 皮膚の重度でおそらく致命的な剥離（スティーブンス・ジョンソン症候群）

- 痛みやこわばりを引き起こす筋肉の炎症（筋炎）

- 腎臓の炎症（腎炎）

- 胸痛

テスト結果の変化

オブジーボとイピリムマブおよび化学療法の併用は、医師が実施した検査結果に変化をもたらす可能性があります。これらには以下が含まれます：

- 異常な肝機能検査

- 異常な腎臓機能検査

- 赤血球（酸素を運ぶ）、白血球（感染と戦うのに重要）、または血小板（血液の凝固を助ける細胞）の数の減少

- 脂肪を分解する酵素とでんぷんを分解する酵素のレベルの上昇。

血液中のカルシウム、カリウム、マグネシウム、またはナトリウムの異常なレベル

血中の糖分レベルが高い（高血糖症）

ビリルビンの血中濃度が高い

このリーフレットに記載されている副作用のいずれかが現れたり悪化したりした場合、またはこのリーフレットに記載されていない副作用に気付いた場合は、医師にご相談ください。

起こりうる副作用に驚かないでください。

あなたはそれらのどれも経験しないかもしれません。

あなたが持っているかもしれないどんな質問にでも答える

ようにあなたの医師に頼んでください。

後援

ブリistol-マイヤーズスクイブ（NZ）リミテッド88
ショートランドストリート
オークランド1010
ニュージーランド

準備日：

2022年1月

YERVOY®（イピリムマブ）は、ブリistolマイヤーズスクイブカンパニーの登録商標です。

さらに遠く 情報

YERVOYに含まれるもの

- 有効成分はイピリムマブです。

各バイアルには、50mgまたは200mgのイピリムマブが含まれています。

- 他の成分は、トロメタモール塩酸塩、塩化ナトリウム、マンニトール（E421）、ペンテト酸、ポリソルベート80、水酸化ナトリウム、

注射用塩酸と水。

YERVOYの外観とパックの内容

輸液用のYERVOY濃縮液は、透明からわずかに乳白色、無色から淡黄色の液体で、軽い（少数の）粒子が含まれている可能性があり、アルミニウムで密封されたゴム栓付きのガラスバイアルで供給されます。

10mLのバイアル1つまたは40mLのバイアル1つを含むパックで入手できます。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

YERVOYの保管方法

YERVOYをご自身で保管するように求められる可能性はほとんどありません。それはあなたに与えられた病院または診療所に保管されます。