Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medsafe

소비자 의약품 정보

여보이®

(유레보이)

이필리무맙(ipi-lim-u-mab)

이것은 무엇입니까 전단

이 전단지는 YERVOY에 대한 몇 가지 일반적인 질문에 대한 답변입니다. 여기에는 사용 가능한 모든 정보가 포함되어 있지 않습니다. 이것은 의사나 약사와 이야기하는 것을 대신하지 않습니다.

모든 의약품에는 위험과 이점이 있습니다. 귀하의 의사는 YERVOY가 귀하에게 제공할 것으로 기대하는 이점에 대해 귀하가 YERVOY를 받는 위험을 저울질했습니다.

이 약을 복용하는 것에 대해 우려 사항이 있으면 의사에게 문의하십시오.

이 전단지를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관해야 합니다.

여보이란? 사용

YERVOY에는 면역 체계가 암세포를 공격하고 파괴하는 데 도움이 되는 단백질인 활성 물질인 이필리무맙이 포함되어 있습니다.

YERVOY로 치료

YERVOY는 단일 요법으로 성인의 피부암(절제 불가능 또는 진행성 흑색종)을 치료하는 데 사용됩니다.

니볼루맙과 함께 YERVOY 치료

YERVOY는 nivolumab과 함께 진행성 피부암(절제 불가능 또는

전이성 흑색종),

진행성 신장암(신세포 암종) 및 악성 흉막 중피종(폐의 내막에 영향을 미치는 암 유형).

니볼루맙 및 화학요법과 함께 YERVOY를 사용한 치료

YERVOY는 nivolumab 및 화학 요법과 함께 성인의 진행성 폐암을 치료하는 데 사용됩니다.

이 약은 의사의 처방전이 있어야만 구할 수 있습니다.

YERVOY는 경험 많은 의사의 감독하에 병원에서 귀하에게 제공됩니다.

YERVOY가 귀하에게 처방된 이유에 대해 질문이 있는 경우 의사에게 문의하십시오.

당신이 있기 전에 주어진 여보이

당신은 YERVOY를 주어서는 안됩니다

- 이필리무맙 또는 YERVOY의 다른 성분에 알레르기(과민성)가 있는 경우. 확실하지 않은 경우 의사와 상담하십시오.

YERVOY를 투여받기 전에 의사나 간호사에게 확인하십시오.

- 코르티코스테로이드나 면역억제제를 복용하는 경우. 이들은 당신의 기능을 감소시키는 약입니다

면역 체계, 감염 및 일부 암 발병 가능성을 높일 수 있습니다.

- 자가면역 질환(신체가 자신의 세포를 공격하는 상태)이 있는 경우.
- B형 간염(HBV) 또는 C형 간염(HCV)을 포함한 간의 만성 바이러스 감염이 있거나 있었던 적이 있는 경우
- 인간 면역 결핍 바이러스(HIV) 감염 또는 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS)이 있는 경우

- 항응고제 치료를 받는 경우. 하는 의약품들입니다
위와 장의 출혈 위험 증가

- 이전에 암 치료를 받았을 때 심한 피부 반응을 경험한 적이 있는 경우
- 폐 염증의 병력이 있는 경우.

YERVOY는 다음을 유발할 수 있습니다.

- 심장 박동의 리듬이나 속도의 변화 또는 비정상적인 심장 리듬과 같은 심장 문제.

- 출혈이나 장 천공으로 악화될 수 있는 장, 장 및 위 염증. 징후와 증상에는 설사(물같은 변, 묽은 변 또는 부드러운 변), 배변 횟수 증가(하루에 2회 이상 증가),

변비, 대변의 혈액 또는 더 어두운 색의 대변, 위장 부위의 통증 또는 압통.

- 호흡 곤란이나 기침과 같은 폐 문제.

이것은 폐 염증의 징후일 수 있습니다(폐렴 또는 간질성 폐 질환).

- 간 손상 또는 간염. 징후 및 증상에는 다음이 포함될 수 있습니다.
  피부 또는 눈 흰자위의 황변(황달), 위장 통증, 과도한 졸음

- 피부 발진 또는 가려움증. 심한 피부 반응의 징후 및 증상에는 가려움증이 있거나 없는 피부 발진, 피부 벗겨짐, 피부 건조, 발열,

  피로, 얼굴 또는 림프선의 부종, 호산구(백혈구의 일종) 증가 및 간, 신장 또는 폐에 대한 영향. 심각한 피부 반응에는 독성 표피 괴사 용해(TEN), 스티븐스-존슨 증후군(SJS) 및 약물 반응이 포함될 수 있습니다.

  호산구 증가증 및 전신 증상(DRESS).
- 신경의 염증. 증상에는 근육 약화 또는 근력 감소, 손이나 발의 무감각 또는 따끔거림, 상실 등이 포함될 수 있습니다.

  의식 또는 깨어나기 어려움.

- 신장에 염증이나 문제가 있습니다. 징후와 증상에는 비정상적인 신장 기능 검사가 포함될 수 있습니다.

  소변의 양
- 호르몬 생성 땀샘의 손상 또는 염증. 증상에는 다음이 포함될 수 있습니다.
  두통, 흐릿하거나 복시, 피로, 성욕 감소, 행동 변화

- 당뇨병. 증상으로는 과도한 갈증, 소변량이 크게 증가함, 체중 감소로 인한 식욕 증가, 피로감, 졸음, 허약감, 우울감, 짜증, 일반적으로 몸이 좋지 않음) 또는 당뇨병성 케톤산증(당뇨병으로 인해 생성된 혈액 내 산)이 있습니다. .

- 근육의 염증. 징후와 증상에는 근육통, 뻣뻣함, 쇠약, 흉통 또는 심한 피로가 포함될 수 있습니다. 여기에는 심근염이 포함될 수 있습니다.

  (심장 근육의 염증), 근염(근육의 염증) 및

  횡문근 융해증(근육과 관절의 뻣뻣함, 근육 경련).
- 눈 염증. 증상에는 눈의 충혈, 눈의 통증, 시력 변화 또는 흐릿한 시력이 포함될 수 있습니다.

- 고형 장기 이식

기증자 세포(동종)를 사용하는 줄기 세포 이식의 합병증이 발생할 수 있습니다. 이러한 합병증은 심각할 수 있으며 사망에 이를 수 있습니다. 동종 줄기 세포가 있는 경우 의료 제공자가 합병증의 징후를 모니터링합니다.

이식.

다른 의약품 사용

처방전 없이 구입한 약을 포함하여 다른 약을 복용 중이거나 최근에 복용한 적이 있는 경우 의사에게 알리십시오. 치료 중 약을 복용하기 전에 의사에게 조언을 구하십시오.

어린이들

추가 정보가 제공될 때까지 어린이 또는 청소년(18세 미만)에게 이 약을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

YERVOY와 함께 특별한주의를 기울이십시오

YERVOY는 면역 체계에 영향을 미치고 신체 일부에 염증을 일으킬 수 있는 약입니다. 염증은 신체에 심각한 손상을 줄 수 있으며 일부 염증 상태는 되돌릴 수 없거나 생명을 위협할 수 있습니다. 일부 염증 상태는 치료 또는 YERVOY의 중단이 필요할 수 있습니다. 의사에게 알리십시오

염증 증상이 있는 경우 즉시 조치하십시오. 이 전단지의 "가능한 부작용"에 나열되어 있습니다.

임신과 유방-급송

임신 중이거나 임신을 계획 중이거나 모유 수유 중인 경우 의사에게 알리십시오.

의사가 특별히 권장하지 않는 한 임신 중인 경우 YERVOY를 사용하지 마십시오.

임산부에 대한 YERVOY의 영향은 알려져 있지 않지만 활성 물질인 이필리무맙이 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다.

- 임신할 수 있는 여성이라면 이 약을 투여받는 동안 효과적인 피임법을 사용해야 합니다.

- YERVOY를 사용하는 동안 임신한 경우 의사에게 알리십시오.

치료를 받고 있는 경우 모유 수유를 중단해야 합니다.
여보이.

이필리무맙이 모유에 들어가는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 모유수유아에 대한 위험을 배제할 수 없습니다.

운전 및 기계 사용

영향을 받지 않는다는 확신이 들지 않는 한 YERVOY를 투여한 후 운전하거나 기계를 사용하지 마십시오.

피곤하거나 허약한 느낌은 YERVOY의 매우 흔한 부작용입니다. 이것은 기계를 운전하거나 작동하는 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 환자는 이 약을 투여받은 후 주의해야 합니다.

YERVOY의 일부 성분에 대한 중요 정보

YERVOY를 투여하기 전에 저염(저염) 식이요법을 하고 있는지 의사에게 알리십시오. 이 약은 농축액 1mL당 2.3mg의 나트륨을 함유하고 있습니다.

여보이는 어떤가요 주어진

YERVOY는 아래의 병원이나 진료소에서 귀하에게 제공됩니다.
경험 많은 의사의 감독.

이것은 정맥(정맥 주사)에 주입(점적)으로 제공됩니다.

의사가 얼마나 많은 치료가 필요한지 결정할 것입니다.

투여량 및 빈도

YERVOY의 권장 복용량과 빈도는 치료에 사용되는 암의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

일부 유형의 암은 YERVOY와 조합하여 치료됩니다.
withnivolumab 또는 nivolumab 및 화학 요법.

의사는 어떤 치료를 받을지 조언하고 이러한 치료의 용량과 빈도에 대해 알려줄 것입니다.

이 약의 사용을 이해하려면 니볼루맙의 소비자 의약품 정보 전단지를 참조하십시오. 이 약에 대해 질문이 있으면 의사에게 문의하십시오.

YERVOY 복용량을 놓치면

모든 약속을 지키는 것이 매우 중요합니다.
여보이. 약속을 놓치면 의사에게 다음 복용 시간을 예약하십시오.

YERVOY 사용을 중단하는 경우

치료를 중단하면 약의 효과가 중단될 수 있습니다. 의사와 상의하지 않는 한 YERVOY 치료를 중단하지 마십시오.

귀하의 치료 또는 이 약의 사용에 대해 추가 질문이 있는 경우 의사에게 문의하십시오.

당신이있는 동안 치료받는 중 여보이와 함께

당신이해야 할 일

징후나 증상이 있는 경우 즉시 의사에게 알리십시오. 가능한 부작용 또는 악화되는 경우.

스스로 다른 약으로 증상을 치료하려고 하지 마십시오.

당신은 의사 수 있습니다

- 합병증을 예방하기 위해 다른 약을 제공하고
  증상을 줄이십시오
- YERVOY의 다음 복용량을 보류하십시오
- 또는 YERVOY 치료를 완전히 중단하십시오.

이러한 징후와 증상은 때때로 지연되며 마지막 투여 후 몇 주 또는 몇 달 후에 나타날 수 있습니다. 전에

치료를 받으면 의사가 전반적인 건강 상태를 확인할 것입니다. 치료 중 혈액 검사도 받게 됩니다.

귀하를 치료하는 다른 의사, 치과의사 및 약사에게 YERVOY를 투여받고 있음을 알리십시오.

새로운 약을 시작하려고 하는 경우 의사, 치과의사 또는 약사에게 YERVOY를 투여 중이라고 알리십시오.

알레르기 반응의 증상이 나타나면 즉시 의사에게 알리십시오.

이러한 증상은 다음과 같습니다.

- 호흡 곤란, 천명 또는 호흡 곤란
- 얼굴, 입술, 혀 또는 신체의 다른 부분의 붓기
- 피부에 발진, 가려움증 또는 두드러기

가능한 측면 효과

모든 의약품과 마찬가지로 YERVOY는 부작용을 일으킬 수 있지만 그렇지는 않습니다.
모두가 그것을 얻습니다. 의사는 이에 대해 귀하와 논의하고 치료의 위험과 이점을 설명할 것입니다.

YERVOY를 단독으로 사용했을 때 임상 시험에서 다음과 같은 부작용이 보고되었습니다.

매우 흔한 부작용(10명 중 1명 이상의 사용자에게 영향)

- 식욕 상실
- 설사
- 아프다(메스꺼움) 또는 아프다(구토)
- 복통
- 가려움증, 피부발진
- 피곤하거나 약한 느낌
- 기침
- 두통
- 열
- 불명증

이러한 부작용이 발생하면 즉시 의사에게 알리십시오. 다른 약으로 증상을 치료하려고 하지 마십시오.

일반적인 부작용(100명 중 1~10명의 사용자에게 영향을 미침)

- 혈액의 심각한 세균 감염(패혈증)
- 종양 통증
- 뇌하수체의 기능저하(뇌하수체기능저하증),
  부신, 또는 피로 또는 체중 증가를 유발할 수 있는 갑상선 기능 저하증(갑상선 기능 저하증)
- 빠른 심박수를 유발할 수 있는 갑상선 기능 항진증(갑상선 기능 항진증),
  땀과 체중 감소
- 탈수
- 통증과 발적, 흐린 시력을 유발하는 눈의 염증
- 저혈압, 얼굴과 목의 일시적 발적
- 숨가쁨, 위 또는 장 출혈(장), 결장염증(대장), 변비

- 체중 감량
- 간 기능 이상
- 피부의 염증 및 발적, 피부색 변화

  패치(백반증), 탈모 또는 가늘어짐,
- 밤에 과도한 발한
- 근육과 관절의 통증
- 신장 기능 장애
- 발열, 오한, 에너지 부족,
- 붓기, 통증, 주사 부위의 반응,
- 착란
- 알칼리성 인산분해효소(간에서 방출되는 효소)의 증가
- 인플루엔자와 같은 질병

흔하지 않은 부작용(1,000명 중 1-10명의 사용자에게 영향)

- 혈액의 심각한 세균 감염(패혈증, 패혈성 쇼크)
- 요로감염, 신장질환, 신부전
- 위와 장의 염증
- 우울증, 성욕 저하,
- 피부의 혈관 염증, 두드러기(가려움증, 울퉁불퉁한 발진), 팔, 다리 및 얼굴의 고통스러운 피부 병변
- 근육 경련, 관절 통증, 근육 염증
- 월경 주기의 변화 또는 부재
- 눈의 통증, 시력 감소, 눈의 출혈, 눈의 이물감,

  눈 근육의 염증, 부어오른 콧물
- 불규칙하거나 비정상적인 심장 박동
- 극심한 호흡곤란, 폐의 염증, 폐의 체액, 꽃가루 알레르기
- 혈관 질환, 저혈압, 발한과 빠른 심장 박동과 함께 격렬한 열감, 심장 근육의 약화, 심장 주위의 체액
- 신경 손상(통증, 쇠약 및 경련 유발), 현기증, 짧은 비자발적 근육 수축, 떨림, 뇌에 과도한 수분 축적, 머리의 신경 질환, 말하기 어려움, 협응 어려움

  운동(운동실조)
- 장 천공, 위벽막 염증,

  십이지장, 장 또는 췌장의 염증, 속쓰림
- 암 치료 후 발생하는 대사 합병증 그룹
- 간부전, 간 비대, 간 염증, 갑상선, 신장, 췌장 또는 중추 신경계, 결절

  신체의 다양한 기관에 있는 염증 세포, 특정 기관의 내부 표면 안감의 면역 관련 효과, 피부 또는 눈의 황변(황달)
- 주입과 관련된 반응, 다기관 부전
- 적혈구 감소
- 다기관 염증
- 청력 감소
- 머리 색깔의 변화
- 점막 염증
- 주입 관련 반응

드문 부작용(10,000명 중 1~10명의 사용자에게 영향)

- 기도 또는 상부 호흡기 감염
- 뇌 또는 척수 주변 감염
- 알레르기 반응(쇼크)
- 시상하부(뇌의 일부) 활동 저하로 인한 부신 기능 감소

  또는 과민성 뇌하수체(뇌 기저에 있는 작은 샘), 성 호르몬을 생성하는 샘의 결함
- 갑상선 손상을 일으키는 일부 신체 세포에 대한 항체 또는

  신장이나 뇌의 염증
- 정신 건강의 변화
- 신경 염증(사지에 통증, 쇠약 또는 마비 유발), 졸음 또는 에너지 부족
- 세 가지 증상(뇌수막염): 목의 경직, 밝은 빛의 불내성 및 두통
- 눈의 염증, 부어오른 콧물, 눈의 유색 부분의 염증, 눈의 붓기
- 심장 근육의 염증, 심장 근육의 질병,
  불규칙한 심장박동
- 사지의 혈액 공급 제한, 염증

  혈관 파괴, 혈관 염증성 질환(가장 일반적으로 두부 동맥), 혈액 순환 불량으로 발가락과 손가락이 마비되거나 창백해짐
- 폐의 체액으로 인한 호흡 부전
- 장의 염증성 질환(복통, 피가 섞일 수 있는 설사, 구토 또는 체중 감소 유발)
- 필링 피부
- 근육의 염증, 고관절의 통증이나 뻣뻣함을 유발하고
  어깨
- 청각 장애
- 과민성 면역 세포로 인한 혈액 장애.

테스트 결과의 변화

YERVOY는 의사가 수행한 검사 결과를 변경할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 적혈구(산소를 운반), 백혈구(감염 퇴치에 중요) 수의 변화 또는

혈소판(혈액 응고를 돕는 세포)

- 혈액 내 호르몬 및 간 효소 수치의 비정상적인 변화
- 나트륨, 인산염 또는 칼륨의 낮은 혈중 농도
- 소변의 혈액 또는 단백질
- 류마티스 인자 수치 증가
- 신장이 정상적으로 혈액에서 산을 제거할 수 없음
- 혈액 및 기타 신체 조직의 비정상적으로 높은 알칼리도
- 혈액 내 일부 세포에 대한 항체 존재

니볼루맙과 함께 YERVOY와 함께 다음과 같은 부작용이 보고되었습니다.

매우 흔함(10명 중 1명 이상에 영향을 미칠 수 있음)

- 빠른 심박수를 유발할 수 있는 과민성 갑상선,
땀과 체중 감소
- 피로나 체중 증가를 유발할 수 있는 갑상선 기능 저하증
- 식욕 감소
- 두통
- 숨가쁨(호흡곤란)
- 장의 염증(대장염), 설사(묽은 변, 묽은 변 또는 연한 변), 구토, 메스꺼움, 복통
- 때때로 물집이 있는 피부 발진, 가려움증
- 관절, 근육 및 뼈의 통증
- 피곤하거나 약한 느낌
- 열

흔함(10명 중 1명에게 영향을 미칠 수 있음)

- 심각한 폐 감염(폐렴), 상부 호흡기 감염
- 일부 백혈구 증가
- 부신에서 생성되는 호르몬 분비 감소
(신장 위에 위치한 땀샘); 기능 저하(뇌하수체기능저하증) 또는

뇌의 기저부에 위치한 뇌하수체의 염증(뇌하수체염); 빠른 심박수, 발한 및 체중 감소를 유발할 수 있는 과민성 갑상선; 갑상선 염증(갑상선 기능항진증); 갑상선의 부종

- 탈수
- 팔과 다리의 마비, 쇠약, 따끔거림 또는 타는 듯한 통증을 유발하는 신경 염증; 현기증
- 통증과 발적, 흐린 시력을 유발하는 눈의 염증
- 빠른 심박수
- 고혈압(고혈압)
- 기침 및 호흡 곤란, 혈전, 기침을 특징으로 하는 폐 염증(폐렴)
- 구강궤양 및 구순포진(구내염), 췌장염(췌장염),

변비, 구강건조
- 간의 염증
- 패치의 피부색 변화(백반증), 건조한 피부, 피부 발적, 비정상적인 탈모 또는
얇아짐, 두드러기(가려운 발진)
- 근육과 뼈의 통증
- 신부전(신기능의 급격한 상실 포함)
- 부종(부기), 통증
- 알레르기 반응, 약물 주입과 관련된 반응

흔하지 않음(100명 중 1명에게 영향을 미칠 수 있음)

- 뇌의 염증
- 기관지염
- 다양한 기관 및 조직, 가장 일반적으로 폐에 염증 세포 축적과 관련된 만성 질환

(사코이드증)
- 당뇨병(당뇨병 케톤산증), 당뇨병으로 인해 생성되는 혈액 내 산
- 사지의 통증, 쇠약 및 마비를 유발하는 신경의 일시적 염증(길랭-바레 증후군);

마비와 약점을 유발하는 신경 손상
(다발신경병증); 신경의 염증; 풋 드롭(비골 신경 마비); 신체로 인한 신경 염증

자신을 공격하여 마비, 쇠약, 따끔거림 또는 작열감 유발(자가면역 신경병증)
- 심장 박동의 리듬이나 속도의 변화, 비정상적인 심장 리듬
- 폐 주변의 체액
- 장천공, 위염(위염), 십이지장염(십이지장염)
- 종종 은빛 비늘이 있는 붉은 피부의 두꺼운 반점이 있는 피부 질환(건선)
- 관절의 만성 질환(척추관절병증)
- 면역 체계가 눈물, 타액과 같이 신체의 수분을 만드는 땀샘을 공격하는 질병(쇼그렌 증후군)
- 관절의 염증(관절염)
- 통증이나 경직을 유발하는 근육 염증(근염)
- 신장 염증(신염)
- 가슴 통증
- 숨가쁨, 피로, 두근거림 또는 흉통을 특징으로 하는 심장 염증(심근염).
- 근육통, 쇠약, 메스꺼움 또는 구토를 특징으로 하는 근육 쇠약/손상(횡문근 융해증).

희귀(1000명 중 1명까지 영향을 미칠 수 있음)

- 심각하고 치명적일 수 있는 피부 박리(독성 표피 괴사, 스티븐-존슨 증후군)

테스트 결과의 변화

- YERVOY와 함께 Nivolumab을 사용하면 의사가 수행한 검사 결과가 변경될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 비정상 간 기능 검사
- 비정상적인 신장 기능 검사
- 적혈구(산소를 운반), 백혈구(감염 퇴치에 중요) 또는 혈소판(혈액 응고를 돕는 세포)의 수 감소

- 지방을 분해하는 효소와 전분을 분해하는 효소 수치가 증가합니다.

- 혈액 내 칼슘, 칼륨, 마그네슘 또는 나트륨의 비정상적인 수치

- 높은 혈중 빌리루빈 수치
- 체중 감소
- 혈액 내 당 수치가 더 높거나(고혈당증) 더 낮거나(저혈당증)

YERVOY를 니볼루맙 및 화학요법과 함께 투여했을 때 임상 시험에서 다음과 같은 부작용이 보고되었습니다.

매우 흔함(10명 중 1명 이상에 영향을 미칠 수 있음)

- 피로나 체중 증가를 유발할 수 있는 갑상선 기능 저하증
- 식욕 감소
- 설사(물 같은, 묽은 변 또는 부드러운 변), 구토, 메스꺼움
- 때때로 물집이 있는 피부 발진, 가려움증
- 피곤하거나 약한 느낌

흔함(10명 중 1명에게 영향을 미칠 수 있음)

- 결막염
- 심각한 폐 감염(폐렴), 상부 호흡기 감염

- 일부 백혈구 증가

- 알레르기 반응, 약물 주입과 관련된 반응

- 부신에서 생성되는 호르몬 분비 감소
(신장 위에 위치한 땀샘), 염증
(hypophysitis) 뇌의 기저부에 위치한 뇌하수체, 빠른 심박수, 발한 및 체중 감소를 유발할 수 있는 과민성 갑상선,

  갑상선의 부종
- 팔과 다리의 마비, 쇠약, 따끔거림 또는 타는 듯한 통증을 유발하는 신경 염증; 현기증

- 건조한 눈
- 두통
- 숨가쁨(호흡곤란)
- 기침 및 호흡 곤란, 혈전, 기침을 특징으로 하는 폐 염증(폐렴)

- 장의 염증(대장염)

- 구강궤양 및 구순포진(구내염), 췌장염(췌장염),

  변비, 구강건조
- 간의 염증
- 건조한 피부, 피부 발적, 비정상적인 탈모 또는 가늘어짐
- 관절, 근육 및 뼈의 통증, 관절의 염증
- 신부전(신기능의 급격한 상실 포함)
- 열
- 부종(부기)

흔하지 않음(100명 중 1명에게 영향을 미칠 수 있음)

- 기능 저하
(hypopituitarism) 뇌하수체의 기저부에 위치한 뇌하수체
뇌, 부갑상선 호르몬 감소

- 마비와 약점을 유발하는 신경 손상
(다발신경병증); 몸이 스스로를 공격하여 신경에 염증이 생겨

  무감각, 쇠약, 따끔거림 또는 작열감(자가면역 신경병증), 뇌 염증

- 흐린 시야
- 심장 박동의 리듬이나 속도의 변화, 비정상적인 심장 리듬

- 고혈압(고혈압), 저혈압(저혈압)

- 폐 주변의 체액, 기관지염
- 종종 은빛 비늘이 있는 붉은 피부의 두꺼운 반점이 있는 피부 질환(건선)
- 심각하고 치명적일 수 있는 피부 박리(Steven-Johnson 증후군)
- 통증이나 경직을 유발하는 근육 염증(근염)

- 신장 염증(신염)

- 가슴 통증

테스트 결과의 변화

이필리무맙 및 화학요법과 OPDIVO를 병용하면 의사가 수행한 검사 결과가 변경될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 비정상 간 기능 검사
- 비정상적인 신장 기능 검사
- 적혈구(산소를 운반), 백혈구(감염 퇴치에 중요) 또는 혈소판(혈액 응고를 돕는 세포)의 수 감소

- 지방을 분해하는 효소와 전분을 분해하는 효소 수치가 증가합니다.

혈액 내 칼슘, 칼륨, 마그네슘 또는 나트륨의 비정상적인 수치

혈액 내 높은 수준의 당(고혈당증)

높은 혈중 빌리루빈 수치

이 책자에 나열된 부작용이 나타나거나 악화되거나 이 책자에 나열되지 않은 부작용이 발견되면 의사에게 알리십시오.

가능한 부작용에 놀라지 마십시오.

당신은 그들 중 하나를 경험하지 않을 수 있습니다.

궁금한 점이 있으면 의사에게 질문하십시오.

더 나아가 정보

YERVOY가 담고 있는 것

- 활성 물질은 이필리무맙 입니다.

  각 바이알에는 50mg 또는 200mg의 이필리무맙이 들어 있습니다.

- 다른 성분은 트로메타몰염산염, 염화나트륨, 만니톨(E421), 펜텐산, 폴리소르베이트 80, 수산화나트륨,

  염산과 주사용수.

YERVOY의 모습과 팩 내용물

주입용 용액용 YERVOY 농축액은 투명에서 약간 유백색의 무색에서 옅은 노란색 액체로 가벼운(약간의) 미립자를 포함할 수 있으며 알루미늄으로 밀봉된 고무 마개가 있는 유리 바이알에 제공됩니다.

10mL 바이알 1개 또는 40mL 바이알 1개가 들어 있는 팩으로 제공됩니다.

모든 팩 크기가 판매되는 것은 아닙니다.

여보이 보관 방법

YERVOY를 직접 보관하라는 요청을 받을 가능성은 거의 없습니다. 귀하에게 제공되는 병원이나 진료소에 보관됩니다.

후원

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88
Shortland Street
오클랜드 1010
뉴질랜드

준비 날짜:

2022년 1월

YERVOY®(ipilimumab)는 Bristol-Myers Squibb Company의 등록 상표입니다.