



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medsafe

Информация о потребительских препаратах

ЕРВОЙ®

(юре-вой)

Ипилимумаб (ипи-лим-у-маб)

ЧТО В ЭТОМ ЛИСТОЧКА

Эта брошюра отвечает на некоторые распространенные вопросы о компании «ЕРВОЙ». Он не содержит всей доступной информации. Это не заменит разговора с вашим врачом или фармацевтом.

Все лекарства имеют риски и преимущества. Ваш врач взвесил риски, связанные с тем, что вы принимаете ЕРВОЙ, и преимущества, которые, по их мнению, он будет иметь для вас.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу приема этого лекарства, спросите своего врача.

Вам следует внимательно прочитать эту брошюру и сохранить ее в безопасном месте, чтобы обращаться к ней позже.

ЧТО ТАКОЕ ЕРВОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

YERVOY содержит активное вещество ипилимумаб, белок, который помогает вашей иммунной системе атаковать и уничтожать раковые клетки.

Лечение препаратом ЕРВОЙ

ЕРВОЙ, в качестве монотерапии, применяется для лечения рака кожи (нерезектабельной или запущенной меланомы) у взрослых.

Лечение препаратом ЕРВОЙ в комбинации с ниволумабом

ЕРВОЙ в комбинации с ниволумабом применяется для лечения распространенного рака кожи (нерезектабельного или метастатическая меланома), тип

распространенный рак почки (почечно-клеточная карцинома) и злокачественная мезотелиома плевры (вид рака, поражающий слизистую оболочку легких).

Лечение препаратом ЕРВОЙ в сочетании с ниволумабом и химиотерапией

ЕРВОЙ в комбинации с ниволумабом и химиотерапией применяется для лечения распространенного рака легкого у взрослых.

Это лекарство доступно только по рецепту врача.

ЕРВОЙ вам дадут в больнице под наблюдением опытного врача.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, почему вам прописали ЕРВОЙ, обратитесь к своему врачу.

иммунной системы и может повысить вероятность развития инфекций и некоторых видов рака.

- если у вас аутоиммунное заболевание (состояние, при котором организм атакует собственные клетки).
- если у вас есть или когда-либо была хроническая вирусная инфекция печени, включая гепатит В (HBV) или гепатит С (HCV)
- если у вас есть инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
- если вы принимаете антикоагулянтную терапию. Это лекарства, которые увеличивают риск кровотечения в желудке и кишечнике
- если вы ранее испытывали серьезную кожную реакцию на предыдущую противораковую терапию
- если у вас есть история воспаления легких.

ЕРВОЙ может вызвать:

- Проблемы с сердцем, такие как изменения ритма или частоты сердечных сокращений или ненормальный сердечный ритм.
- Воспаление кишечника, кишечника и желудка, которое может перерасти в кровотечение или перфорацию кишечника. Признаки и симптомы могут включать диарею (водянистый, жидкий или мягкий стул), увеличение количества дефекаций (увеличение на два и более раза в день), запор, кровь в стуле или стул более темного цвета, боль или болезненность в области желудка.
- Проблемы с легкими, такие как затрудненное дыхание или кашель.

ДО ТОГО, КАК ТЫ ДАННЫЙ ЕРВОЙ

Вам не следует давать ЕРВОЙ

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на ипилимумаб или любой другой компонент ЕРВОЙ. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом.

Проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой, прежде чем принимать ЕРВОЙ.

- если вы принимаете кортикостероиды или иммуносупрессивную терапию. Это лекарства, которые снижают функционирование вашего

Это могут быть признаки воспаления легких (пневмонит или интерстициальное заболевание легких).

- Поражение печени или гепатит. Признаки и симптомы могут включать пожелтение кожи или белков глаз (желтуха), боль в области желудка, чрезмерная сонливость
- Кожная сыпь или зуд. Признаки и симптомы тяжелой кожной реакции могут включать кожную сыпь с зудом или без него, шелушение кожи, сухость кожи, лихорадку, утомляемость, отек лица или лимфатических узлов, увеличение эозинофилов (разновидность лейкоцитов) и воздействие на печень, почки или легкие. Тяжелые кожные реакции могут включать токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и лекарственную реакцию с Эозинофилия и системные симптомы (DRESS).
- Воспаление нервов. Симптомы могут включать мышечную слабость или снижение силы, онемение или покалывание в руках или ногах, потерю сознания или трудности с пробуждением.
- Воспаление или проблемы с почками. Признаки и симптомы могут включать аномальные тесты функции почек или снижение объема мочи
- Повреждение или воспаление желез, вырабатывающих гормоны. Симптомы могут включать головные боли, нечеткость или двоение в глазах, утомляемость, снижение полового влечения, поведенческие изменения
- Диабет. Симптомы включают чрезмерную жажду, выделение сильно увеличенного количества мочи, повышение аппетита с потерей веса, чувство усталости, сонливость, слабость, депрессию, раздражительность и общее недомогание) или диабетический кетоацидоз (кислота в крови, образующаяся при диабете).

- Воспаление мышц. Признаки и симптомы могут включать мышечную боль, скованность, слабость, боль в груди или сильную усталость. Это может включать миокардит (**воспаление сердечной мышцы**), МИОЗИТ (**воспаление мышц**) и рабдомиолиз (скованность мышц и суставов, мышечный спазм).
- Воспаление глаз. Симптомы могут включать покраснение глаз, боль в глазах, изменения зрения или нечеткость зрения.
- Трансплантация твердых органов
Могут возникнуть осложнения трансплантации стволовых клеток с использованием донорских клеток (аллогенных). Эти осложнения могут быть серьезными и могут привести к смерти. Если у вас есть аллогенные стволовые клетки, ваш лечащий врач будет наблюдать за вами на предмет признаков осложнений.
пересадка.

Использование других лекарств

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта. Попросите совета у врача, прежде чем принимать какие-либо лекарства во время лечения.

Дети

Не рекомендуется использовать это лекарство у детей или подростков (младше 18 лет), пока не появится дополнительная информация.

Будьте особенно осторожны с ЕРВОЙ

ЕРВОЙ - это лекарство, которое влияет на вашу иммунную систему и может вызвать воспаление в некоторых частях вашего тела. Воспаление может нанести серьезный ущерб вашему телу, а некоторые воспалительные состояния могут быть необратимыми или опасными для жизни. При некоторых воспалительных состояниях может потребоваться лечение или отмена препарата ЕРВОЙ. Расскажите своему врачу

немедленно, если у вас есть какие-либо симптомы воспаления, перечисленные в разделе «Возможные побочные эффекты» этой брошюры.

Беременность и грудное кормление

Сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью.

Вы не должны использовать ЕРВОЙ, если вы беременны, если только ваш врач не рекомендует это.

Воздействие ЕРВОЯ на беременных женщин неизвестно, но возможно, что действующее вещество ипилимумаб может нанести вред нерожденному ребенку.

- Вы должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения препаратом ЕРВОЙ, если вы женщина, которая может забеременеть.
- Если вы забеременели во время использования ЕРВОЙ, сообщите об этом своему врачу.

Вам следует прекратить грудное вскармливание, если вы лечитесь от ЕРВОЙ.

Неизвестно, проникает ли ипилимумаб в грудное молоко. Нельзя исключать риск для младенца, находящегося на грудном вскармливании.

Вождение и использование машин

Не садитесь за руль и не пользуйтесь механизмами после того, как вам дали ЕРВОЙ, если вы не уверены, что на вас это не влияет.

Чувство усталости или слабости является очень частым побочным эффектом ЕРВОЯ. Это может повлиять на вашу способность управлять автомобилем или работать с любым механизмом. Поэтому пациентам следует соблюдать осторожность после приема ЕРВОЯ.

Важная информация о некоторых ингредиентах ЕРВОЙ

Сообщите своему врачу, если вы находитесь на диете с низким содержанием натрия (с низким содержанием соли), прежде чем вам дадут ЕРВОЙ. Это лекарство содержит 2,3 мг натрия на мл концентрата.

КАК ЕРВОЙ ДАННЫЙ

ЕРВОЙ вам дадут в больнице или поликлинике под наблюдение опытного врача.

Вам его введут в виде инфузии (капельно) в вену (внутривенно).

Ваш врач решит, сколько процедур вам нужно.

Дозировка и частота введения

Рекомендуемая доза и частота введения ЕРВОЯ могут различаться в зависимости от типа рака, для лечения которого он используется.

Некоторые виды рака лечат ЕРВОЙ в комплексе.

с ниволумабом или ниволумабом и химиотерапией.

Ваш врач посоветует вам, какое лечение вам будет назначено, и расскажет вам о дозе и частоте этих процедур.

Пожалуйста, обратитесь к брошюре с информацией о лекарственных средствах для потребителей ниволумаба, чтобы понять, как использовать это лекарство. Если у вас есть вопросы об этом лекарстве, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Если вы пропустите дозу ЕРВОЙ

Для вас очень важно соблюдать все назначенные встречи, чтобы получить ЕРВОЙ. Если вы пропустите встречу, спросите своего врача, когда назначить следующую дозу.

Если вы прекратите использовать ЕРВОЙ

Прекращение лечения может прекратить действие лекарства. Не прекращайте лечение препаратом ЕРВОЙ, если вы не обсудили это со своим врачом.

Если у вас есть дополнительные вопросы о вашем лечении или использовании этого лекарства, обратитесь к врачу.

ПОКА ВЫ ЛЕЧИТСЯ С ЕРВОЙ

Вещи, которые вы должны сделать

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы.

возможные побочные эффекты или если они ухудшаются.

Не пытайтесь самостоятельно лечить свои симптомы другими лекарствами.

Вы, доктор, можете

- Дайте вам другие лекарства, чтобы предотвратить осложнения и уменьшить ваши симптомы
- Отказаться от следующей дозы ЕРВОЯ
- Или вообще прекратить лечение препаратом ЕРВОЙ.

Обратите внимание, что эти признаки и симптомы иногда проявляются с задержкой и могут развиваться через несколько недель или месяцев после приема последней дозы. До лечения, ваш врач проверит ваше общее состояние здоровья. Во время лечения у вас также будут анализы крови.

Сообщите другим лечащим вас врачам, стоматологам и фармацевтам, что вам дают ЕРВОЙ.

Если вы собираетесь начать прием какого-либо нового лекарства, сообщите своему врачу, стоматологу или фармацевту, что вам назначают ЕРВОЙ.

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся симптомы аллергической реакции.

Эти симптомы могут быть:

- одышка, хрипы или затрудненное дыхание
- отек лица, губ, языка или других частей тела
- сыпь, зуд или крапивница на коже

ВОЗМОЖНАЯ СТОРОНА ПОСЛЕДСТВИЯ

Как и все лекарственные средства, ЕРВОЙ может вызывать побочные эффекты, хотя и не

все получают их. Ваш врач обсудит это с вами и объяснит риски и преимущества вашего лечения.

Следующие побочные эффекты были зарегистрированы в клинических испытаниях, когда ЕРВОЙ использовался отдельно:

Очень распространенные побочные эффекты (затрагивает более 1 пользователя из 10)

- потеря аппетита
- диарея
- плохое самочувствие (тошнота) или тошнота (рвота)
- боль в животе
- зуд, кожная сыпь
- чувство усталости или слабости
- кашель
- Головная боль
- жар
- бессонница

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо из этих побочных эффектов. Не пытайтесь лечить свои симптомы другими лекарствами.

Распространенные побочные эффекты (от 1 до 10 пользователей из 100)

- тяжелая бактериальная инфекция крови (сепсис)
- опухоль боль
- пониженная функция гипофиза (гипопитуитаризм), надпочечники или недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз), что может вызвать усталость или увеличение веса
- гиперактивная функция щитовидной железы (гипертиреоз), которая может вызвать учащенное сердцебиение, потливость и потерю веса
- обезвоживание
- воспаление глаза, которое вызывает боль и покраснение, помутнение зрения
- низкое кровяное давление, временное покраснение лица и шеи
- одышка, кровотечение в желудке или кишечнике (кишке), воспаление толстой кишки (толстой кишки), запор

- потеря веса
- аномальная функция печени
- воспаление и покраснение кожи, изменение цвета кожи в пятна (витилиго), выпадение или истончение волос,
- повышенная потливость ночью
- боль в мышцах и суставах
- нарушение функции почек
- лихорадка, озноб, упадок сил,
- отек, боль, реакция в месте инъекции,
- путаница
- увеличение щелочной фосфатазы (фермент, вырабатываемый печенью)
- гриппоподобная болезнь

Необычные побочные эффекты (от 1 до 10 пользователей из 1000)

- серьезные бактериальные инфекции крови (сепсис, септический шок)
- инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек, почечная недостаточность
- **воспаление желудка и кишечника**
- депрессия, снижение полового влечения,
- воспаление кровеносных сосудов кожи, крапивница (зуд, бугристая сыпь), болезненные поражения кожи рук, ног и лица
- мышечные спазмы, болезненные суставы, воспаление мышц
- изменение или отсутствие менструаций
- боль в глазу, снижение зрения, кровоизлияние в глаз, ощущение инородного тела в глазах, воспаление глазной мышцы, опухшие слезящиеся глаза
- нерегулярное или ненормальное сердцебиение
- крайне затрудненное дыхание, воспаление легких, жидкость в легких, сенная лихорадка
- заболевание сосудов, низкое кровяное давление, ощущение сильного жара с потливостью и учащенным сердцебиением, слабость сердечной мышцы, жидкость вокруг сердца

- поражение нервов (вызывающее боль, слабость и судороги), головокружение, кратковременное непроизвольное сокращение мышц, дрожь, избыточное скопление воды в мозгу, заболевание нервов в голове, трудности с речью, трудности с координацией движения (атаксия)
- перфорация кишечника, воспаление оболочки стенки желудка, воспаление двенадцатиперстной кишки, кишечника или поджелудочной железы, изжога
- группа метаболических осложнений, возникающих после лечения рака
- печеночная недостаточность, увеличение печени, воспаление печени, щитовидной железы, почек, поджелудочной железы или центральной нервной системы, узелки воспалительные клетки в различных органах вашего тела, иммунные эффекты внутренней поверхности слизистой оболочки определенного органа, пожелтение кожи или глаз (желтуха)
- реакция, связанная с инфузией, полиорганная недостаточность
- **уменьшение эритроцитов**
- мультиорганное воспаление
- **снижение слуха**
- изменение цвета волос
- воспаление слизистой оболочки
- **инфузионная реакция**

Редкие побочные эффекты (от 1 до 10 пользователей из 10 000)

- инфекции дыхательных путей или верхних дыхательных путей
- инфекция вокруг головного или спинного мозга
- аллергическая реакция (шок)
- снижение функции надпочечников, вызванное недостаточной активностью гипоталамуса (части головного мозга) или сверхактивный гипофиз (небольшая железа в основании мозга), дефект желез, вырабатывающих половые гормоны

- антитела против некоторых собственных клеток организма, вызывающих повреждение щитовидной железы или воспаление почек или головного мозга
- изменения в психическом здоровье
- **воспаление нервов (вызывающее боль, слабость или паралич в конечностях), сонливость или упадок сил**
- триада симптомов (менингизм): ригидность затылочных мышц, непереносимость яркого света и головная боль
- **воспаление глаза, опухший насморк, воспаление цветной части глаза, отек глаза**
- **воспаление сердечной мышцы, заболевание сердечной мышцы, аритмия**
- ограничение кровоснабжения конечностей, воспалительный разрушение кровеносных сосудов, воспалительное заболевание кровеносных сосудов (чаще всего артерий головы), нарушение кровообращения, вызывающее онемение или бледность пальцев ног и рук
- дыхательная недостаточность, вызванная жидкостью в легких
- воспалительное заболевание кишечника (вызывающее боль в животе, диарею, которая может быть кровавой, рвоту или потерю веса)
- шелушение кожи
- **воспаление мышц, вызывающее боль или скованность в бедре и плече**
- нарушение слуха
- заболевание крови, вызванное гиперактивностью иммунных клеток.

Изменения в результатах теста

ЕРВОЙ может вызвать изменение результатов анализов, проведенных вашим врачом. Это включает:

- изменение количества эритроцитов (которые переносят кислород), лейкоцитов (которые важны для борьбы с инфекцией) или

тромбоциты (клетки, которые помогают крови сворачиваться)

- аномальное изменение уровня гормонов и ферментов печени в крови
- низкий уровень в крови натрия, фосфата или калия
- кровь или белки в моче
- повышенный уровень ревматоидного фактора
- почки не могут нормально удалять кислоты из крови
- аномально высокая щелочность крови и других тканей организма
- наличие в крови антител против некоторых собственных клеток

Сообщалось о следующих побочных эффектах при применении ЕРВОЯ в комбинации с ниволумабом:

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)

- Гиперактивная щитовидная железа, которая может вызвать учащенное сердцебиение, потливость и потеря веса
- Недостаточная активность щитовидной железы, которая может вызвать усталость или увеличение веса.
- Снижение аппетита
- Головная боль
- Одышка (диспноэ)
- Воспаление кишечника (колит), диарея (водянистый, жидкий или мягкий стул), рвота, тошнота, боль в животе
- Кожная сыпь иногда с волдырями, зуд
- Боли в суставах, мышцах и костях
- Чувство усталости или слабости
- Жар

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)

- Тяжелая инфекция легких (пневмония), инфекции верхних дыхательных путей
- Увеличение некоторых лейкоцитов
- Снижение секреции гормонов, вырабатываемых надпочечниками.

(железы, расположенные над почками); гипоактивная функция (гипопитуитаризм) или воспаление (гипофизит) гипофиза, расположенного в основании головного мозга; гиперактивность щитовидной железы, которая может вызвать учащенное сердцебиение, потливость и потерю веса; воспаление щитовидной железы (гипертиреоз); опухоль щитовидной железы

- обезвоживание
- Воспаление нервов, вызывающее онемение, слабость, покалывание или жгучую боль в руках и ногах; головокружение
- Воспаление глаза, которое вызывает боль и покраснение, нечеткость зрения
- Быстрый сердечный ритм
- Высокое кровяное давление (гипертония)
- Воспаление легких (пневмонит), характеризующееся кашлем и затрудненным дыханием, образованием тромбов, кашлем
- Язвы во рту и герпес (стоматит), воспаление поджелудочной железы (панкреатит), запор, сухость во рту
- Воспаление печени
- Изменение цвета кожи пятнами (витилиго), сухость кожи, покраснение кожи, необычное выпадение волос или истончение, крапивница (зудящая сыпь)
- Боль в мышцах и костях
- Почечная недостаточность (включая резкую потерю функции почек)
- Отек (припухлость), боль
- Аллергическая реакция, реакции, связанные с инфузией препарата

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)

- Воспаление головного мозга
- Бронхит
- Хронические заболевания, связанные с накоплением воспалительных клеток в различных органах и тканях, чаще всего в легких. (саркоидоз)

- Кислота в крови образуется при диабете (диабетический кетоацидоз), сахарном диабете
- Временное воспаление нервов, вызывающее боль, слабость и паралич в конечностях (синдром Гийена-Барре); повреждение нервов, вызывающее онемение и слабость (полинейропатия); воспаление нервов; отвисание стопы (паралич малоберцового нерва); воспаление нервов, вызванное телом атакует себя, вызывая онемение, слабость, покалывание или жгучую боль (аутоиммунная невропатия)
- Изменения ритма или частоты сердечных сокращений, нарушение сердечного ритма
- Жидкость вокруг легких
- Перфорация кишечника, воспаление желудка (гастрит), воспаление двенадцатиперстной кишки (дуоденит)
- Кожное заболевание с утолщенными участками красной кожи, часто с серебристыми чешуйками (псориаз)
- Хронические заболевания суставов (спондилоартропатии)
- Заболевание, при котором иммунная система атакует железы, вырабатывающие влагу для организма, такие как слезы и слюна (синдром Шегрена)
- Воспаление суставов (артрит)
- Воспаление мышц (миозит), вызывающее боль или скованность
- Воспаление почек (нефрит)
- Боль в груди
- Воспаление сердца (миокардит) характеризуется одышкой, утомляемостью, учащенным сердцебиением или болью в груди.
- Разрушение/повреждение мышц (рабдомиолиз), характеризующееся мышечной болью, слабостью, тошнотой или рвотой.

Редко (может затронуть до 1 из 1000 человек)

человек)

- Сильное и, возможно, смертельное шелушение кожи (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивена-Джонсона)

Изменения в результатах теста

- Ниволумаб в сочетании с препаратом ЕРВОЙ может вызвать изменение результатов анализов, проводимых врачом. Это включает:
 - Аномальные функциональные пробы печени
 - Аномальные тесты функции почек
 - Снижение количества эритроцитов (которые переносят кислород), лейкоцитов (которые важны для борьбы с инфекцией) или тромбоцитов (клетки, которые помогают крови сворачиваться).
- Повышенный уровень фермента, расщепляющего жиры, и фермента, расщепляющего крахмал.
- Аномальные уровни кальция, калия, магния или натрия в крови
- Повышение уровня билирубина в крови
- Снижение массы тела
- Повышенный (гипергликемия) или пониженный (гипогликемия) уровень сахара в крови

Следующие побочные эффекты были зарегистрированы в ходе клинических испытаний при применении ЕРВОЯ в комбинации с ниволумабом и химиотерапией:

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)

- Недостаточная активность щитовидной железы, которая может вызвать усталость или увеличение веса.
- Снижение аппетита
- диарея (водянистый, жидкий или мягкий стул), рвота, тошнота
- Кожная сыпь иногда с волдырями, зуд
- Чувство усталости или слабости

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)

- Конъюнктивит

- Тяжелая инфекция легких (пневмония), инфекции верхних дыхательных путей
- Увеличение некоторых лейкоцитов
- Аллергическая реакция, реакции, связанные с инфузией препарата
- Снижение секреции гормонов, вырабатываемых надпочечниками. (железы, расположенные над почками), воспаление (гипофизит) гипофиза, расположенного в основании головного мозга, гиперактивность щитовидной железы, которая может вызвать учащенное сердцебиение, потливость и потерю веса, опухоль щитовидной железы
- Воспаление нервов, вызывающее онемение, слабость, покалывание или жгучую боль в руках и ногах; головокружение
- сухие глаза
- Головная боль
- Одышка (диспноэ)
- Воспаление легких (пневмонит), характеризующееся кашлем и затрудненным дыханием, образованием тромбов, кашлем
- Воспаление кишечника (колит)
- Язвы во рту и герпес (стоматит), воспаление поджелудочной железы (панкреатит), запор, сухость во рту
- Воспаление печени
- сухость кожи, покраснение кожи, необычное выпадение или истончение волос
- Боли в суставах, мышцах и костях, воспаление суставов
- Почечная недостаточность (включая резкую потерю функции почек)
- Жар
- Отек (припухлость)

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)

- малоактивная функция (гипопитуитаризм) гипофиза, расположенного в основании

головной мозг, снижение паратиреоидного гормона

- повреждение нервов, вызывающее онемение и слабость (полинейропатия); воспаление нервов, вызванное атакой организма на самого себя, вызывающее онемение, слабость, покалывающая или жгучая боль (аутоиммунная невропатия), воспаление головного мозга
- затуманенное зрение
- Изменения ритма или частоты сердечных сокращений, нарушение сердечного ритма
- Высокое кровяное давление (гипертония), низкое кровяное давление (гипотония)
- Жидкость вокруг легких, бронхит
- Кожное заболевание с утолщенными участками красной кожи, часто с серебристыми чешуйками (псориаз)
- Сильное и, возможно, смертельное шелушение кожи (Стивен-Джонсон). синдром)
- Воспаление мышц (миозит), вызывающее боль или скованность
- Воспаление почек (нефрит)
- Боль в груди

Изменения в результатах теста

OPDIVO в сочетании с ипилимумабом и химиотерапией может привести к изменению результатов анализов, проведенных вашим врачом. Это включает:

- Аномальные функциональные пробы печени
- Аномальные тесты функции почек
- Снижение количества эритроцитов (которые переносят кислород), лейкоцитов (которые важны для борьбы с инфекцией) или тромбоцитов (клетки, которые помогают крови сворачиваться).
- Повышенный уровень фермента, расщепляющего жиры, и фермента, расщепляющего крахмал.

Аномальные уровни кальция, калия, магния или натрия в крови

Повышенный уровень сахара в крови
(гипергликемия)

Повышение уровня билирубина в крови

Если какие-либо из побочных эффектов, перечисленных в этой брошюре, появляются или ухудшаются, или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в этой брошюре, сообщите об этом своему врачу.

Не пугайтесь возможных побочных эффектов.

Вы можете не испытывать ни одного из них.

Попросите своего врача ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

При финансовой поддержке

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88
Shortland Street
Окленд 1010
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Дата подготовки:

январь 2022 г.

ЕРВОЙ® (ипилимумаб) является зарегистрированным товарным знаком компании Bristol-Myers Squibb.

ДАЛЬШЕ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ЕРВОЙ

- Активное вещество – ипилимумаб.
Каждый флакон содержит 50 мг или 200 мг ипилимумаба.
- Другие ингредиенты: гидрохлорид трометамола, хлорид натрия, маннит (Е421), пентетиновая кислота, полисорбат 80, гидроксид натрия, соляная кислота и вода для инъекций.

Как выглядит ЕРВОЙ и что содержится в упаковке

Концентрат ЕРВОЙ для приготовления раствора для инфузий представляет собой жидкость от прозрачной до слегка опалесцирующей, от бесцветной до бледно-желтой, которая может содержать легкие (небольшие) частицы и поставляется в стеклянном флаконе с резиновой пробкой, закрытой алюминием.

Он доступен в упаковках, содержащих либо 1 флакон 10 мл, либо 1 флакон 40 мл.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

КАК ХРАНИТЬ ЕРВОЙ

Вряд ли вас попросят хранить ЕРВОЙ самостоятельно. Он будет храниться в больнице или клинике, где его вам выдали.