Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medsafe

Información sobre medicamentos para el consumidor

YERVOY®

(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab)

QUE HAY EN ESTO FOLLETO

Este folleto responde algunas preguntas comunes sobre YERVOY. No contiene toda la información disponible. No reemplaza la consulta con su médico o farmacéutico.

Todas las medicinas tienen riesgos y beneficios. Su médico ha sopesado los riesgos de que reciba YERVOY frente a los beneficios que espera que tenga para usted.

Si tiene alguna duda acerca de tomar este medicamento, consulte a su médico.

Debe leer este prospecto detenidamente y guardarlo en un lugar seguro para consultarlo más adelante.

QUE ES YERVOY
USADO PARA

YERVOY contiene el principio activo ipilimumab, una proteína que ayuda a su sistema inmunitario a atacar y destruir las células cancerosas.

Tratamiento con YERVOY

YERVOY, como terapia única, se usa para tratar el cáncer de piel (melanoma no resecable o avanzado) en adultos.

Tratamiento con YERVOY en combinación con nivolumab

YERVOY en combinación con nivolumab se usa para tratar el cáncer de piel avanzado (irresecable o melanoma metastásico), un tipo de cáncer de riñón avanzado (carcinoma de células renales) y mesotelioma pleural maligno (un tipo de cáncer que afecta el revestimiento del pulmón).

Tratamiento con YERVOY en combinación con nivolumab y quimioterapia

YERVOY en combinación con nivolumab y quimioterapia se usa para tratar el cáncer de pulmón avanzado en adultos.

Este medicamento está disponible sólo con receta médica.

Se le administrará YERVOY en el hospital bajo la supervisión de un médico experimentado.

Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre por qué le han recetado YERVOY.

ANTES DE ESTAR DADO YERVOY

No se le debe administrar YERVOY

- si es alérgico (hipersensible) a ipilimumab o a cualquiera de los demás componentes de YERVOY. Si no está seguro, hable con su médico.

Consulte con su médico o enfermero antes de que le administren YERVOY

- si toma corticosteroides o terapia inmunosupresora. Estos son medicamentos que reducen el funcionamiento de su sistema inmunitario, y puede hacerlo más propenso a desarrollar infecciones y algunos tipos de cáncer
- si tiene una enfermedad autoinmune (una condición en la que el cuerpo ataca a sus propias células).
- si tiene, o ha tenido alguna vez, una infección viral crónica del hígado, incluyendo hepatitis B (VHB) o hepatitis C (VHC)
- si tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
- si toma terapia anticoagulante. Estos son medicamentos que aumentar el riesgo de sangrado en el estómago y el intestino
- si ha experimentado previamente una reacción cutánea grave en un tratamiento anterior contra el cáncer
- si tiene antecedentes de inflamación de los pulmones.

YERVOY puede causar:

- Problemas con su corazón, como cambios en el ritmo o la frecuencia de los latidos del corazón o un ritmo cardíaco anormal.
- Inflamación de intestino, intestino y estómago que puede empeorar hasta hemorragias o perforación intestinal. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), un aumento en el número de deposiciones (un aumento de dos o más por día), estreñimiento, sangre en las heces o heces de color más oscuro, dolor o sensibilidad en el área del estómago.
- Problemas con los pulmones, como dificultad para respirar o tos.

Estos pueden ser signos de inflamación de los pulmones (neumonitis o enfermedad pulmonar intersticial).

- Daño hepático o hepatitis. Los signos y síntomas pueden incluir coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos (ictericia), dolor en la zona del estómago, somnolencia excesiva
- Erupción o picazón en la piel. Los signos y síntomas de una reacción cutánea grave pueden incluir erupción cutánea con o sin picor, descamación de la piel, piel seca, fiebre, fatiga, hinchazón de la cara o de los ganglios linfáticos, aumento de eosinófilos (tipo de glóbulos blancos) y efectos en el hígado, los riñones o los pulmones. Las reacciones cutáneas graves pueden incluir necrólisis epidérmica tóxica (NET), síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y reacción a fármacos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos (DRESS).
- Inflamación de los nervios. Los síntomas pueden incluir debilidad muscular o disminución de la fuerza, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, pérdida de conciencia o dificultad para despertarse.
- Inflamación o problemas con su riñón. Los signos y síntomas pueden incluir pruebas de función renal anormales o disminución volumen de orina
- Daño o inflamación de las glándulas productoras de hormonas. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, visión borrosa o doble, fatiga, disminución del deseo sexual, cambios de comportamiento
- Diabetes. Los síntomas incluyen sed excesiva, aumento de la cantidad de orina, aumento del apetito con pérdida de peso, cansancio, somnolencia, debilidad, depresión, irritabilidad y malestar general) o cetoacidosis diabética (ácido en la sangre producido por la diabetes) .
- Inflamación de los músculos. Los signos y síntomas pueden incluir dolor muscular, rigidez, debilidad, dolor en el pecho o fatiga intensa. Esto puede incluir miocarditis (inflamación del músculo cardíaco), miositis (inflamación de los músculos) y rabdomiolisis (rigidez en músculos y articulaciones, espasmo muscular).
- Inflamación ocular. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento en el ojo, dolor en el ojo, cambios en la visión o visión borrosa.
- Trasplante de órgano sólido

Pueden ocurrir complicaciones del trasplante de células madre que utiliza células de un donante (alogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y pueden conducir a la muerte. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos de complicaciones si tiene una célula madre alogénica. trasplante.

Usar otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento durante su tratamiento.

Niños

No se recomienda el uso de este medicamento en niños o adolescentes (menores de 18 años) hasta que se disponga de más información.

Tenga especial cuidado con YERVOY

YERVOY es un medicamento que influye en su sistema inmunológico y puede causar inflamación en partes de su cuerpo. La inflamación puede causar daños graves a su cuerpo y algunas afecciones inflamatorias pueden ser irreversibles o potencialmente mortales. Algunas afecciones inflamatorias pueden necesitar tratamiento o la suspensión de YERVOY. Dígaselo a su médico inmediatamente si tiene alguno de los síntomas de inflamación enumerados en "Posibles efectos secundarios" en este prospecto.

Embarazo y mama-alimentación

Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o si está amamantando.

No debe usar YERVOY si está embarazada a menos que su médico se lo recomiende específicamente.

Se desconocen los efectos de YERVOY en mujeres embarazadas, pero es posible que el principio activo, ipilimumab, pueda dañar al feto.

- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz mientras esté en tratamiento con YERVOY si es una mujer que podría quedarse embarazada.
- Si queda embarazada mientras usa YERVOY, informe a su médico.

Debe interrumpir la lactancia si está en tratamiento con YERVOY.

No se sabe si ipilimumab pasa a la leche materna. No se puede excluir un riesgo para el lactante.

Conducción y uso de máquinas.

No conduzca ni utilice máquinas después de que le hayan administrado YERVOY a menos que esté seguro de que no se ve afectado.

Sentirse cansado o débil es un efecto secundario muy común de YERVOY. Esto puede afectar su capacidad para conducir u operar cualquier maquinaria. Por lo tanto, los pacientes deben tener cuidado después de haber recibido YERVOY.

Información importante sobre algunos de los componentes de YERVOY

Informe a su médico si sigue una dieta baja en sodio (baja en sal) antes de que le administren YERVOY. Este medicamento contiene 2,3 mg de sodio por ml de concentrado.

COMO ES YERVOY DADO

Se le administrará YERVOY en un hospital o clínica bajo las supervisión de un médico experimentado.

Se le administrará como una infusión (un goteo) en una vena (por vía intravenosa).

Su médico decidirá cuántos tratamientos necesita.

Posología y frecuencia de administración

La dosis y la frecuencia recomendadas de YERVOY pueden variar según el tipo de cáncer que se esté tratando.

Algunos tipos de cáncer se tratan con YERVOY en combinación con nivolumab o nivolumab y quimioterapia.

Su médico le indicará qué tratamientos se le administrarán y le informará sobre la dosis y la frecuencia de estos tratamientos.

Consulte el prospecto de información sobre medicamentos para el consumidor de nivolumab para comprender el uso de este medicamento. Si tiene dudas sobre este medicamento, consulte a su médico.

Si olvida una dosis de YERVOY

Es muy importante que asista a todas las citas para recibir YERVOY. Si pierde una cita, pregúntele a su médico cuándo programar su próxima dosis.

Si deja de usar YERVOY

Detener su tratamiento puede detener el efecto del medicamento. No interrumpa el tratamiento con YERVOY a menos que lo haya comentado con su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre su tratamiento o el uso de este medicamento, consulte a su médico.

MIENTRAS QUE USTED ESTÁ SER TRATADO CON YERVOY

cosas que debes hacer

Informe a su médico inmediatamente si tiene algún signo o síntoma de. posibles efectos secundarios o si empeoran.

No intente tratar sus síntomas con otros medicamentos por su cuenta.

Su médico puede

- Darle otros medicamentos para prevenir complicaciones y reducir sus síntomas
- Suspender la siguiente dosis de YERVOY
- O suspenda su tratamiento con YERVOY por completo.

Tenga en cuenta que estos signos y síntomas a veces se retrasan y pueden desarrollarse semanas o meses después de su última dosis. Antes tratamiento, su médico comprobará su estado de salud general. También le harán análisis de sangre durante el tratamiento.

Informe a los demás médicos, dentistas y farmacéuticos que le están tratando que le están dando YERVOY.

Si está a punto de comenzar con cualquier medicamento nuevo, informe a su médico, dentista o farmacéutico que le están dando YERVOY.

Informe a su médico inmediatamente si desarrolla síntomas de una reacción alérgica.

Estos síntomas pueden ser:

- dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar
- hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo
- erupción, picazón o urticaria en la piel

LADO POSIBLE EFECTOS

Como todos los medicamentos, YERVOY puede producir efectos adversos, aunque no todo el mundo los consigue. Su médico discutirá esto con usted y le explicará los riesgos y beneficios de su tratamiento.

Se informaron los siguientes efectos secundarios en ensayos clínicos cuando YERVOY se usó solo:

Efectos adversos muy frecuentes (afectan a más de 1 de cada 10 usuarios)

- pérdida de apetito
- Diarrea
- sentirse enfermo (náuseas) o estar enfermo (vómitos)
- dolor de estómago
- picazón, erupción cutánea
- sentirse cansado o débil
- tos
- dolor de cabeza
- fiebre
- insomnio

Informe a su médico de inmediato si presenta alguno de estos efectos secundarios. No intente tratar sus síntomas con otros medicamentos.

Efectos secundarios comunes (afecta de 1 a 10 usuarios de cada 100)

- infección bacteriana grave de la sangre (sepsis)
- dolor tumoral
- función hipofisaria de la glándula pituitaria (hipopituitarismo), la glándulas suprarrenales, o función hipoactiva de la glándula tiroides (hipotiroidismo) que puede causar cansancio o aumento de peso
- función hiperactiva de la glándula tiroides (hipertiroidismo), lo que puede provocar un ritmo cardíaco acelerado, sudoración y pérdida de peso
- deshidración
- inflamación del ojo que causa dolor y enrojecimiento, visión borrosa
- presión arterial baja, enrojecimiento temporal de la cara y el cuello
- dificultad para respirar, sangrado en el estómago o el intestino (intestino), inflamación del colon (intestino grueso), estreñimiento

- pérdida de peso
- función anormal del hígado
- inflamación y enrojecimiento de la piel, cambio de color de la piel en parches (vitíligo), pérdida o adelgazamiento del cabello,
- sudoración excesiva por la noche
- dolor en músculos y articulaciones
- falla de la función renal
- fiebre, escalofríos, falta de energía,
- hinchazón, dolor, reacción en el lugar de la inyección,
- confusión
- aumento de la fosfatasa alcalina (una enzima liberada por el hígado)
- enfermedad similar a la influenza

Efectos secundarios poco frecuentes (afecta de 1 a 10 usuarios de cada 1000)

- infección bacteriana grave de la sangre (sepsis, shock séptico)
- infección del tracto urinario, enfermedad renal, insuficiencia renal
- inflamación del estómago y los intestinos
- depresión, disminución del deseo sexual,
- inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, urticaria (erupción cutánea con picazón y bultos), lesiones dolorosas en la piel de los brazos, las piernas y la cara
- espasmos musculares, dolor en las articulaciones, inflamación muscular
- cambio o ausencia de períodos menstruales
- dolor en el ojo, visión reducida, sangrado en el ojo, sensación de cuerpo extraño en los ojos, inflamación del músculo ocular, ojos hinchados y llorosos
- latidos cardíacos irregulares o anormales
- dificultad extrema para respirar, inflamación de los pulmones, líquido en los pulmones, fiebre del heno
- enfermedad de los vasos sanguíneos, presión arterial baja, sensación de calor intenso con sudoración y latidos cardíacos rápidos, debilidad del músculo cardíaco, líquido alrededor del corazón
- daño a los nervios (causando dolor, debilidad y calambres), mareos, breve contracción muscular involuntaria, temblores, acumulación excesiva de agua en el cerebro, enfermedad de los nervios en la cabeza, dificultad para hablar, dificultad para coordinar movimientos (ataxia)
- perforación intestinal, inflamación de la membrana de la pared del estómago, inflamación del duodeno, del intestino o del páncreas, ardor de estómago
- un grupo de complicaciones metabólicas que ocurren después del tratamiento del cáncer
- insuficiencia hepática, agrandamiento del hígado, inflamación del hígado, glándula tiroides, riñón, páncreas o sistema nervioso central, nódulos de células inflamatorias en varios órganos de su cuerpo, efectos relacionados con el sistema inmunitario del revestimiento de la superficie interna de un órgano en particular, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia)
- reacción relacionada con la infusión, falla multiorgánica
- reducción de glóbulos rojos
- inflamación multiorgánica
- disminución de la audición
- cambio en el color del cabello
- inflamación de la mucosa
- reacción relacionada con la infusión

Efectos secundarios raros (afecta de 1 a 10 usuarios en 10,000)

- infección de las vías respiratorias o del tracto respiratorio superior
- infección alrededor del cerebro o la médula espinal
- reacción alérgica (shock)
- disminución de la función de las glándulas suprarrenales causada por un hipotálamo hipoactivo (parte del cerebro) o una glándula pituitaria hiperactiva (una pequeña glándula en la base del cerebro), defecto en las glándulas que producen hormonas sexuales
- anticuerpos contra algunas de sus propias células corporales que causan daño a la glándula tiroides o inflamación del riñón o el cerebro
- cambios en la salud mental
- inflamación de los nervios (que causa dolor, debilidad o parálisis en las extremidades), somnolencia o falta de energía
- tríada de síntomas (meningismo): rigidez de nuca, intolerancia a la luz brillante y dolor de cabeza
- inflamación del ojo, ojos hinchados y llorosos, inflamación de la parte coloreada del ojo, hinchazón del ojo
- inflamación del músculo cardíaco, enfermedad del músculo cardíaco, arritmia
- restricción en el suministro de sangre de las extremidades, inflamación destrucción de los vasos sanguíneos, enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos (más comúnmente de las arterias de la cabeza), circulación sanguínea deficiente que hace que los dedos de las manos y los pies se entumezcan o se pongan pálidos
- insuficiencia respiratoria causada por líquido en los pulmones
- enfermedad inflamatoria de los intestinos (que causa dolor abdominal, diarrea que puede ser sanguinolenta, vómitos o pérdida de peso)
- descamación de la piel
- inflamación de los músculos, causando dolor o rigidez en la cadera y hombro
- trastorno auditivo
- trastorno de la sangre causado por células inmunitarias hiperactivas.

Cambios en los resultados de las pruebas

YERVOY puede causar cambios en los resultados de las pruebas realizadas por su médico. Éstos incluyen:

- una variación en el número de glóbulos rojos (que transportan oxígeno), de glóbulos blancos (que son importantes para combatir infecciones) o

de plaquetas (células que ayudan a la coagulación de la sangre)

- una variación anormal de las hormonas y los niveles de enzimas hepáticas en la sangre

- un nivel bajo de sodio, fosfato o potasio en la sangre
- sangre o proteínas en la orina
- un aumento del nivel de factor reumatoide
- riñones incapaces de eliminar los ácidos de la sangre normalmente
- una alcalinidad anormalmente alta de la sangre y otros tejidos del cuerpo
- presencia de anticuerpos en la sangre contra algunas de sus propias células

Se han informado los siguientes efectos secundarios con YERVOY en combinación con nivolumab:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- Glándula tiroides hiperactiva, que puede causar frecuencia cardíaca rápida, sudoración y pérdida de peso
- Glándula tiroides poco activa, lo que puede causar cansancio o aumento de peso
- Disminucion del apetito
- Dolor de cabeza
- Dificultad para respirar (disnea)
- Inflamación de los intestinos (colitis), diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), vómitos, náuseas, dolor de estómago
- Erupción cutánea a veces con ampollas, picazón
- Dolor en las articulaciones, músculos y huesos
- Sentirse cansado o débil
- Fiebre

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Infección pulmonar grave (neumonía), infecciones de las vías respiratorias superiores
- Aumento de algunos glóbulos blancos
- Disminución de la secreción de hormonas producidas por las glándulas suprarrenales (glándulas situadas encima de los riñones); función hipoactiva (hipopituitarismo) o inflamación (hipofisitis) de la glándula pituitaria situada en la base del cerebro; glándula tiroides hiperactiva, que puede causar latidos cardíacos rápidos, sudoración y pérdida de peso; inflamación de la glándula tiroides (hipertiroidismo); hinchazón de la glándula tiroides
- Deshidración
- Inflamación de los nervios que causa entumecimiento, debilidad, hormigueo o dolor ardiente en brazos y piernas; mareo
- Inflamación del ojo, que causa dolor y enrojecimiento, visión borrosa
- frecuencia cardíaca rápida
- Presión arterial alta (hipertensión)
- Inflamación de los pulmones (neumonitis), caracterizada por tos y dificultad para respirar, coágulos de sangre, tos
- Úlceras bucales y herpes labial (estomatitis), inflamación del páncreas (pancreatitis), estreñimiento, boca seca
- Inflamación del hígado
- Cambio de color de la piel en parches (vitíligo), piel seca, enrojecimiento de la piel, pérdida de cabello inusual o adelgazamiento, urticaria (sarpullido que pica)
- Dolor en los músculos y huesos
- Insuficiencia renal (incluida la pérdida abrupta de la función renal)
- Edema (hinchazón), dolor
- Reacción alérgica, reacciones relacionadas con la infusión del medicamento.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Inflamación del cerebro
- Bronquitis
- Enfermedades crónicas asociadas con la acumulación de células inflamatorias en varios órganos y tejidos, más comúnmente en los pulmones (sarcoidosis)
- Ácido en la sangre producido por la diabetes (cetoacidosis diabética), diabetes
- Una inflamación temporal de los nervios que causa dolor, debilidad y parálisis en las extremidades (síndrome de Guillain-Barré); daño a los nervios que causa entumecimiento y debilidad (polineuropatía); inflamación de los nervios; pie caído (parálisis del nervio peroneo); inflamación de los nervios causada por el cuerpo atacándose a sí mismo, causando entumecimiento, debilidad, hormigueo o dolor ardiente (neuropatía autoinmune)
- Cambios en el ritmo o la frecuencia de los latidos del corazón, ritmo cardíaco anormal
- Líquido alrededor de los pulmones
- Perforación intestinal, inflamación del estómago (gastritis), inflamación del duodeno (duodenitis)
- Enfermedad de la piel con parches engrosados de piel roja, a menudo con escamas plateadas (psoriasis)
- Enfermedad crónica de las articulaciones (espondiloartropatía)
- Enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca las glándulas que producen humedad para el cuerpo, como las lágrimas y la saliva (síndrome de Sjogren)
- Inflamación de las articulaciones (artritis)
- Inflamación de los músculos (miositis) que causa dolor o rigidez
- Inflamación del riñón (nefritis)
- Dolor de pecho
- Inflamación del corazón (miocarditis) caracterizada por dificultad para respirar, fatiga, palpitaciones o dolor en el pecho.
- Rotura/lesión muscular (rabdomiólisis) caracterizada por dolor muscular, debilidad, náuseas o vómitos.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- Descamación severa y posiblemente fatal de la piel (epidérmica tóxica). necrólisis, síndrome de Steven-Johnson)

Cambios en los resultados de las pruebas

- Nivolumab en combinación con YERVOY puede causar cambios en los resultados de las pruebas realizadas por su médico. Éstos incluyen:
- Pruebas de función hepática anormales
- Pruebas de función renal anormales
- Disminución del número de glóbulos rojos (que transportan oxígeno), glóbulos blancos (que son importantes para combatir infecciones) o plaquetas (células que ayudan a la coagulación de la sangre)
- Un aumento del nivel de la enzima que descompone las grasas y de la enzima que descompone el almidón.
- Niveles anormales de calcio, potasio, magnesio o sodio en la sangre
- Niveles más altos de bilirrubina en la sangre
- Disminución del peso corporal
- Niveles más altos (hiperglucemia) o más bajos (hipoglucemia) de azúcar en la sangre

Se informaron los siguientes efectos secundarios en ensayos clínicos cuando se administró YERVOY en combinación con nivolumab y quimioterapia:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- Glándula tiroides poco activa, lo que puede causar cansancio o aumento de peso
- Disminucion del apetito
- diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), vómitos, náuseas
- Erupción cutánea a veces con ampollas, picazón
- Sentirse cansado o débil

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Conjuntivitis
- Infección pulmonar grave (neumonía), infecciones de las vías respiratorias superiores
- Aumento de algunos glóbulos blancos
- Reacción alérgica, reacciones relacionadas con la infusión del medicamento.
- Disminución de la secreción de hormonas producidas por las glándulas suprarrenales (glándulas situadas encima de los riñones), inflamación (hipofisitis) de la glándula pituitaria situada en la base del cerebro, glándula tiroidea hiperactiva, que puede provocar un ritmo cardíaco acelerado, sudoración y pérdida de peso, hinchazón de la glándula tiroides
- Inflamación de los nervios que causa entumecimiento, debilidad, hormigueo o dolor ardiente en brazos y piernas; mareo
- ojos secos
- dolor de cabeza
- Dificultad para respirar (disnea)
- Inflamación de los pulmones (neumonitis), caracterizada por tos y dificultad para respirar, coágulos de sangre, tos
- Inflamación de los intestinos (colitis)
- Úlceras bucales y herpes labial (estomatitis), inflamación del páncreas (pancreatitis), estreñimiento, boca seca
- Inflamación del hígado
- piel seca, enrojecimiento de la piel, pérdida o adelgazamiento inusual del cabello
- Dolor en las articulaciones, músculos y huesos, inflamación de las articulaciones
- Insuficiencia renal (incluida la pérdida abrupta de la función renal)
- Fiebre
- Edema (hinchazón)

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- función hipoactiva (hipopituitarismo) de la hipófisis situada en la base de la cerebro, disminución de la hormona paratiroidea
- daño a los nervios que causa entumecimiento y debilidad (polineuropatía); inflamación de los nervios causada por el ataque del cuerpo a sí mismo, causando entumecimiento, debilidad, hormigueo o dolor ardiente (neuropatía autoinmune), inflamación del cerebro
- visión borrosa
- Cambios en el ritmo o la frecuencia de los latidos del corazón, ritmo cardíaco anormal
- Presión arterial alta (hipertensión), presión arterial baja (hipotensión)
- Líquido alrededor de los pulmones, bronquitis
- Enfermedad de la piel con parches engrosados de piel roja, a menudo con escamas plateadas (psoriasis)
- Peeling severo y posiblemente fatal de la piel (Steven-Johnson síndrome)
- Inflamación de los músculos (miositis) que causa dolor o rigidez
- Inflamación del riñón (nefritis)
- Dolor de pecho

Cambios en los resultados de las pruebas

OPDIVO en combinación con ipilimumab y quimioterapia puede causar cambios en los resultados de las pruebas realizadas por su médico. Éstos incluyen:

- Pruebas de función hepática anormales
- Pruebas de función renal anormales
- Disminución del número de glóbulos rojos (que transportan oxígeno), glóbulos blancos (que son importantes para combatir infecciones) o plaquetas (células que ayudan a la coagulación de la sangre)
- Un aumento del nivel de la enzima que descompone las grasas y de la enzima que descompone el almidón.

Niveles anormales de calcio, potasio, magnesio o sodio en la sangre

Niveles más altos de azúcar en la sangre (hiperglucemia)

Niveles más altos de bilirrubina en la sangre

Si alguno de los efectos adversos enumerados en este prospecto aparece o empeora, o si nota algún efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

No se alarme por los posibles efectos secundarios.

Es posible que no experimente ninguno de ellos.

Pídale a su médico que responda cualquier pregunta que pueda tener.

MÁS LEJOS INFORMACIÓN

Composición de YERVOY

- El principio activo es ipilimumab.

  Cada vial contiene 50 mg o 200 mg de ipilimumab.
- Los demás componentes son clorhidrato de trometamol, cloruro de sodio, manitol (E421), ácido pentético, polisorbato 80, hidróxido de sodio,

  ácido clorhídrico y agua para inyección.

Aspecto de YERVOY y contenido del envase

YERVOY concentrado para solución para perfusión es un líquido transparente a ligeramente opalescente, de incoloro a amarillo pálido que puede contener partículas ligeras (pocas) y se presenta en un vial de vidrio con un tapón de goma sellado con aluminio.

Está disponible en envases que contienen 1 vial de 10 ml o 1 vial de 40 ml.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

CÓMO CONSERVAR YERVOY

Es poco probable que le pidan que almacene YERVOY usted mismo. Se almacenará en el hospital o clínica donde se le administre.

Patrocinado por

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 Shortland Street
Auckland1010
NUEVA ZELANDA

Fecha de preparación:

enero 2022

YERVOY® (ipilimumab) es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company