



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [ブレンツキシマブベドチン注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611052.html>

## ブレンツキシマブベドチン注射

(bren tux'i mab ve doe' tin) と発音されます

### 重要な警告：

ブレンツキシマブベドチン注射を受けると、進行性多巣性白質脳症（PML;治療、予防、または治癒できず、通常は死亡または重度の障害を引き起こすまれな脳感染症）を発症するリスクが高まる可能性があります。あなたがあなたの免疫系に影響を与える状態を持っているか、または持ったことがあるかどうかあなたの医者に伝えてください。免疫系を抑制する薬を服用している場合は、医師と薬剤師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、ブレンツキシマブベドチン注射の投与を中止し、すぐに医師に連絡してください。体の片側の筋力低下または脱力感。歩くのが難しい; 協調性の喪失; 頭痛; 錯乱; はっきりと考えるのが難しい。記憶喪失; 気分や通常の行動の変化; 発話困難; または視力が変化します。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、ブレンツキシマブベドチン注射に対する体の反応を確認するために特定の検査を命じることがあります。

ブレンツキシマブベドチン注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

### なぜこの薬が処方されているのですか？

#### ブレンツキシマブベドチン注射が使用されます

- 以前に治療を受けたことがない人のホジキンリンパ腫（ホジキン病）を治療するための他の化学療法薬と組み合わせて、
- 病気が悪化したり、幹細胞移植後に再発したりするリスクのある人のホジキンリンパ腫を治療するため（病気の骨髄を健康な骨髄に置き換える手順）、
- 幹細胞移植（罹患した骨髄を健康な骨髄に置き換える手順）または化学療法の少なくとも2つの治療期間に反応しなかった人のホジキンリンパ腫を治療するため、
- 未分化大細胞リンパ腫（sALCL;非ホジキンリンパ腫の一種）および他の特定の種類の末梢T細胞リンパ腫（PTCL;非ホジキンリンパ腫の一種）を治療するための他の化学療法薬と組み合わせて治療を受けた、

- 化学療法の別の治療期間に反応しなかった人の全身性sALCLを治療するために、
- 以前に別の治療を受けたことがある人の特定の種類の原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫（pcALCL;非ホジキンリンパ腫の一種）を治療するため。

ブレンツキシマブベドチン注射は、抗体薬物複合体と呼ばれる薬剤のクラスに含まれます。それは癌細胞を殺すことによって機能します。

## わあ、この薬を使うべきですか？

ブレンツキシマブベドチン注射は、液体と混合され、診療所または病院の医師または看護師によって静脈内（静脈内）に30分以上注射される粉末として提供されます。ホジキンリンパ腫、sALCL、またはPTCLの治療にブレンツキシマブベドチンを投与する場合、医師が治療を勧めている限り、通常は3週間に1回注射されます。ブレンツキシマブベドチンを化学療法と組み合わせて使用し、ホジキンリンパ腫を最初の治療として治療する場合、医師が治療を勧めている限り、通常は2週間に1回注射されます。

ブレンツキシマブベドチン注射は、重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があります。これは通常、薬剤の注入中または投与を受けてから24時間以内に発生します。以前の治療で反応があった場合は、アレルギー反応を防ぐために、注入前に特定の薬を服用することがあります。あなたがブレンツキシマブベドチンを受け取っている間、あなたの医者はあなたを注意深く見守ります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に相談してください：発熱、悪寒、発疹、じんましん、かゆみ、または呼吸困難。

特定の副作用が発生した場合、医師は治療を遅らせるか、用量を調整するか、治療を中止する必要があります。ブレンツキシマブベドチン注射による治療中の気分を医師に必ず伝えてください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### ブレンツキシマブベドチン注射を受ける前に、

- ブレンツキシマブベドチン、他の薬、またはブレンツキシマブベドチン注射の成分のいずれかにアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- プレオマイシンを服用しているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこの薬を服用している場合、あなたの医者はおそらくブレンツキシマブベドチン注射を使用しないようにあなたに言うでしょう。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。クラリスロマイシン（Biaxin、PrevPac）、インジナビル（Crixivan）、イトラコナゾール（Sporanox）、ケトコナゾール、ネファゾドン、ネルフィナビル（Viracept）、リファンピン（Rifadin、Rimactane、Rifamate、Rifater）、およびリトナビル（Norvir、カレトラ）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 肝臓や腎臓の病気にかかったことがあるか、今までにあったかどうかを医師に伝えてください。

- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。妊娠できる女性の場合は、治療を開始する前に妊娠検査を受け、治療中および最終投与後6か月間は効果的な避妊を行う必要があります。妊娠中または妊娠する可能性のある女性のパートナーがいる男性の場合は、治療中および最終投与後6か月間は効果的な避妊を行う必要があります。使用できる避妊方法については、医師に相談してください。ブレンツキシマブベドチン注射を受けている間にあなたまたはあなたのパートナーが妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。ブレンツキシマブベドチン注射は胎児に害を及ぼす可能性があります。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。ブレンツキシマブベドチン注射を受けている間は、授乳しないでください。
- この薬は男性の出生力を低下させる可能性があることを知っておく必要があります。ブレンツキシマブベドチン注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ブレンツキシマブベドチン注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 便秘
- 口内痛
- 食欲不振
- 減量
- 疲れ
- めまい
- 弱点
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- 不安
- 乾燥肌
- 脱毛
- 寝汗
- 関節、骨、筋肉、背中、腕、または脚の痛み
- 筋肉のけいれん

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 異常な出血またはあざ
- 手、腕、足、または脚のしびれ、灼熱感、またはうずき

- 筋力低下
- 皮膚の剥離または水ぶくれ
- じんましん
- 発疹
- かゆみ
- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 咳や息切れ
- 排尿の減少
- 手、足、足首、または下肢の腫れ
- 排尿困難、痛みを伴う、または頻尿
- 発熱、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候
- 胃の領域で始まり、背中に広がる可能性のある進行中の痛み
- 薄い肌
- 皮膚や目の黄変
- 右上腹部の痛みや不快感
- 暗色尿
- 粘土色の排便
- 胃痛
- 異常な出血またはあざ
- 黒とタールのスツール
- 便中の赤い血

ブレンツキシマブベドチン注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

## 過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 発熱、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

ブレンツキシマブベドチン注射について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- アドセトリス®

最終改訂日-2019年2月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



### [American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日