



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Injection de brentuximab védotine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611052.html>

## Injection de brentuximab védotine

prononcé comme (bren tux' i mab ve doe' tin)

### AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection de brentuximab vedotin peut augmenter le risque de développer une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP ; une infection rare du cerveau qui ne peut être traitée, prévenue ou guérie et qui entraîne généralement la mort ou une invalidité grave). Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie qui affecte votre système immunitaire. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de recevoir l'injection de brentuximab védotine et appelez immédiatement votre médecin : diminution de la force ou faiblesse d'un côté du corps ; difficulté à marcher ; perte de coordination ; mal de crâne ; confusion ; difficulté à penser clairement ; perte de mémoire ; changements d'humeur ou de comportement habituel ; difficulté à parler ; ou des changements de vision.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de brentuximab vedotin.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection de brentuximab vedotin.

### Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

#### L'injection de brentuximab védotine est utilisée

- en association avec d'autres médicaments de chimiothérapie pour traiter le lymphome de Hodgkin (maladie de Hodgkin) chez ceux qui n'ont pas reçu de traitement auparavant,
- pour traiter le lymphome de Hodgkin chez les personnes qui risquent que leur maladie s'aggrave ou réapparaisse après une greffe de cellules souches (procédure qui remplace la moelle osseuse malade par de la moelle osseuse saine),
- pour traiter le lymphome de Hodgkin chez les personnes qui n'ont pas répondu à une greffe de cellules souches (procédure qui remplace la moelle osseuse malade par de la moelle osseuse saine) ou à au moins deux périodes de traitement de chimiothérapie,
- en association avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques pour traiter le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGCs ; un type de lymphome non hodgkinien) et certains autres types de lymphomes périphériques à cellules T (PTCL ; un type de lymphome non hodgkinien) chez les personnes qui n'ont jamais reçu un traitement,

- pour traiter le LAGCs systémique chez ceux qui n'ont pas répondu à une autre période de traitement de chimiothérapie, ,
- pour traiter un certain type de lymphome cutané anaplasique à grandes cellules (PCALCL ; un type de lymphome non hodgkinien) chez les personnes ayant déjà reçu un autre traitement.

L'injection de brentuximab védotine appartient à une classe de médicaments appelés conjugués anticorps-médicament. Il agit en tuant les cellules cancéreuses.

### **Comment ce médicament doit-il être utilisé ?**

L'injection de brentuximab vedotin se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide et à injecter en 30 minutes par voie intraveineuse (dans une veine) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou un hôpital. Lorsque le brentuximab vedotin est administré pour traiter le lymphome de Hodgkin, le LAGCs ou le PTCL, il est généralement injecté une fois toutes les 3 semaines aussi longtemps que votre médecin vous recommande de recevoir un traitement. Lorsque le brentuximab vedotin est utilisé en association avec une chimiothérapie pour traiter le lymphome de Hodgkin en tant que premier traitement, il est généralement injecté une fois toutes les 2 semaines aussi longtemps que votre médecin vous recommande de recevoir un traitement.

L'injection de brentuximab védotine peut provoquer des réactions allergiques graves, qui surviennent généralement pendant la perfusion du médicament ou dans les 24 heures suivant l'administration d'une dose. Vous pouvez recevoir certains médicaments avant votre perfusion pour prévenir une réaction allergique si vous avez eu une réaction avec un traitement précédent. Votre médecin vous surveillera attentivement pendant que vous recevez le brentuximab vedotin. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, informez-en immédiatement votre médecin : fièvre, frissons, éruption cutanée, urticaire, démangeaisons ou difficultés respiratoires.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement, ajuster votre dose ou arrêter votre traitement si vous ressentez certains effets indésirables. Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par injection de brentuximab vedotin.

### **autres utilisations de ce médicament**

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

### **Quelles précautions particulières dois-je suivre ?**

#### **Avant de recevoir l'injection de brentuximab vedotin,**

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au brentuximab vedotin, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans l'injection de brentuximab vedotin. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous recevez de la bléomycine. Votre médecin vous dira probablement de ne pas utiliser l'injection de brentuximab vedotin si vous recevez ce médicament.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), kétoconazole, néfazodone, nelfinavir (Viracept), rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, dans Rifater) et ritonavir (Norvir, à Kaletra). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie ou des reins.

- informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Si vous êtes une femme en mesure de devenir enceinte, vous devez effectuer un test de grossesse avant de commencer le traitement et utiliser une contraception efficace pendant votre traitement et pendant 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme dont la partenaire est enceinte ou pourrait le devenir, vous devez utiliser une contraception efficace pendant votre traitement et pendant 6 mois après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez utiliser. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant que vous recevez l'injection de brentuximab vedotin, appelez immédiatement votre médecin. L'injection de brentuximab vedotin peut nuire au fœtus.
- informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous recevez une injection de brentuximab vedotin.
- vous devez savoir que ce médicament peut diminuer la fertilité chez les hommes. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection de brentuximab vedotin.

## Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

## quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

**L'injection de brentuximab vedotin peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :**

- constipation
- plaies buccales
- diminution de l'appétit
- perte de poids
- fatigue
- vertiges
- la faiblesse
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- anxiété
- peau sèche
- perte de cheveux
- sueurs nocturnes
- douleurs articulaires, osseuses, musculaires, dorsales, bras ou jambes
- spasmes musculaires

**Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :**

- saignements ou ecchymoses inhabituels
- engourdissement, brûlure ou picotement dans les mains, les bras, les pieds ou les jambes

- faiblesse musculaire
- peau qui pèle ou boursoufle
- urticaire
- éruption
- démangeaison
- nausée
- vomissement
- diarrhée
- toux ou essoufflement
- diminution de la miction
- enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
- miction difficile, douloureuse ou fréquente
- fièvre, frissons, toux ou autres signes d'infection
- douleur continue qui commence dans la région de l'estomac mais peut se propager au dos
- peau pâle
- jaunissement de la peau ou des yeux
- douleur ou inconfort dans la partie supérieure droite de l'estomac
- urine foncée
- selles de couleur argile
- Douleur d'estomac
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- selles noires et goudronneuses
- sang rouge dans les selles

L'injection de brentuximab vedotin peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

## n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

**Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :**

- fièvre, frissons, toux ou autres signes d'infection

**Quelles autres informations dois-je connaître ?**

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de brentuximab vedotin.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

**noms rands**

- Adcétris®

Dernière révision - 15/02/2019

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

---

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022