Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696037.html

سيدوفوفيرحقن

تنطقباسم (si dof 'o veer)

تحذيرهام:

يمكنأن يتسبب حقن سيدوفوفير في تلف الكلى. أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من مرض في الكلى. أخبر طبيبكإذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى قد تسبب تلف الكلى ، وبعضها يشمل أميكاسين ، أمفوتيريسين ب (أبيلسيت ،أمبيسوم) ، فوسكارنت (فوسكافير) ، جنتاميسين ، بنتاميدين (بنتام 300) ، توبراميسين ، فانكومايسين (فانكوسين) والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل إيبوبروفين (أدفيل ، موترين) ونابروكسين (نابروسين ، أليف). من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم استخدام حقن سيدوفوفير إذا كنت تتناول أو تستخدمواحداً أو أكثر من هذه الأدوية.

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الفحوصات المخبرية قبل وأثناء وبعد العلاج للتحقق منإستجابتك لحقن سيدوفوفير.

تسببحقن سيدوفوفير في حدوث عيوب خلقية ومشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية. لم يتم دراسة هذا الدواء على البشر ، ولكنمن الممكن أيضاً أن يسبب تشوهات خلقية عند الأطفال الذين تلقت أمهاتهم حقنة سيدوفوفير أثناء الحمل. يجب عدماستخدام حقن سيدوفوفير أثناء الحمل أو التخطيط للحمل ما لم يقرر طبيبك أن هذا هو أفضل علاج لحالتك.

تسببحقن سيدوفوفير في حدوث أورام في حيوانات المختبر.

تحدثإلى طبيبك حول المخاطر المحتملة لاستخدام حقن سيدوفوفير.

لماذاوصف هذا الدواء؟

يستخدمحقن سيدوفوفير مع دواء آخر (البروبينسيد) لعلاج التهاب الشبكية المضخم للخلايا (التهاب الشبكية المضخم للخلايا) فيالأشخاص المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). سيدوفوفير ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الفيروسات.وهو يعمل عن طريق إبطاء نمو الفيروس المضخم للخلايا.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيحقن سيدوفوفير كمحلول (سائل) يتم حقنه عن طريق الوريد (في الوريد) من قبل طبيب أو ممرضة في منشأة طبية. يعُطىعادة مرة كل أسبوعين. تعتمد مدة العلاج على استجابة جسمك للدواء.

يجبتناول أقراص البروبينسيد عن طريق الفم مع كل جرعة سيدوفوفير. خذ جرعة من البروبينسيد قبل 3 ساعات من تلقي حقن سيدوفوفيرومرة أخرى بعد 2 و 8 ساعات من اكتمال التسريب. تناول البروبينسيد مع الطعام لتقليل الغثيان واضطراب المعدة. اسألطبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية تناول هذه الأدوية معاً.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلاستخدام حقن سيدوفوفير ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من سيدوفوفير ، بروبينيسيد (بروبالان ، كول بروبينيسيد) ، الأدوية التيتحتوي على السلفا ، أي أدوية أخرى ، أو أي من المكونات في حقن سيدوفوفير. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التيتتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر الأدوية المذكورة في قسم "تحذير هام" وأي مما يلي: أسيتامينوفين؛ أسيكلوفير (زوفيراكس) ؛ مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل بينازيبريل (لوتنسين ، في لوتريل) ، كابتوبريل ، إنالابريل (فاسوتيك ، فاسيريتيك) ، فوسينوبريل ، ليسينوبريل (Qbrelis ، في برينزيد ، في زيستوريتيك) ؛ أسبرين؛ الباربيتورات مثل الفينوباربيتال. البنزوديازيبينات‌مثل لورازيبام (أتيفان) ؛ بوميتانيد (بوميكس) ؛ فاموتيدين (بيبسيد) ؛ فوروسيميد (لازيكس) ؛ ميثوتريكسات (أوتريكسوب ،راسوفو ، تريكسال) ؛ الثيوفيلين (إليكسوفيلين ، ثيو 24) ؛ وزيدوفودين (ريتروفير ، في كومبيفير).
- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاًأو تخططين للحمل. إذا كنت أنثى تستخدم حقن سيدوفوفير ، يجب عليك استخدام وسيلة فعالة لمنعالحمل أثناء تلقي سيدوفوفير ولمدة شهر بعد جرعتك النهائية. تحدث إلى طبيبك حول طرق تحديد النسل التي يمكنك استخدامهاأثناء وبعد العلاج. إذا كنت ذكراً تستخدم cidofovir ويمكن لشريكك أن يصبح حاملاً ، فيجب عليك استخدام طريقة الحاجز(الواقي الذكري أو الحجاب الحاجز مع مبيد النطاف) أثناء استخدام حقن cidofovir ولمدة 3 أشهر بعد الجرعة النهائية. إذاأصبحت أنت أو شريكك حاملاًأثناء تلقي سيدوفوفير ، فاتصل بطبيبك على الفور.
- أخبرطبيبك إذا كنت مرضعة. لا ترضع إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو الإيدز أو تستخدمسيدوفوفير.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب حقن سيدوفوفير آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- التقيؤ
- غثيان

- إسهال
- فقدانالشهية
- صداعالراس
- تساقطالشعر
- تقرحاتعلى الشفاه أو الفم أو الحلق

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- متسرع
- ألمأو احمرار في العين
- تغيراتفي الرؤية مثل الحساسية للضوء أو عدم وضوح الرؤية
- حمىأو قشعريرة أو سعال
- ضيقفي التنفس
- جلدشاحب

قديسبب حقن سيدوفوفير آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تلقي هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعانيمن صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظبجميع المواعيد مع طبيب العيون الخاص بك. يجب أن تجري فحوصاً منتظمة للعين أثناء علاجك بحقن سيدوفوفير.

اسألالصيدلي عن أي أسئلة لديك حول حقن سيدوفوفير.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- فيستيد®¶

¶ -هذا المنتج ذو العلامة التجارية لم يعد في السوق. قد تكون البدائل العامة متاحة.

آخرمراجعة - 15/11/2016

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.

الازدواجية .4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland ،

للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022