

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Injecție subcutanată cu interferon beta-1a

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604005.html>

## Interferon beta-1a injectabil subcutanat pronunțat ca (in ter feer' on)

### de ce este prescris acest medicament?

Injecția subcutanată cu interferon beta-1a este utilizată pentru a trata adulții cu diferite forme de scleroză multiplă (SM; o boală în care nervii nu funcționează corect și oamenii pot prezenta slăbiciune, amorțeală, pierderea coordonării musculare și probleme cu vederea, vorbirea, și controlul vezicii urinare), inclusiv:

- sindrom izolat clinic (CIS; episoade de simptome nervoase care durează cel puțin 24 de ore),
- forme recidivante-remisive (cursul bolii în care simptomele apar din când în când) sau
- forme secundar progresive (cursul bolii în care recidivele apar mai des).

Interferonul beta-1a face parte dintr-o clasă de medicamente numite imunomodulatori. Acționează prin scăderea inflamației și prevenirea leziunilor nervoase care pot provoca simptome de scleroză multiplă.

### cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția subcutanată de interferon beta-1a vine sub formă de soluție (lichid) într-o seringă preumplută sau într-un dispozitiv automat de injecție preumplut pentru injecție subcutanată (sub piele). De obicei, se injectează de trei ori pe săptămână. Ar trebui să injectați acest medicament în aceleași 3 zile în fiecare săptămână, de exemplu, în fiecare luni, miercuri și vineri. Injecțiile trebuie să fie distanțate la cel puțin 48 de ore, așa că cel mai bine este să vă injectați medicamentul în aproximativ aceeași oră a zilei în fiecare dintre zilele de injecție. Cel mai bun moment pentru a injecta acest medicament este după-amiaza târziu sau seara. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați interferon beta-1a exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de interferon beta-1a și vă poate crește treptat doza, nu mai mult de o dată la 2 săptămâni.

Interferonul beta-1a controlează simptomele SM, dar nu o vindecă. Continuați să utilizați interferon beta-1a chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați interferon beta-1a fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Veți primi prima doză de interferon beta-1a subcutanat în cabinetul medicului dumneavoastră. După aceea, puteți să vă injectați interferon beta-1a subcutanat sau să solicitați unui prieten sau rudă să efectueze injecțiile. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă arate dumneavoastră sau persoanei care vă va injecta medicamentul cum să îl injectați. Înainte de a utiliza interferon beta-1a subcutanat pentru prima dată, dumneavoastră sau persoana care va fi

administrarea injecțiilor ar trebui să citească, de asemenea, informațiile producătorului pentru pacientul care vine cu acesta. Urmați instrucțiunile cu atenție.

Utilizați o seringă preumplută nouă sau un dispozitiv automat de injectare preumplut de fiecare dată când vă injectați medicamentul. Nu reutilizați sau împărțiți seringile sau dispozitivele automate de injectare. Chiar dacă mai rămâne o soluție în seringă sau dispozitiv după injectare, nu mai injectați. Aruncați seringile uzate sau dispozitivele automate de injectare într-un recipient rezistent la perforare, care nu este la îndemâna copiilor. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cum să aruncați recipientul rezistent la perforare.

Priviți întotdeauna medicamentul din seringă preumplută sau dispozitivul de injectare automată înainte de a-l folosi. Ar trebui să fie o soluție limpede până la ușor galbenă. Dacă soluția este tulbure, decolorată sau conține particule sau dacă data de expirare marcată pe seringă sau pe dispozitivul de injectare automată a depășit, nu utilizați acea seringă sau dispozitiv.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre locul în care trebuie să vă injectați interferon beta-1a subcutanat. Puteți injecta interferon beta-1a în zone ale corpului cu un strat de grăsime între piele și mușchi, cum ar fi coapsa, suprafața exterioară a brațelor, stomacul sau fesele. Dacă sunteți foarte slab, injectați numai în coapsă sau pe suprafața exterioară a brațului pentru injecție. Alegeți un loc diferit de fiecare dată când vă injectați medicamentul. Păstrați o înregistrare a datei și a locului fiecărei injecții. Nu folosiți același loc de două ori la rând. Nu injectați în apropierea buricului (buric) sau a taliei sau într-o zonă în care pielea este dureroasă, roșie, învinețită, cicatrice, infectată sau anormală în vreun fel.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când începeți tratamentul cu interferon beta-1a injecție subcutanată și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

### **există utilizări pentru acest medicament**

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

## **ce precauții speciale ar trebui să urmez?**

### **Înainte de a utiliza interferon beta-1a,**

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la interferon beta-1a, la orice alte medicamente cu interferon (Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy), la orice alte medicamente sau albumină umană. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool; dacă aveți sau ați avut vreodată o boală autoimună (o boală în care organismul își atacă propriile celule; adresați-vă medicului dumneavoastră dacă nu sunteți sigur dacă aveți acest tip de boală); anemie (scăderea numărului de globule roșii) sau a numărului scăzut de celule albe din sânge; probleme de sânge, cum ar fi vânătăi ușoare sau sângerări; boli mintale, cum ar fi depresia, mai ales dacă aveți

te-ai gândit vreodată să te sinucizi sau ai încercat să o faci; convulsii; insuficiența cardiacă; sau boli ale inimii, rinichilor, ficatului sau tiroidei.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați interferon beta-1a subcutanat, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați interferon beta-1a subcutanat.
- întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce utilizați interferon beta-1a subcutanat. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale interferonului beta-1a.
- trebuie să știți că este posibil să aveți simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri de cap, febră, frisoane, transpirații, dureri musculare, dureri de spate și oboseală după injectare. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați un medicament pentru durere și febră fără prescripție medicală pentru a ajuta la aceste simptome. Aceste simptome de obicei se ameliorează sau dispar în timp. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aceste simptome sunt dificil de gestionat sau devin severe.

## ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Injectați doza omisă imediat ce vă amintiți. Dacă sunteți programat pentru o doză în ziua următoare, săriți peste acea doză. Nu injectați interferon beta-1a subcutanat 2 zile la rând. Nu injectați o doză dublă pentru a compensa doza omisă. Ar trebui să reveniți la programul de dozare obișnuit săptămâna următoare. Sunați-vă medicul dacă omiteți o doză și aveți întrebări despre ce să faceți.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

**Interferonul beta-1a subcutanat poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispăre:**

- durere de cap
- febră
- frisoane
- ochi uscați
- probleme de vedere
- gură uscată
- vânătăi, durere, roșeață, umflare sau sensibilitate la locul injectării

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:**

- depresie nouă sau agravată
- te gândești să te rănești sau să te sinucizi sau să plănuiești sau să încerci să faci asta
- anxietate
- urticarie

- eczemă
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- umflarea ochilor, feței, gurii, limbii, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- amețeli
- leșin
- convulsii
- pierderea coordonării
- oboseală extremă
- lipsa de energie
- greață
- vărsături
- pierderea poftei de mâncare
- scaune palide
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- urină închisă la culoare
- piele palida
- dureri în piept
- bătăi rapide ale inimii
- vânătăi sau sângerări neobișnuite
- durere în gât, tuse, febră, frisoane sau alte semne de infecție
- creștere sau pierdere în greutate inexplicabilă
- senzație de frig sau cald tot timpul
- înnegrirea pielii sau drenaj la locul injectării
- scaune roșii sau sângeroase sau diaree
- dureri de stomac
- vorbire lentă sau dificilă
- pete violete sau puncte punctiforme (erupții cutanate) pe piele
- scăderea urinării sau sânge în urină

Interferonul beta-1a poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la frigider, dar nu îl congelați. Dacă nu este disponibil un frigider, puteți păstra medicamentul la temperatura camerei departe de căldură și lumină timp de până la 30 de zile.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va prescrie anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția subcutanată cu interferon beta-1a.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Rebif®

Ultima revizuire - 15.10.2019

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022