



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Interferon Beta-1a Subcutaneous Injection

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604005.html>

Interferon Beta-1a Subcutaneous Injection

binibigkas bilang (sa ter feer' on)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang interferon beta-1a subcutaneous injection ay ginagamit upang gamutin ang mga nasa hustong gulang na may iba't ibang anyo ng multiple sclerosis (MS; isang sakit kung saan ang mga ugat ay hindi gumagana ng maayos at ang mga tao ay maaaring makaranas ng panghihina, pamamanhid, pagkawala ng koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, pagsasalita, at kontrol sa pantog) kasama ang:

- clinically isolated syndrome (CIS; nerve symptom episodes na tumatagal ng hindi bababa sa 24 na oras),
- relapsing-remitting forms (kurso ng sakit kung saan ang mga sintomas ay sumiklab paminsan-minsan), o
- pangalawang progresibong anyo (kurso ng sakit kung saan ang mga relapses ay nangyayari nang mas madalas).

Ang interferon beta-1a ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunomodulators. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga at pagpigil sa pinsala sa ugat na maaaring magdulot ng mga sintomas ng multiple sclerosis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang interferon beta-1a subcutaneous injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) sa isang prefilled syringe o isang prefilled na awtomatikong injection device upang mag-iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat). Ito ay karaniwang iniksyon ng tatlong beses sa isang linggo. Dapat mong iturok ang gamot na ito sa parehong 3 araw bawat linggo, halimbawa, tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Ang mga iniksyon ay dapat na may pagitan ng hindi bababa sa 48 oras, kaya pinakamahusay na iturok ang iyong gamot sa parehong oras ng araw sa bawat araw ng iyong pag-iniksyon. Ang pinakamainam na oras para mag-inject ng gamot na ito ay sa hapon o gabi. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng interferon beta-1a nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa mababang dosis ng interferon beta-1a at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi hihigit sa isang beses bawat 2 linggo.

Kinokontrol ng Interferon beta-1a ang mga sintomas ng MS ngunit hindi ito ginagamot. Patuloy na gumamit ng interferon beta-1a kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa paggamit ng interferon beta-1a nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Matatanggap mo ang iyong unang dosis ng interferon beta-1a subcutaneous sa opisina ng iyong doktor. Pagkatapos nito, maaari kang mag-iniksyon ng interferon beta-1a subcutaneous sa iyong sarili o magkaroon ng isang kaibigan o kamag-anak na magsagawa ng mga iniksyon. Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo o sa taong mag-iiniksyon ng gamot kung paano ito iturok. Bago mo gamitin ang interferon beta-1a subcutaneous sa unang pagkakataon, ikaw o ang taong magiging

Ang pagbibigay ng mga iniksyon ay dapat ding basahin ang impormasyon ng tagagawa para sa pasyenteng kasama nito. Maingat na sundin ang mga direksyon.

Gumamit ng bagong prefilled syringe o prefilled na automatic injection device sa tuwing mag-iiniksyon ka ng iyong gamot. Huwag muling gumamit o magbahagi ng mga hiringgilya o awtomatikong pag-iniksyon ng mga aparato. Kahit na may natitira pang solusyon sa syringe o device pagkatapos mong mag-inject, huwag nang mag-inject muli. Itapon ang mga ginamit na syringe o awtomatikong mga aparato sa pag-iniksyon sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas na hindi maabot ng mga bata. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa pagbutas.

Palaging tingnan ang gamot sa iyong prefilled syringe o automatic injection device bago mo ito gamitin. Dapat itong malinaw hanggang bahagyang dilaw na solusyon. Kung ang solusyon ay maulap, kupas ang kulay, o naglalaman ng mga particle o kung ang expiration date na minarkahan sa syringe o awtomatikong injection device ay lumipas na, huwag gamitin ang syringe o device na iyon.

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung saan sa iyong katawan dapat kang mag-iniksyon ng interferon beta-1a subcutaneous. Maaari kang mag-iniksyon ng interferon beta-1a sa mga bahagi ng iyong katawan na may isang layer ng taba sa pagitan ng balat at kalamnan, tulad ng iyong hita, panlabas na ibabaw ng iyong itaas na braso, iyong tiyan, o iyong puwit. Kung ikaw ay napakapayat, mag-iniksyon lamang sa iyong hita o sa panlabas na ibabaw ng iyong braso para sa iniksyon. Pumili ng ibang lugar sa tuwing mag-iiniksyon ka ng iyong gamot. Panatilihin ang isang talaan ng petsa at lugar ng bawat iniksyon. Huwag gamitin ang parehong lugar nang dalawang beses sa isang hilera. Huwag mag-iniksyon malapit sa iyong pusod (pusod ng tiyan) o baywang o sa isang lugar kung saan ang balat ay masakit, pula, bugbog, may galos, nahawahan, o abnormal sa anumang paraan.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag sinimulan mo ang paggamot na may interferon beta-1a subcutaneous injection at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang interferon beta-1a,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa interferon beta-1a, anumang iba pang mga interferon na gamot (Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy), anumang iba pang mga gamot, o albumin ng tao. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom mo. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom na ng maraming alak; kung mayroon ka o nagkaroon na ng autoimmune disease (isang sakit kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga selula; tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung mayroon kang ganitong uri ng sakit); anemia (mababang pulang selula ng dugo) o mababang puting selula ng dugo; mga problema sa dugo tulad ng madaling pasa o pagdurugo; sakit sa pag-iisip tulad ng depresyon, lalo na kung mayroon ka

kailanman naisip na patayin ang iyong sarili o sinubukang gawin ito; mga seizure; heart failure; o sakit sa puso, bato, atay, o thyroid.

- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng interferon beta-1a subcutaneous, tawagan kaagad ang iyong doktor.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na gumagamit ka ng interferon beta-1a subcutaneous.
- tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming may alkohol habang gumagamit ka ng interferon beta-1a subcutaneous. Ang alkohol ay maaaring magpalala sa mga side effect ng interferon beta-1a.
- dapat mong malaman na maaari kang magkaroon ng mga sintomas tulad ng trangkaso tulad ng pananakit ng ulo, lagnat, panginig, pagpapawis, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, at pagkapagod pagkatapos ng iyong iniksyon. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng over-the-counter na gamot sa sakit at lagnat upang makatulong sa mga sintomas na ito. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang bumubuti o nawawala sa paglipas ng panahon. Makipag-usap sa iyong doktor kung ang mga sintomas na ito ay mahirap pangasiwaan o maging malubha.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Iturok ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Kung naka-iskedyul ka para sa isang dosis sa susunod na araw, laktawan ang dosis na iyon. Huwag mag-iniksyon ng interferon beta-1a subcutaneous 2 araw nang sunud-sunod. Huwag mag-iniksyon ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na dosis. Dapat kang bumalik sa iyong regular na iskedyul ng dosing sa susunod na linggo. Tawagan ang iyong doktor kung napalampas mo ang isang dosis at may mga tanong tungkol sa kung ano ang gagawin.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang interferon beta-1a subcutaneous ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- sakit ng ulo
- lagnat
- panginig
- tuyong mata
- mga problema sa paningin
- tuyong bibig
- pasa, pananakit, pamumula, pamamaga, o pananakit sa lugar ng iniksyon

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

- bago o lumalalang depresyon
- pag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpapalano o pagsisikap na gawin ito
- pagkabalisa
- mga pantal

- pantal
- nangangati
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- pamamaga ng mga mata, mukha, bibig, dila, lalamunan, kamay, braso, paa, bukung-bukong, o ibabang binti
- pagkahilo
- nanghihina
- mga seizure
- pagkawala ng koordinasyon
- matinding pagod
- kakulangan ng enerhiya
- pagduduwal
- pagsusuka
- walang gana kumain
- maputlang dumi
- sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan
- paninilaw ng balat o mata
- maitim na ihi
- maputlang balat
- pananakit ng dibdib
- mabilis na tibok ng puso
- hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo
- namamagang lalamunan, ubo, lagnat, pangginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon
- hindi maipaliwanag na pagtaas o pagbaba ng timbang
- pakiramdam malamig o mainit sa lahat ng oras
- pag-itim ng balat o pagpapatuyo sa lugar ng iniksyon
- pula o madugong dumi o pagtatae
- sakit sa tyan
- mabagal o mahirap na pagsasalita
- purple patch o pinpoint na tuldok (pantal) sa balat
- nabawasan ang pag-ihing dugo sa ihi

Ang interferon beta-1a ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa refrigerator, ngunit huwag i-freeze ito. Kung walang refrigerator, maaari mong iimbak ang gamot sa temperatura ng silid na malayo sa init at liwanag nang hanggang 30 araw.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa interferon beta-1a subcutaneous injection.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Rebif®

Huling Binago - 10/15/2019

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022