



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Inyección de interferón beta-1b

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601151.html>

Inyección de interferón beta-1b pronunciado como (en" ter feer' on bay' ta wun bee)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de interferón beta-1b se usa para reducir los episodios de síntomas en pacientes con recaídas y remisiones (curso de la enfermedad en el que los síntomas reaparecen de vez en cuando) de esclerosis múltiple (EM, una enfermedad en la que los nervios no funcionan correctamente y los pacientes pueden experimentar debilidad, entumecimiento, pérdida de la coordinación muscular y problemas con la visión, el habla y el control de la vejiga). El interferón beta-1b pertenece a una clase de medicamentos llamados inmunomoduladores. No se sabe exactamente cómo funciona el interferón beta-1b para tratar la EM.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de interferón beta-1b viene en forma de polvo para mezclar con líquido e inyectar por vía subcutánea (justo debajo de la piel). Por lo general, se inyecta cada dos días. Inyecte la inyección de interferón beta-1b aproximadamente a la misma hora del día cada vez que se la inyecte. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Use la inyección de interferón beta-1b exactamente como se indica. No inyecte más o menos cantidad ni lo inyecte con más frecuencia de lo recetado por su médico. Su médico probablemente comenzará con una dosis baja de la inyección de interferón beta-1b y la aumentará gradualmente.

Recibirá su primera dosis de interferón beta-1b en el consultorio de su médico. Después de eso, puede inyectarse interferón beta-1b usted mismo o hacer que un amigo o familiar realice las inyecciones. Antes de usar interferón beta-1b usted mismo por primera vez, lea las instrucciones escritas que vienen con él. Pídale a su médico o farmacéutico que le muestre a usted o a la persona que le inyectará el medicamento cómo hacerlo.

Nunca reutilice ni comparta jeringas, agujas o viales de medicamentos. Deseche las agujas y jeringas usadas en un recipiente resistente a pinchazos y deseche los frascos de medicamentos usados en la basura. Hable con su médico o farmacéutico acerca de cómo desechar el recipiente resistente a perforaciones.

Solo debe mezclar un vial de interferón beta-1b a la vez. Lo mejor es mezclar el medicamento justo antes de que planea inyectarlo. Sin embargo, puede mezclar el medicamento con anticipación, guardarlo en el refrigerador y usarlo dentro de las 3 horas.

Puede inyectarse interferón beta-1b en cualquier parte del abdomen, las nalgas, la parte posterior de los brazos o los muslos, excepto el área cerca del ombligo y la cintura. Si eres muy delgado, solo inyéctate

en su muslo o en la superficie externa de su brazo. Consulte el diagrama en la información del paciente del fabricante para conocer los lugares exactos en los que puede inyectarse. Elija un lugar diferente cada vez que inyecte su medicamento. No inyecte su medicamento en la piel que esté irritada, magullada, enrojecida, infectada o con cicatrices.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience el tratamiento con interferón beta-1b y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de interferón beta-1b,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de interferón beta-1b, a otros medicamentos con interferón beta (Avonex, Plegridy, Rebif), a cualquier otro medicamento, a la albúmina humana, al manitol o a cualquiera de los demás ingredientes de la inyección de interferón beta-1b. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la Guía del medicamento para obtener una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- Informe a su médico si bebe o ha bebido grandes cantidades de alcohol, si tiene o ha tenido anemia (bajos niveles de glóbulos rojos) o bajos de glóbulos blancos, problemas sanguíneos como sangrado o aparición de hematomas con facilidad, convulsiones, enfermedades mentales como depresión, especialmente si alguna vez ha pensado en suicidarse o ha intentado hacerlo, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca o hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de interferón beta-1b, llame a su médico.
- pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras recibe la inyección de interferón beta-1b. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios del interferón beta-1b.
- debe saber que puede tener síntomas similares a los de la gripe, como dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, sudoración, dolores musculares y cansancio después de la inyección. Su médico puede indicarle que tome un medicamento de venta libre para el dolor y la fiebre para ayudarlo con estos síntomas. Hable con su médico si estos síntomas son difíciles de manejar o se vuelven severos.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de la inyección de interferón beta-1b, inyéctese la próxima dosis tan pronto como lo recuerde o pueda administrarla. Su próxima inyección debe administrarse aproximadamente 48 horas (2 días) después de esa dosis. No use la inyección de interferón beta-1b dos días seguidos. No inyecte una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Llame a su médico si olvida una dosis y tiene preguntas sobre qué hacer.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de interferón beta-1b puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de cabeza
- sangrado vaginal o manchado entre períodos menstruales
- músculos tensos
- debilidad
- cambios en el deseo o la capacidad sexual (en los hombres)
- cambio en la coordinación

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o cualquiera de los síntomas enumerados en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- hematomas, dolor, enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el lugar de la inyección
- ennegrecimiento de la piel o drenaje en el lugar de la inyección
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- orina oscura
- cansancio extremo
- taburete pálido
- náuseas
- vómitos
- pérdida de apetito
- hematomas o sangrado inusuales
- confusión
- irritabilidad
- nerviosismo
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- pensando en lastimarse o suicidarse o planeando o tratando de hacerlo
- ansiedad
- depresión nueva o que empeora
- comportamiento agresivo o violento
- ver cosas o escuchar voces que no existen
- actuando sin pensar
- convulsiones

- dificultad para respirar
- latidos cardíacos rápidos o anormales
- dolor u opresión en el pecho
- piel pálida
- aumento de la frecuencia urinaria, especialmente por la noche
- erupción
- urticaria
- Comezón
- hinchazón de los ojos, la cara, la boca, la lengua, la garganta, las manos, los brazos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- dificultad para respirar o tragar
- heces rojas o con sangre o diarrea
- dolor de estómago
- habla lenta o difícil
- parches morados o puntos puntiformes (sarpullido) en la piel
- disminución de la micción o sangre en la orina

La inyección de interferón beta-1b puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras recibe este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde los viales de interferón beta-1b en polvo a temperatura ambiente y lejos del calor y la humedad excesivos (no en el baño). Si es necesario, los viales que contienen la solución preparada de interferón beta-1b se pueden almacenar en el refrigerador hasta 3 horas después de mezclarlos. No congele el interferón beta-1b.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y

los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de interferón beta-1b.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Betaseron®
- Extavía®

Última revisión - 15/06/2016

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022