Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html

ลูราซิโดน

ออกเสียงว่า (loo ras' ฉันทำ)

คำเตือนที่สำคัญ:

คำเตือนที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจำ คิดให้ชัดเจน สื่อสารและทำกิจกรรมประจำวัน และอาจทำให้อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ที่ใช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษาโรคจิต) เช่น ลูราซิโดน มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบระหว่างการรักษาด้วยยารักษาโรคจิตมากขึ้น

Lurasidone ไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สำหรับการรักษาความผิดปกติของพฤติกรรมในผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้หากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่คุณดูแลมีภาวะสมองเสื่อมและกำลังใช้ยาลูราซิโดน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

คำเตือนที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จำนวนน้อย (อายุไม่เกิน 24 ปี) ที่ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าในระหว่างการศึกษาทางคลินิกกลายเป็นคนฆ่าตัวตาย (คิดเกี่ยวกับการทำร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น) เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวที่ไม่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงนี้เป็นอย่างไร และควรพิจารณามากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจว่าเด็กหรือวัยรุ่นควรใช้ยากล่อมประสาทหรือไม่ โดยปกติแล้ว เด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปีไม่ควรทานลูราซิโดนเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า แต่ในบางกรณี แพทย์อาจตัดสินใจว่า ลูราซิโดนเป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาสภาพของเด็ก

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้ลูราซิโดนเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 24 ปีก็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและทุกครั้งที่เพิ่มหรือลดขนาดยา คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดที่จะทำร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; การโจมตีเสียขวัญ; นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทำโดยไม่คิด;

กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง และความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยๆ ในขณะที่คุณทานลูราซิโดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทย์ทุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สำนักงาน

ก่อนที่คุณจะใช้ยากล่อมประสาท คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาสภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือการรักษาอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของการไม่รักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะฆ่าตัวตายได้อย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณ์ที่เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นอย่างผิดปกติ) หรือคลุ้มคลั่ง หรือเคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคลและของครอบครัว คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กำหนด?

Lurasidone ใช้เพื่อรักษาอาการของโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทำให้เกิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจในชีวิต และอารมณ์รุนแรงหรือไม่เหมาะสม) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปที่มีโรคอารมณ์สองขั้ว (โรคซึมเศร้าคลั่งไคล้ โรคที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตอนของความบ้าคลั่ง และอารมณ์ผิดปกติอื่นๆ) Lurasidone ยังใช้ร่วมกับลิเธียม (Lithobid) หรือ valproate (Depacon) เพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสองขั้ว Lurasidone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทำงานโดยเปลี่ยนกิจกรรมของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Lurasidone มาเป็นแท็บเล็ตเพื่อรับประทานทางปาก โดยปกติแล้วจะรับประทานพร้อมกับอาหาร (อย่างน้อย 350 แคลอรี่) วันละครั้ง รับประทานลูราซิโดนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ลูราซิโดนตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

Lurasidone ควบคุมโรคจิตเภทและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรคสองขั้ว แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของลูราซิโดนอย่างเต็มที่ ทานลูราซิโดนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานลูราซิโดนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลูราซิโดน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาลูราซิโดน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดลูราซิโดน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังใช้ carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); คีโตโคนาโซล; มิเบฟราดิล; ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์); สาโทเซนต์จอห์น; หรือโวริโคนาโซล (Vfend) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานลูราซิโดนหากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใช่ใบสั่งยา อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาท; ยาแก้แพ้; atazanavir (Reyataz); bosentan (Tracleer); diltiazem (Cardizem, Cartia, Taztia, Tiazac, อื่น ๆ); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); อีริโทรมัยซิน (EES, E-Mycin, Ery-Tab, อื่นๆ); etravirine (สติปัญญา); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลูแคน); อินดินาเวียร์ (Crixivan); ipratropium (Atrovent ใน Combivent ใน Duoneb); ไอทราโคนาโซล (Sporanox); ยาเพื่อควบคุมความวิตกกังวล ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ยารักษาโรคต้อหิน, โรคลำไส้อักเสบ, อาการเมารถ, myasthenia gravis, โรคพาร์กินสัน, แผลพุพองหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; โมดาฟินิล (โพรวิจิล); แนฟซิลลิน; เนฟาโซโดน; เนลฟินาเวียร์ (วิราเซปต์); ฟีโนบาร์บิทัล; pioglitazone (Actos ใน Duetact ใน Actoplus Met); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); หรือ verapamil (Calan, Verelan, อื่น ๆ ใน Tarka); ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับลูราซิโดน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณใช้หรือเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มินิสโตรก (TIA); อาการเจ็บหน้าอก โรคหัวใจ หรืออาการหัวใจวาย การเต้นของหัวใจผิดปกติ หัวใจล้มเหลว; โรคพาร์กินสัน (ความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว); โรคอัลไซเมอร์ (โรคทางสมองที่ค่อยๆ ทำลายความจำและความสามารถในการคิด เรียนรู้ สื่อสาร และจัดการกับกิจกรรมประจำวัน); อาการชัก; ภาวะสมองเสื่อม; โรคมะเร็งเต้านม; ปัญหาในการรักษาสมดุลของคุณ เงื่อนไขใด ๆ ที่ทำให้คุณกลืนลำบาก ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ ระดับโปรแลคตินสูง ระดับไขมันสูง (คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) ในเลือดของคุณ จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ โรคไต; โรคตับ; น้ำตาลในเลือดสูง หรือถ้าคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงรุนแรง หรือมีอาการขาดน้ำในขณะนี้ หรือหากคุณมีอาการเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษา แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยต้องหยุดใช้ยารักษาอาการป่วยทางจิตเนื่องจากผลข้างเคียงที่รุนแรง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานลูราซิโดน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Lurasidone อาจทำให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากใช้ในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์
- หากคุณกำลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาลูราซิโดน
- คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทำให้คุณง่วง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรอันตรายจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
- คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (น้ำตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเภท และการใช้ยาลูราซิโดนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงนี้ได้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ทานลูราซิโดน: กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสำคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีที่คุณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดภาวะร้ายแรงที่เรียกว่ากรดคีโต (ketoacidosis)

Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลำบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ และสติลดลง

- คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นี่เป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ลูราซิโดนเป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

- คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทำให้ร่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด แจ้งแพทย์หากคุณวางแผนที่จะออกกำลังกายหรือต้องเผชิญกับความร้อนจัด
- คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบน้ำหนักของคุณเป็นระยะ ๆ ในขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

อย่ากินส้มโอจำนวนมากหรือดื่มน้ำเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

รับประทานอาหารที่ไม่ได้รับ (อย่างน้อย 350 แคลอรี่) ทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

ลูราซิโดนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล
- ความวิตกกังวล
- ความอ่อนแอ
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- กระสับกระส่าย
- ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้
- การเคลื่อนไหวช้าหรือเดินสับเปลี่ยน
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ความอยากอาหารเปลี่ยนไป
- น้ำลายเพิ่มขึ้น
- เต้านมขยายหรือหลั่ง
- ประจำเดือนมาช้าหรือมาไม่ทัน
- สมรรถภาพทางเพศลดลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- อาการชัก
- อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
- เสียงแหบ
- กลืนหรือหายใจลำบาก
- หายใจถี่
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- เจ็บคอ มีไข้ ไอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ
- มีไข้ เหงื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ และกล้ามเนื้อตึงอย่างรุนแรง
- การเคลื่อนไหวผิดปกติของใบหน้าหรือร่างกายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้
- ล้ม

ลูราซิโดนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อลูราซิโดน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- Latuda®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022