Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611004.html

トシリズマブ注射

（toe'' si liz'oo mab）と発音されます

知らせ：

トシリズマブ注射は、現在、コロナウイルス病2019（COVID-19）の治療のために、酸素補給、人工呼吸器、または体外式膜型人工肺（ECMO;血液に酸素を追加する装置）を必要とする人々のコルチコステロイドと組み合わせて研究されています。 。FDAは、COVID-19感染症で入院している2歳以上の特定の成人および子供を治療するためのトシリズマブ注射の配布を許可する緊急使用許可（EUA）を承認しました。

重要な警告：

トシリズマブ注射を使用すると、細菌、ウイルス、真菌による感染と戦う能力が低下し、体全体に広がる可能性のある深刻なまたは生命を脅かす感染症にかかるリスクが高まります。何らかの種類の感染症が頻繁に発生する場合、または現在何らかの種類の感染症にかかっている、または感染している可能性があると思われる場合は、医師に相談してください。これには、軽度の感染症（口唇ヘルペスなど）、出入りする感染症（口唇ヘルペスなど）、および消えない進行中の感染症が含まれます。また、糖尿病、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、または免疫系に影響を与える状態があったかどうか、また、オハイオ川やミシシッピ川の谷などの地域に住んでいたか、住んだことがあるか、旅行したことがあるかどうかを医師に伝えてください南西部では、重度の真菌感染症がより一般的です。これらの感染症があなたの地域で一般的であるかどうかわからない場合は、医師に相談してください。また、服用している場合は医師に伝えてください：abatacept（Orencia）; アダリムマブ（フミラ）; アナキンラ（キネレット）; セルトリズマブ（Cimzia）; エタネルセプト（エンブレル）; ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ（レミケード）; アザチオプリン（Azasan、Imuran）、シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、メトトレキサート（Otrexup、Trexall、その他）、シロリムス（Rapamune）、タクロリムス（Prograf）などの免疫系を抑制する薬。デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン、プレドニゾン（Rayos）などの経口ステロイド。またはリツキシマブ（リツキサン）。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。寒気; 発汗; 呼吸困難; 喉の痛み; 咳; 減量; 下痢; 胃痛; 痰の血; 極度の倦怠感; 筋肉痛; 暖かい、赤い、または痛みを伴う皮膚; 皮膚または口の痛み; あなたが排尿するときに燃える; 頻尿; または他の感染の兆候。

結核（TB;肺感染症の一種）またはB型肝炎（肝疾患の一種）に感染している可能性がありますが、この病気の症状はありません。この場合、トシリズマブ注射は、感染がより深刻になり、症状が現れるリスクを高める可能性があります。医師は、結核に感染していないかどうかを確認するために皮膚検査を行い、B型肝炎に感染していないかどうかを確認するために血液検査を命じることがあります。必要に応じて、トシリズマブ注射の使用を開始する前に、医師がこの感染症を治療するための薬を投与します。結核またはB型肝炎を患っている、または患ったことがあるか、結核が一般的な国を訪れたことがあるか、結核を患っている人の周りにいたかどうかを医師に伝えてください。結核の次の症状のいずれかがある場合、または治療中にこれらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：咳、胸痛、血や粘液の咳、脱力感や疲労感、体重減少、食欲不振、悪寒、発熱、寝汗。また、B型肝炎のこれらの症状のいずれかがある場合、または治療中または治療後にこれらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：過度の疲労、皮膚または目の黄変、食欲不振、吐き気、嘔吐、筋肉痛、暗色尿、粘土色の腸の動き、発熱、寒気、胃の痛み、または発疹。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はあなたが深刻な感染症を発症していないことを確認するためにあなたの健康を注意深く監視します。医師は、トシリズマブ注射に対する体の反応を確認するために、治療前および治療中に特定のラボテストを注文します。

トシリズマブ注射による治療を開始するとき、および投薬を受けるたびに、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。食品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを入手してください。

トシリズマブ注射を使用するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処方されているのですか？

トシリズマブ注射は、特定の種類の関節炎の症状や次のような他の症状を緩和するために、単独で、または他の薬剤と組み合わせて使用 されます。

- 他の疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD）の助けを借りていない成人の関節リウマチ（体が自身の関節を攻撃し、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす状態）、
- 成人の巨細胞性動脈炎（特に頭皮と頭の血管の腫れを引き起こす状態）、
- 成人における全身性硬化症関連間質性肺疾患（SSc-ILD;強皮症関連ILDとしても知られる：肺の瘢痕化を伴う肺疾患）、
- 2歳以上の小児における多関節若年性特発性関節炎（PJIA;状態の最初の6か月間に5つ以上の関節に影響を及ぼし、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす小児関節炎の一種）。

- 全身性若年性特発性関節炎（SJIA;体のさまざまな領域で炎症を引き起こし、発熱、関節の痛みと腫れ、機能の喪失、成長と発達の遅延を引き起こす子供の状態）2歳以上の子供、

- 特定の免疫療法の注入を受けた後の2歳以上の成人および子供におけるサイトカイン放出症候群（重度で生命を脅かす可能性のある反応）。

トシリズマブ注射は、インターロイキン-6（IL-6）受容体阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。これは、炎症を引き起こす体内の物質であるインターロイキン-6の活性をブロックすることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

トシリズマブ注射は、診療所や病院の外来診療所の医師や看護師が約1時間以上静脈内（静脈内）に注射する溶液（液体）として、または皮下（皮膚のすぐ下）に注射するためのプレフィルドシリンジとして提供されます。家にいる自分。

関節リウマチを治療するためにトシリズマブを投与する場合、通常、4週間に1回静脈内投与するか、毎週または隔週に皮下投与します。

巨細胞性動脈炎を治療するためにトシリズマブを投与する場合、通常、毎週または隔週に1回皮下投与します。

全身性硬化症に関連する間質性肺疾患を治療するためにトシリズマブが投与される場合、通常、週に1回皮下投与されます。

トシリズマブを多関節若年性特発性関節炎の治療に投与する場合、通常、4週間に1回静脈内投与するか、2、3週間に1回皮下投与します。

トシリズマブを全身性若年性特発性関節炎の治療に投与する場合、通常、静脈内投与は2週間に1回、皮下投与は1週間に1回、または2週間に1回です。

サイトカイン放出症候群を治療するためにトシリズマブを静脈内投与する場合、通常は1回投与しますが、少なくとも8時間間隔で最大3回の追加投与を行うことができます。

トシリズマブの最初の皮下注射は、診療所で行われます。自宅でトシリズマブを自分で皮下注射する場合や、友人や親戚に薬を注射してもらう場合は、医師があなたや薬を注射する人に注射方法を教えてくれます。あなたと薬を注射する人は、薬に付属している使用説明書も読む必要があります。

トシリズマブ注射の準備が整う30分前に、冷蔵庫から薬を取り出し、カートンから取り出し、室温に戻す必要があります。プレフィルドシリンジをボックスから取り出すときは、シリンジの人差し指に触れないように注意してください。電子レンジで加熱したり、温水に入れたり、その他の方法で薬を温めようとしないでください。

薬剤が温まっている間は、プレフィルドシリンジからキャップを取り外さないでください。薬を注射する前に、5分以内にキャップを外してください。取り外した後は、キャップを交換しないでください。

注射器を床に落とした場合は使用しないでください。

プレフィルドシリンジをチェックして、パッケージに印刷されている有効期限が過ぎていないことを確認します。カバー付きの針を下に向けてシリンジを持ち、シリンジ内の液体を注意深く観察します。液体は透明または淡黄色である必要があり、曇ったり変色したり、しこりや粒子が含まれていてはなりません。パッケージや注射器に問題があり、薬を注射しない場合は、薬剤師に連絡してください。

トシリズマブ注射は、おへそ（へそ）とその周囲2インチを除いて、太ももの前または胃のどこにでも注射できます。他の人があなたの薬を注射している場合は、上腕の外側の領域も使用される可能性があります。柔らかい、傷ついた、赤い、硬い、または無傷ではない、または傷跡、ほくろ、または傷がある皮膚に薬を注射しないでください。薬を注射するたびに、以前に使用した場所から少なくとも1インチ離れた別の場所を選択してください。全量が注入されていない場合は、医師または薬剤師に連絡してください。

トシリズマブのプレフィルドシリンジを再利用したり、使用後にシリンジのキャップを付け直したりしないでください。使用済みの注射器は耐パンク性の容器に入れて廃棄し、薬剤師に容器の廃棄方法を尋ねてください。

トシリズマブ注射はあなたの症状をコントロールするのに役立つかもしれませんが、それはあなたの状態を治すことはありません。あなたの医者はあなたを注意深く見守り、トシリズマブ注射があなたにとってどれほどうまくいくかを見ます。検査結果に特定の変化がある場合は、医師が投与量を調整したり、治療を遅らせたりすることがあります。治療中にどのように感じているかを医師に伝えることが重要です。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

トシリズマブ注射を受ける前に、

- トシリズマブ、他の薬、またはトシリズマブ注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬と、次のいずれかに必ず言及してください。ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「抗凝血剤」）。アスピリンおよびイブプロフェン（アドビル、モトリンなど）やナプロキセン（アリーブ、ナプロシンなど）などの他の非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）。アトルバスタチン（Lipitor、Caduet）、ロバスタチン（Altoprev、Advicor）、シンバスタチン（Zocor、Vytorin）などのコレステロール低下薬（スタチン）。経口避妊薬（避妊薬）; またはテオフィリン（Elixophyllin、Theo-24、その他）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- あなたが癌を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。憩室炎（炎症を起こす可能性のある大腸の内壁にある小さな袋）; 胃や腸の潰瘍; 高コレステロールおよびトリグリセリド; 多発性硬化症（MS;神経が適切に機能せず、衰弱、しびれ、喪失を経験する可能性のある病気）などの神経系に影響を与える状態

筋肉協調および視力、発話、膀胱制御の問題）または慢性炎症性脱髄性多発神経障害（CIDP;免疫系および神経系の障害）; または肝疾患。

- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。トシリズマブ注射を受けている間に妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、トシリズマブ注射を受けていることを医師または歯科医に伝えてください。
- トシリズマブ注射による治療を開始する前に、予防接種を受けるべきかどうか医師に相談してください。可能であれば、子供のためのすべての予防接種は、治療を開始する前に最新のものにする必要があります。医師に相談せずに、治療中に予防接種を受けないでください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

トシリズマブの点滴を受ける予定を逃した場合は、医師に連絡してください。

トシリズマブの皮下注射を忘れた場合は、忘れた分を覚えたらすぐに注射してください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。逃したものを補うために2回分を注入しないでください。トシリズマブ注射をいつ注射するかわからない場合は、医師または薬剤師に連絡してください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

トシリズマブ注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 頭痛
- 鼻水またはくしゃみ
- トシリズマブが注射された場所の発赤、かゆみ、痛み、または腫れ

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 発疹
- フラッシング
- じんましん
- かゆみ
- 目、顔、唇、舌、喉、腕、手、足、足首、または下肢の腫れ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 胸痛

- めまいや失神
- 発熱、進行中の腹痛、または排便習慣の変化
- 黄色い目または皮膚; 右上腹部痛; 原因不明のあざや出血; 食欲減少; 錯乱; 黄色または茶色の尿; または淡いスツール

トシリズマブは、特定の種類のがんを発症するリスクを高める可能性があります。この薬を服用するリスクについて医師に相談してください。

トシリズマブ注射は他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は、入ったパッケージに入れて、光を避け、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。トシリズマブ注射液は冷蔵庫に保管しますが、冷凍しないでください。プレフィルドシリンジは乾いた状態に保ちます。古くなった、または不要になった薬はすべて廃棄してください。あなたの薬の適切な処分についてあなたの薬剤師に相談してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

トシリズマブ注射について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

他の人にあなたの薬を使わせないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- アクテムラ®

最終改訂日-2021年7月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日