Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617008.html

Ribociclib

pronuntat ca (secara'' boe sye' klib)

de ce este prescris acest medicament?

Ribociclib este utilizat în combinație cu un alt medicament pentru a trata un anumit tip de receptor hormonal pozitiv (depinde de hormoni, cum ar fi estrogenul pentru a crește) cancerul de sân avansat sau care s-a răspândit în alte părți ale corpului la femeile care nu au experimentat menopauză (schimbarea vieții). ; sfârşitul perioadelor menstruale lunare) şi la cei care sunt aproape sau care au experimentat deja menopauză. Ribociclib este, de asemenea, utilizat în combinație cu fulvestrant (Faslodex) pentru a trata un anumit tip de cancer de sân avansat cu receptori hormonali pozitiv sau care s-a răspândit în alte părți ale corpului ca tratament inițial sau la persoanele care nu au fost tratate cu succes cu alte tratamente. la femeile care au experimentat deja menopauza. Ribociclib face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de kinază. Funcționează prin blocarea acțiunii unei proteine anormale care semnalează multiplicarea celulelor canceroase. Acest lucru ajută la încetinirea sau oprirea răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ribociclib se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi, dimineața, în primele 21 de zile ale unui ciclu de 28 de zile. Luați ribociclib aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați ribociclib exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Nu luați comprimate care sunt sparte sau zdrobite.

Dacă vărsați după ce ați luat ribociclib, nu luați altă doză. Continuați programul obișnuit de dozare.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de ribociclib sau vă poate opri permanent sau temporar tratamentul. Acest lucru depinde de cât de bine funcționează medicamentul pentru dumneavoastră și de efectele secundare pe care le experimentați. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu ribociclib.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua ribociclib,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ribociclib, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de ribociclib. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: amiodarona (Nexterone, Pacerone); anumite antibiotice, cum ar fi claritromicină (Biaxin, în Prevpac), eritromicina (EES, Ery-tab, Eryped) și moxifloxacin (Avelox); anumite medicamente antifungice, cum ar fi itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) și voriconazol (Vfend); bepridil (nu mai este disponibil în SUA); boceprevir (Victrelis, nu mai este disponibil în SUA); clorochină (Aralen); conivaptan; ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dihidroergotamina (DHE 45, Migranal); disopiramidă (Norpace); ergotamina (Ergomar, în Cafergot, în Migergot); everolimus (Afinitor, Zortress); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis); halofantrină (Halfan; nu mai este disponibil în SUA); haloperidol (Haldol); anumite medicamente pentru virusul imunodeficienței umane (HIV), cum ar fi efavirenz (Sustiva, în Atripla), indinavir (Crixivan), lopinavir (în Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Teril, altele) și fenitoina (Dilantin, Phenytek); metadonă (dolofină, metadoză); nefazodonă; ondansetron (intravenos); pimozidă (Orap); procainamidă; chinidină (în Nuedexta); rifampin (Rimactane, Rifadin, în Rifamate, în Rifater); sirolimus (Rapamune); sotalol (Betapace, Sotylize); tacrolimus (Envarsus XR, Prograf) și tamoxifen (Soltamox). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu ribociclib, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.
- spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut recent un atac de cord; sau au sau au avut vreodată bătăi lente ale inimii; un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate provoca bătăi neregulate ale inimii, leșin sau moarte subită); niveluri anormale de potasiu, calciu, fosfor sau magneziu în sânge; insuficienta cardiaca; sau boli de ficat, rinichi sau inimă.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Va trebui să faceți un test de sarcină înainte de a începe tratamentul. Utilizați o metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului și timp de 3 săptămâni după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați ribociclib, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Ribociclib poate dăuna fătului.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați ribociclib și timp de cel puțin 3 săptămâni după doza finală.
- trebuie să știți că acest medicament poate scădea fertilitatea la bărbați. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua ribociclib.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați ribociclib.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Nu mâncați grapefruit și nu beți grapefruit în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ribociclib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- diaree
- constipație
- dureri de stomac
- durere de cap
- Pierderea parului
- dureri de spate
- mâncărime
- afte bucale
- umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

- febră, durere în gât, frisoane sau alte semne de infecție
- eczemă
- vezicule sau descuamarea pielii
- arsuri sau vezicule ale buzelor, ochilor sau gurii
- bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii
- dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație; tuse cu sau fără mucus; sau durere în piept
- ameţeală
- leșin
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- urină închisă sau maro (de culoarea ceaiului).
- oboseală
- pierderea poftei de mâncare
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- greaţă
- vărsături
- sângerări sau vânătăi mai ușor decât în mod normal

Ribociclib poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la ribociclib. De asemenea, medicul dumneavoastră poate comanda o electrocardiogramă (ECG; test care măsoară activitatea electrică a inimii) înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Kisqali®

rand nume de produse combinate

- Kisqali®Femera®(ca o combinație de produs care conține Letrazol și Ribociclib)

Ultima revizuire - 15.12.2020

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022