Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617008.html

ไรโบซิคลิบ

ออกเสียงว่า (rye '' boe sye' klib)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Ribociclib ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาฮอร์โมนตัวรับบางชนิดในเชิงบวก (ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนที่จะเติบโต) มะเร็งเต้านมขั้นสูงหรือที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในสตรีที่ไม่เคยหมดประจำเดือน (เปลี่ยนชีวิต) ประจำเดือนหมดประจำเดือน) และในผู้ที่ใกล้หมดประจำเดือนหรือผู้ที่เคยหมดประจำเดือนมาแล้ว ยังใช้ Ribociclib ร่วมกับ fulvestrant (Faslodex) เพื่อรักษามะเร็งเต้านมขั้นสูงที่มีตัวรับฮอร์โมนบางชนิดที่เป็นบวกหรือที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเป็นการรักษาเบื้องต้นหรือในผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น ในผู้หญิงที่เคยผ่านวัยหมดประจำเดือนมาแล้ว Ribociclib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทำงานโดยการปิดกั้นการทำงานของโปรตีนผิดปกติที่ส่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Ribociclib มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งในตอนเช้าสำหรับ 21 วันแรกของรอบ 28 วัน รับประทานไรโบซิลิกิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ ribociclib ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่ากินยาเม็ดที่หักหรือบดขยี้

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานไรโบซิกลิบ ห้ามรับประทานยาอื่น ทำตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาไรโบซิกลิบหรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่กับว่ายาทำงานได้ดีแค่ไหนสำหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยไรโบซิกลิบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไรโบซิคลิบ

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ribociclib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต ribociclib สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), erythromycin (EES, Ery-tab, Eryped) และ moxifloxacin (Avelox); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); bepridil (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); boceprevir (Victrelis ไม่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว); คลอโรควิน (อาราเลน); โคนิวาปตัน; ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (DHE 45, ไมเกรน); disopyramide (นอร์เพซ); เออร์โกตามีน (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot); เอเวอร์โรลิมัส (Afinitor, Zortress); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis); halofantrine (Halfan; ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ยาบางชนิดสำหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น efavirenz (Sustiva ใน Atripla), indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสำหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Teril, อื่น ๆ) และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); เนฟาโซโดน; ondansetron (ทางหลอดเลือดดำ); pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินิดีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifamate, ใน Rifater); ซิโรลิมัส (ราปามูเน); โซตาลอล (Betapace, Sotylize); ทาโครลิมัส (Envarsus XR, Prograf) และทาม็อกซิเฟน (Soltamox) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจโต้ตอบกับไรโบซิกลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณมีอาการหัวใจวายเมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือมีหรือเคยหัวใจเต้นช้า ช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); ระดับโพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือแมกนีเซียมในเลือดผิดปกติ หัวใจล้มเหลว; หรือโรคตับ ไต หรือโรคหัวใจ
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทำการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 สัปดาห์หลังการให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานไรโบซิกลิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Ribociclib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประทานไรโบซิกลิบและอย่างน้อย 3 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย
- คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไรโบซิกลิบ
- หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังรับประทานไรโบซิกลิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

อย่ากินส้มโอหรือดื่มส้มโอขณะทานยานี้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดำเนินการตามกำหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Ribociclib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- อาการปวดท้อง
- ปวดหัว
- ผมร่วง
- ปวดหลัง
- อาการคัน
- แผลในปาก
- อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง
- นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
- ผื่น
- พุพองหรือลอกของผิวหนัง
- แสบร้อนหรือพองที่ริมฝีปาก ตา หรือปาก
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง
- หายใจลำบากหรือหายใจถี่ ไอมีหรือไม่มีเมือก; หรือเจ็บหน้าอก
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- เป็นลม
- สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
- ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล (สีชา)
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- เบื่ออาหาร
- ปวดท้องด้านขวาบน
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- เลือดออกหรือช้ำง่ายกว่าปกติ

Ribociclib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกียวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ribociclib แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบที่วัดกิจกรรมทางไฟฟ้าในหัวใจ) ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- คิสคาลิ®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

- คิสคาลิ®เฟเมร่า®(เป็นผลิตภัณฑ์ผสมที่มีเลตราโซลและไรโบซิคลิบ)

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022